

ANIMAUX NOUVEAUX OU RARES

RECUEILLIS PENDANT L'EXPÉDITION

DANS LES PARTIES CENTRALES

DE

L'AMÉRIQUE DU SUD,

DE RIO DE JANEIRO A LIMA, ET DE LIMA AU PARA.



Au Dépôt des publications de la librairie P. Bertrand,

CHEZ MM. TREUTTEL ET WÖRTZ, A STRASBOURG.

ANIMAUX NOUVEAUX OU RARES

RECUEILLIS PENDANT L'EXPÉDITION

DANS LES PARTIES CENTRALES

DE

L'AMÉRIQUE DU SUD,

DE RIO DE JANEIRO A LIMA, ET DE LIMA AU PARA;

EXÉCUTÉ

PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS PENDANT LES ANNÉES 1843 A 1847,

SOUS LA DIRECTION DU COMTE

FRANCIS DE CASTELNAU.

OUVRAGE QUI A OBTENU UNE MÉDAILLE HORS LIGNE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE



TOME SECOND.

PARIS,

CHEZ P. BERTRAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

RUE DE L'ARBRE-SEC, 22.

1855.

TABLE ET CLASSIFICATION DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LE DEUXIÈME VOLUME.

TITRE. 3^e livraison.

POISSONS,

Par M. le Comte FRANCIS DE CASTELNAU, chef de l'expédition.

TITRE. 1.	1 ^{re} livraison.
Feuilles a et b.	5 ^e livraison.
Feuilles 1 à 3.	1 ^{re} livraison.
Feuilles 4 à 7.	2 ^e livraison.
Feuilles 8 à 10.	3 ^e livraison.
Feuilles 11 à 14.	4 ^e livraison.
Planche 1.	12 ^e livraison.
Planche 2.	1 ^{re} livraison.
Planche 3.	1 ^{re} livraison.
Planche 4.	4 ^e livraison.
Planche 5.	2 ^e livraison.
Planche 6.	2 ^e livraison.
Planche 7.	2 ^e livraison.
Planche 8.	4 ^e livraison.
Planche 9.	6 ^e livraison.
Planche 10.	2 ^e livraison.
Planche 11.	3 ^e livraison.
Planche 12.	10 ^e livraison.

ZOOLOGIE. Vol. II.

POISSONS (suite).

Planche 13.	3 ^e livraison.
Planche 14.	3 ^e livraison.
Planche 15.	5 ^e livraison.
Planche 16.	3 ^e livraison.
Planche 17.	6 ^e livraison.
Planche 18.	8 ^e livraison.
Planche 19.	5 ^e livraison.
Planche 20.	9 ^e livraison.
Planche 21.	6 ^e livraison.
Planche 22.	9 ^e livraison.
Planche 23.	8 ^e livraison.
Planche 24.	8 ^e livraison.
Planche 25.	5 ^e livraison.
Planche 26.	1 ^{re} livraison.
Planche 27.	9 ^e livraison.
Planche 28.	9 ^e livraison.
Planche 29.	13 ^e livraison.
Planche 30.	10 ^e livraison.
Planche 31.	12 ^e livraison.
Planche 32.	11 ^e livraison.
Planche 33.	11 ^e livraison.
Planche 34.	12 ^e livraison.
Planche 35.	6 ^e livraison.
Planche 36.	12 ^e livraison.
Planche 37.	13 ^e livraison.
Planche 38.	13 ^e livraison.
Planche 39.	10 ^e livraison.
Planche 40.	10 ^e livraison.
Planche 41.	13 ^e livraison.
Planche 42.	6 ^e livraison.
Planche 43.	7 ^e livraison.
Planche 44.	9 ^e livraison.
Planche 45.	7 ^e livraison.
Planche 46.	8 ^e livraison.
Planche 47.	9 ^e livraison.
Planche 48.	7 ^e livraison.
Planche 49.	7 ^e livraison.
Planche 50.	1 ^{re} livraison.

REPTILES,

Par A. GUICHENOT, attaché au Muséum d'histoire naturelle.

TITRE	5 ^e livraison.
Feuille 1.	5 ^e livraison.
Feuilles 2 à 4.	6 ^e livraison.
Feuille 5.	7 ^e livraison.
Feuilles 6 et 7.	11 ^e livraison.
Feuilles 8 et 9.	12 ^e livraison.
Feuilles 10 et 11.	13 ^e livraison.
Feuille 12.	15 ^e livraison.
Planche 1.	2 ^e livraison.
Planche 2.	2 ^e livraison.
Planche 3.	4 ^e livraison.
Planche 4.	4 ^e livraison.
Planche 5.	5 ^e livraison.
Planche 6.	5 ^e livraison.
Planche 7.	7 ^e livraison.
Planche 8.	7 ^e livraison.
Planche 9.	11 ^e livraison.
Planche 10.	11 ^e livraison.
Planche 11.	11 ^e livraison.
Planche 12.	14 ^e livraison.
Planche 13.	13 ^e livraison.
Planche 14.	14 ^e livraison.
Planche 15.	15 ^e livraison.
Planche 16.	15 ^e livraison.
Planche 17.	15 ^e livraison.
Planche 18.	15 ^e livraison.

ANIMAUX NOUVEAUX OU RARES

RECUEILLIS PENDANT L'EXPÉDITION

DANS LES PARTIES CENTRALES

DE

L'AMÉRIQUE DU SUD,

DE RIO DE JANEIRO A LIMA, ET DE LIMA AU PARA.

Au Dépôt des publications de la librairie P. Bertrand,

CHEZ MM. TREUTTEL ET WÜRTZ, A STRASBOURG.

ANIMAUX NOUVEAUX OU RARES

RECUEILLIS PENDANT L'EXPÉDITION

DANS LES PARTIES CENTRALES

DE

L'AMÉRIQUE DU SUD,

DE RIO DE JANEIRO A LIMA, ET DE LIMA AU PARA;

EXÉCUTÉE

PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS PENDANT LES ANNÉES 1843 A 1847,

SOUS LA DIRECTION DU COMTE

FRANCIS DE CASTELNAU.

OUVRAGE QUI A OBTENU UNE MÉDAILLE HORS LIGNE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

POISSONS

PAR LE COMTE FRANCIS DE CASTELNAU.

PARIS,

CHEZ P. BERTRAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE DE L'ARBRE-SEC, 22.

1855.

INTRODUCTION.

Le travail que je sou mets aux zoologistes, sur les Poissons de l'Amérique du Sud, peut être considéré comme un simple catalogue raisonné des espèces de cette classe que j'ai observées et recueillies pour le Muséum de Paris, tant pendant mon voyage de cinq ans dans les régions centrales du Brésil et du Pérou, que pendant un séjour de près de sept ans à Bahia, où j'ai résidé comme consul de France. N'ayant pas cru qu'il fût utile de décrire de nouveau les espèces déjà connues, je me suis contenté, pour celles-là, de renvoyer aux auteurs qui les avaient fait connaître, et surtout à l'ouvrage de Cuvier et de M. Valenciennes, en m'étendant seulement sur les couleurs qu'elles présentent pendant la vie, et sur les observations que j'avais pu réunir à leur sujet pendant le cours de mes voyages. En général, les Poissons ne sont décrits par les auteurs que d'après les individus conservés dans nos Musées, et dont les nuances si délicates ont disparu par l'effet de la dessiccation ou par l'action de l'alcool; on est obligé ainsi de ne tenir compte que des formes, et l'on perd un des caractères spécifiques les plus utiles dans les autres parties de la zoologie, celui de la coloration.

L'étude de la classe des Poissons est tellement difficile, que je ne puis me dissimuler que de nombreuses erreurs ont dû se glisser dans mon travail; mais j'espère cependant qu'il offrira dans son ensemble assez de faits nouveaux pour mériter l'indulgence du public.

J'ai pris pour base le grand ouvrage de Cuvier et de M. Valenciennes (1), si remarquable par le détail et la patience du travail descriptif, mais qui, malheureusement, laisse de grandes difficultés pour l'étude des genres, surtout depuis que l'on a supprimé les tableaux qui étaient placés, dans les premiers volumes, en tête de chaque famille.

Bien que je me sois, comme je viens de le dire, attaché à suivre cet ouvrage, le plus complet que l'on possède en ichthyologie, il y a cependant un point sur lequel je ne puis être d'accord avec ses savants auteurs, je veux parler de la synonymie. En suivant le système qu'ils ont adopté, nous voyons que les Poissons les plus vulgaires et les plus connus, tels, par exemple, que le Thon, le Maquereau, la Bonite, la Truite, l'Eperlan, l'Alose, la Sardine, paraissent être des espèces nouvelles dont le nom est suivi d'un *nobis*, par la raison qu'ils rentrent, pour les auteurs, dans des genres différents de ceux auxquels les avaient rapportés les premiers naturalistes. En suivant ce système, les noms de Linné, de Lacépède, etc., seraient bientôt effacés de la science; et ce n'est qu'en lisant une description de plusieurs pages que l'on parvient à savoir que, bien que le nom spécifique soit suivi d'un *mibi*, cependant l'espèce a été connue de tous les auteurs qui ont écrit depuis Aristote ou Pline. Je pense, au contraire, que quels que soient les changements survenus dans la classification des genres, le nom spécifique doit être invariablement attribué à celui qui l'a le premier appliqué à l'objet que l'on étudie. Ainsi, par exemple, Linné a décrit un *Cyprinus Jesus*, et bien que ce poisson soit devenu un *Leuciscus* pour les auteurs modernes, cependant il devra, dans ma manière de voir, être indiqué *Leuciscus Jesus*, Linn., sauf à mettre entre parenthèses le mot *Cyprinus*, pour rappeler que c'est dans ce genre du *Systema nature* que l'on devra le chercher.

Je me suis aussi toujours efforcé de conserver aux espèces le nom le plus ancien que leur aient appliqué les auteurs, car je crois que le nom spécifique est une propriété littéraire dont on ne peut s'emparer.

Si je suis entré dans ces détails, c'est qu'ils m'ont semblé nécessaires pour ma justification de n'avoir pas toujours suivi les pas de mon illustre maître Cuvier.

En suivant Cuvier et M. Valenciennes, j'ai commencé par les Percéides et j'ai rejeté à la fin les Cartilagineux; mais j'ai éprouvé de grands embarras à placer un être anormal que j'ai recueilli dans un lac de l'Ucayale, le *Lepidosiren*. Cet animal me semble, ainsi qu'à M. Owen, devoir rentrer dans la classe des Poissons, et malgré les curieuses anomalies de son organisation, il paraît se rapprocher beaucoup de quelques espèces du groupe des *Gymnotes*; mais, d'un autre côté, il a de grands rapports avec les reptiles du genre des *Sirènes*. C'est certainement un

[1] *Histoire naturelle des Poissons*. P. BENTAND, libraire-éditeur, rue de l'Arbre-Sec, 22, à Paris.

de ces rameaux latéraux qu'il est à peu près impossible de suivre dans une méthode zoologique; cependant, pour rompre le moins possible les affinités naturelles, on devrait le placer à la tête des Poissons comme formant un ordre particulier que nous proposons de nommer *Ichthyosirènes*, puis viendraient les *Malacoptérygiens apodes*, et, renversant la série, on terminerait par les *Percoides*. Mais on éprouverait de grandes difficultés à placer les *Chondroptérygiens*, qui me paraissent former un ensemble anormal, et dont les *Sélaciens* me semblent devoir commencer la série des poissons, tandis que les *Cyclostomes* font manifestement le passage aux animaux inférieurs, et surtout aux Annélides.

Je me suis contenté ici de placer simplement le *Lepidosiren* à la fin des Poissons.

J'ai eu pouvoir me permettre une petite innovation en supprimant les noms spécifiques dits français, et en ne conservant que ceux qui ont la forme latine. Cette manière d'agir est généralement adoptée dans plusieurs parties de la zoologie, et en particulier, en entomologie. En effet, deux noms, qui ne sont en général que la traduction plus ou moins barbare l'un de l'autre, ne servent qu'à charger inutilement la mémoire.

Les espèces que j'ai rapportées de mes voyages, et qui se trouvent indiquées dans ce travail, sont au nombre de 275 (1), dont 100 n'ont paru nouvelles. J'en avais réuni une quantité bien plus considérable, soit dans les rivières centrales du continent, soit sur les côtes de la mer Pacifique; mais les premiers ont été détruits en grande partie par suite de la décomposition de la liqueur dans laquelle ils étaient plongés, et qui était due au ballonnement causé par la marche des mules sur lesquelles ils devaient être portés pendant des mois et quelquefois durant des années. Pendant le cours des voyages de ce genre, il est impossible de conserver des objets d'histoire naturelle dans la liqueur, tandis que ce moyen est très facile à employer dès que l'on est embarqué.

Depuis que mon travail est imprimé, j'ai eu connaissance d'un Mémoire de M. Hechel sur les poissons rapportés de l'Amazonie par M. Natterer (*Annalen des Wiener Museums*, t. I.), et dans lequel je erois reconnaître plusieurs de ceux que je décris ici; mais comme ce naturaliste a conservé à ses espèces les noms vulgaires, et que, autant que possible, j'en ai fait de même, on pourra assez facilement reconnaître ces doubles emplois. Ainsi mon *Cycla toucounarai* porte le même nom dans son travail. C'est un exemple bien frappant de l'avantage qu'il y a à conserver les noms vulgaires, même quand ils nous paraissent un peu barbares.

Je dois aussi faire observer que M. Valenciennes a figuré, dans l'ouvrage de MM. Webb et Berthelot sur les Canaries, un *Heliasis marginata* qui semble dif-

(1) Sans compter deux *Lepidosiren* décrits ici, mais qui sont de l'ancien continent.

férent du mien, surtout par la forme de la deuxième nageoire dorsale, etc. : il y aurait donc double emploi; mais cette espèce étant décrite dans le texte du même ouvrage sous un autre nom (*limbata*), celui de *marginata* me semble pouvoir être conservé à la mienne.

Sous le rapport de la distribution géographique, je dirai qu'en général tous les poissons du bassin de l'Amazonie me semblent différer spécifiquement de ceux des eaux de la Plata; ce qui confirme l'idée que j'ai émise depuis longtemps, que toutes les fois que les individus d'une espèce d'animaux sont entièrement privés de communication avec d'autres de la même espèce, ils tendent à se modifier, même en les supposant descendre originairement d'un type unique. Je suis bien persuadé qu'aussitôt qu'une communication artificielle sera établie entre ces deux vastes estuaires, les espèces changeront sous bien des rapports, et qu'on verra apparaître au Para et à Buenos-Ayres des poissons qui étaient jusque-là étrangers à ces régions.

Les poissons constituent une grande partie de la nourriture des populations indigènes de l'Amérique du Sud; beaucoup de peuplades s'en nourrissent à peu près exclusivement : tels sont les Carajas et les Chambias de l'Aragnay, les Guanos et les Guatos du Paraguay, les Antis, les Chuntaquiros, les Conibos, les Panis, etc., de l'Ucayale, etc., etc. Leur moyen ordinaire de pêche consiste à tuer le poisson à coups de flèches ou de trident; mais ils ont une autre manière de pêcher qui détruit une prodigieuse quantité de poissons, et qui n'est praticable que dans des régions où des tribus peu nombreuses ont à se partager un sol que la nature s'est plu à combler de ses présents les plus précieux.

Je vais extraire du 4^e volume de la *Relation* de mon voyage le récit d'une grande pêche de ce genre, en y faisant quelques additions que je dois aux études auxquelles j'ai pu me livrer depuis mon retour en Europe.

« La dernière partie de notre séjour aux missions de l'Ucayale fut consacrée à une excursion qui nous présenta le plus vif intérêt. J'avais communiqué au père Plaza mon désir de former, pour le Jardin des plantes de Paris, une collection des poissons qui habitent les rivières des environs de Sarayacu. Le bon religieux, bien que s'étonnant beaucoup d'une fantaisie qu'il regardait comme des plus singulières, s'empressa d'ordonner une grande pêche dans un lac voisin, qui, n'ayant jamais été exploité, devait offrir une abondante récolte. Plusieurs jours furent employés aux préparatifs de l'expédition, et l'on recueillit une grande quantité de tortues qui étaient destinées à la nourriture des pêcheurs. A Sarayacu, comme dans tous les villages indiens de la rivière, ces animaux sont accumulés en grand nombre dans des espèces de parcs en forme de cages. D'après les Indiens, la grande Émyde vit cent ans, et ce n'est qu'à vingt-cinq qu'elle atteint sa croissance entière.

» Le 9 octobre 1845 eut lieu notre départ de Sarayacu. Nous nous étions embarqués, le père Plaza, M. Deville et moi, dans une grande pirogue; mais la sécheresse qui régnait alors ne nous permit de descendre le rio Sarayaen qu'avec beaucoup de peine. Parvenus à son embouchure, nous trouvâmes la plage couverte d'Indiens qui se préparaient, avec leurs familles, à faire partie de l'expédition. Nous entrâmes alors dans une énorme pirogue conduite par une douzaine de rameurs indiens; nous descendîmes l'Ucayale pendant quatre lieues, puis nous nous arrêtâmes à une maison de Conibos dont les habitants nous attendaient pour nous accompagner. Après avoir fait encore deux lieues, nous atteignîmes l'endroit désigné, et que l'on appelle Cruz-Playa (plage de la croix). La rivière fait en cet endroit un si énorme détour, que, de ce point à Sarayaen, il n'y a qu'une demi-lieue par terre, et pendant la nuit nous entendions les fusées que l'on tirait à Belém (1) à l'occasion d'une fête qui s'y célébrait. Nous dormîmes sur la plage. Un grand nombre d'Indiens étant venus nous rejoindre, notre petit camp présentait un singulier aspect, à cause de la grande quantité de moustiquaires carrées sous lesquelles chaque homme se retire comme dans une tente. Le lendemain matin, nous nous établîmes dans deux maisons de Conibos situées à peu de distance, sur le haut d'une berge très élevée. Le missionnaire envoya des gens en avant, chargés de construire des huttes temporaires sur les bords du lac. Le soleil était tellement ardent, qu'on ne put obtenir aucun travail des Indiens pendant le jour, et ce ne fut que le soir qu'ils se mirent à l'œuvre. Alors ils portèrent jusqu'au lac le barbasco, racine vénéneuse avec laquelle on devait empoisonner les cany, et qui formait dix-huit paquets de deux arrobes chacun (l'arrobe pèse 32 livres espagnoles); d'autres étaient occupés à un travail bien plus pénible, et qui consistait à traîner les pirogues sur la plage et à les porter ensuite à environ une demi-lieue à travers les bois. Le costume des Indiens chrétiens différait essentiellement de celui des infidèles, avec lesquels ils étaient mêlés. Les premiers portaient de courtes chemises et des pantalons, tandis que les autres avaient de longues robes.

» Le 11, on continua le travail, et, à l'approche de midi, nous nous dirigeâmes vers le lac, qui était situé sur la rive orientale d'Ucayale, à environ trois quarts de lieue de la rivière. A notre arrivée, nous nous établîmes dans trois huttes solidement construites en feuilles de palmier, et tellement bien faites, qu'elles nous abritèrent complètement contre un violent orage qui survint peu après.

» Un grand nombre d'Indiens se rassemblèrent autour de nous, et chacun s'étant construit un abri, un village de plus de quatre cents habitants s'éleva tout à coup au milieu de la forêt solitaire. Le lac avait une forme très allongée et arquée;

(1) Village indien situé près de la mission de Sarayacu.

son plus grand diamètre était d'environ une lieue, et sa largeur moyenne de près de 120 mètres.

» Bien que très profond en quelques endroits, il n'avait pas en général, dans cette saison, plus de 2 mètres d'eau. Cette lagune était de toutes parts entourée d'épaisses forêts; et, suivant les Indiens, elle communiquait vers le nord, par un canal, avec un très grand lac. Il y a du reste une grande quantité de ces masses d'eau le long de l'Ucayale; et comme dans la saison des pluies elles communiquent avec le fleuve, on peut prendre leurs bouches pour des entrées de rivières.

» Les miosquites et les maringouins nous tourmentèrent affreusement en ces lieux, et je fus, pendant la nuit, piqué par un insecte ou une araignée qui me causa de singulières enflures sur toute la figure.

» Enfin, le 12, la pêche commença dès le point du jour. On avait amené vingt-quatre pirogues qui furent divisées également en deux lots, et qui se dirigèrent vers les extrémités opposées. Dès la veille, le barbasco (*Jacquinia armillaris*) avait été rompu et meurtri à grands coups de bâton, et on l'avait partagé entre les diverses embarcations. Chaque pirogue portait deux hommes: l'un était chargé de la diriger en pagayant, tandis que l'autre, après avoir trempé la racine dans l'eau, la tordait avec force et la jetait ensuite dans le lac au milieu duquel les embarcations finirent par se rencontrer. Au moins cinq cents Indiens se pressaient alors sur le rivage; tous, hommes, femmes et enfants, se tenaient immobiles dans les hautes herbes ou sur les branches des arbres renversés. Ils étaient armés de flèches, de lances, de harpons, de massues, etc., et leurs yeux exercés suivaient avec attention les mouvements des poissons, qui, peu de temps après, parurent à la surface. Les premiers étaient de très petite taille; ils semblaient engourdis, puis se réveillaient en cherchant, par de violents efforts, à gagner le rivage, sur lequel quelques-uns sautaient; beaucoup d'entre eux paraissaient endormis, mais conservaient assez d'instinct pour fuir lorsqu'on essayait de les prendre à la main. Les enfants, seuls, furent chargés de cette récolte, et en remplirent bientôt leurs paniers. Un instant après, quelques gros poissons vinrent bondir à la surface, puis ils parurent perdre leurs forces, et bientôt nous les vîmes en grand nombre étendus sur l'eau et cherchant par intervalles à s'échapper de leur élément empoisonné; les canots sillonnèrent le lac pendant toute la journée, et lorsqu'ils étaient remplis de poissons, ils venaient les décharger sur la rive.

» La nombreuse population qui couvrait les bords du lac ne restait pas non plus inactive. Des milliers de traits étaient lancés dans toutes les directions, et l'on assommait à coups de massue les gros poissons que l'on pouvait saisir. Le père Plaza était assis sous sa hutte, et l'on venait déposer à ses pieds les nombreux produits de la pêche. Après que nous eûmes choisi ce qui pouvait être intéressant pour la science, un grand nombre de femmes et d'enfants furent chargés de

découper le poisson, de le saler et de le suspendre à des perches supportées par des fourches enfoncées en terre. Lorsque la provision commune fut assurée, on permit à chaque famille de s'occuper de la sienne en particulier. Les Indiens qui n'avaient pas de sel fumaient leurs poissons, les autres les faisaient rôtir sur des grils de bois. Il serait difficile de peindre l'activité qui animait ce tableau : de toutes parts s'échappaient des cris de joie et des éclats de rire ; tous ces gens paraissaient parfaitement heureux. Nous recueillîmes environ trente-cinq espèces de poissons dont plusieurs appartenaient aux familles des *Siluroïdes*, des *Salmoues* et des *Anguilliformes* ; parmi ces dernières se trouvait le *Lepidosiren*, si intéressant pour les naturalistes, puisque ses caractères permettent presque également de le classer avec les Reptiles ou avec les Poissons. Il y avait aussi des *Gymnotes électriques*. Enfin, nos estomacs fatigués n'oublieront jamais un poisson délicieux qui, péniblement cuit à l'eau, semblait l'avoir été dans le meilleur beurre possible. Les Indiens lui donnent le nom de *Malparata*, et il appartient à la famille des *Silurus*, et, je crois, au genre *Pimelodes*.

» La pêche dura jusqu'à dix heures du soir ; et bien que le lac eût été empoisonné, tout le monde but de son eau. Il est aussi curieux de remarquer que les Tortues et les Caïmans semblent échapper entièrement à l'action du *barbasco*.

» Nous passâmes une partie de la nuit à étudier nos nouvelles acquisitions et à les placer dans des vases de terre que les Indiens avaient fabriqués d'avance à cet effet. Le père Plaza, avec sa bonté habituelle, nous avait amplement fournis d'eau-de-vie de canne, destinée à leur conservation.

» Le 13 au matin, la surface du lac était couverte de poissons morts dont la plupart étaient déjà dans un état avancé de corruption ; ils répandaient de fortes exhalaisons auxquelles venaient se joindre celles des débris abandonnés qui couvraient le rivage. Nous nous embarquâmes, M. Deville et moi, dans des pirogues, et nous recueillîmes encore plusieurs espèces intéressantes ; vers midi, l'infection était telle, que nous fûmes obligés de quitter les lieux.

» Nous visitâmes un autre petit lac où le père Plaza laissa quinze hommes sous la direction de M. Harquett, et en moins de deux heures ils avaient déjà pris six *Pirarucus* (*Vastres*) d'environ 2 mètres de long.

» En ne comptant que les poissons ayant plus de 30 centimètres de long, nous estimâmes que le nombre de ceux que l'on recueillit était de cinq à six mille, trois fois autant avaient été perdus et étaient devenus la proie de la putréfaction : ainsi, en un seul jour, on avait détruit, dans ce seul lac, de vingt à vingt-cinq mille poissons de la dimension que nous avons indiquée, et au moins deux fois autant de plus petits, ce qui ferait, sans compter le fretin, environ soixante-douze mille poissons. Si l'on prend en considération que la plupart d'entre eux étaient de grande taille, qu'il y avait beaucoup de grands *Bagrus*, d'énormes *Phractocephalus*, etc.,

je crois rester au-dessous de la vérité en estimant à cinquante mille livres le poids de ces poissons.

» Dans l'après-midi, nous rejoignîmes la plage, et nous retournâmes à Sarayacu.»

J'ai cité le *Lepidosiren*, et je dois ajouter qu'un savant voyageur français, M. Auguste Saint-Hilaire, pensait qu'on devait lui rapporter ce que les Indiens disent d'un animal gigantesque que les pêcheurs désignent sous le nom de *Minicodo* (1). Souvent les sauvages de l'Ucayale nous avaient entretenus de cet être que nous regardions comme fabuleux. Rien n'égale la terreur avec laquelle les gens en parlent; souvent ils refusent d'entrer dans des lacs, sous prétexte qu'il y habite; beaucoup assurent avoir entendu son cri qu'ils représentent comme un effroyable mugissement. Pendant le cours de la pêche dont je viens de tracer l'histoire, le père Plaza confirma ces récits. Cet homme, bien que peu éclairé, avait une connaissance parfaite de tous les animaux du pays; souvent il avait rencontré le *Boa constrictor*, qui est, dans toutes ces parties, désigné sous le nom de *Madre de las aguas* (la mère des eaux), et il est impossible d'admettre que cet animal soit celui qu'il désignait sous le nom de *Dragon*, et qu'il avait rencontré une fois près de la bouche de la Pachytea. D'après son récit, le monstre aurait eu une trentaine de mètres de long, et il l'aurait fait attaquer par plusieurs centaines d'Indiens, mais l'animal serait parvenu à s'échapper. Le prêtre certifiait, avec beaucoup d'Indiens de Sarayacu, avoir vu l'animal, et avoir été assourdi de son mugissement. Tout en étant convaincu que ce vieillard a été victime de quelque illusion que je ne puis expliquer, il m'est impossible de douter de sa véracité, et je me rappelai le *Minicodo*, dont nous avaient souvent parlé les sauvages de l'Araguay. Je ne vois, du reste, pour ma part, aucune raison de croire que le *Lepidosiren* atteigne de grandes dimensions, et qu'il puisse, comme l'a pensé un savant voyageur, avoir rien de commun avec ce géant probablement infanté par l'imagination des Indiens.

Les pêcheurs brésiliens m'ont souvent parlé de l'affection singulière que la femelle du *Pirarucu* (*Istrex*) porte à ses petits, et j'avais d'abord été porté à en inférer que cet animal devait être vivipare; quoi qu'il en soit, j'ai lieu de supposer qu'il en est de ce poisson comme de plusieurs grandes espèces de *Siluroïdes* de ces régions, dont les petits nagent autour de la mère, et viennent en cas de danger se réfugier dans sa bouche. Il y a certainement, dans ce cas, un exemple d'affection maternelle qu'il est curieux de trouver chez les Poissons.

Nous avons eu encore occasion de nous assurer qu'un autre poisson d'un genre fort différent, un *Chromys* (*lapidifera*, Nob.), prend un soin particulier de sa progéniture; car, au lieu de l'abandonner au sein des eaux, ce qui est le cas presque

(1) Ce mot signifie grand ver de terre.

universel des poissons, celui-ci porte une à une, dans sa bouche, et à une assez grande distance sur le rivage, de petites pierres dont il forme un lit sur lequel il dépose ses œufs. Quelques *Callichthys* de la Guyane se construisent, dit-on, de véritables nids.

Je dois dire ici un mot d'un phénomène qui, je l'avoue, m'a singulièrement préoccupé pendant quelques instants.

Nous étions, un soir, dans la partie de l'Araguay qui est obstruée par des bas-fonds et des rapides, et le soleil venait de se cacher derrière l'épaisse végétation qui borde ce fleuve dans tout son cours, lorsque tout à coup un son étrange vint attirer notre attention. C'était d'abord une plainte solitaire, puis d'autres voix lui répondirent; à chaque instant, le bruit devenait plus fort et plus discordant; bientôt ce fut un concert singulier de gémissements, de grognements bizarres articulés sur les tons les plus disparates. Au milieu de la profonde solitude du désert il y avait quelque chose de surnaturel dans ce phénomène, et je cherchai en vain à me l'expliquer. Tout était calme autour de nous, et l'étouffante chaleur semblait avoir endormi la nature entière : les singes, fatigués, avaient cessé de gambader dans les branches; les perruches s'étaient déjà retirées pour la nuit et avaient interrompu leurs cris discordants : c'était, en un mot, cet instant de la soirée des tropiques où les créatures du jour mettent fin à l'éclat de leurs cris, et où n'a pas encore commencé le concert sinistre des animaux nocturnes. Je ne pouvais rien découvrir, et malgré moi, à moitié endormi, une sorte de frisson parcourait mon être : je crus être sous le poids d'un songe, et mes yeux se portèrent sur les hommes de l'équipage; mais je vis qu'ils se regardaient les uns les autres, frappés aussi bien que moi d'une sorte de superstitieuse terreur. Un vieillard seul, plus habitué à la vie des bois, semblait rire de l'effroi général, puis il dirigea son bras vers le fleuve, et annonça que le son venait du fond des eaux. J'eus de la peine à admettre cette explication; mais, peu d'heures après, il m'apporta un petit *Hypostome*, long de quelques pouces au plus, et dont les troupes nombreuses, garnissant les bas-fonds, étaient la cause de ce vacarme extraordinaire.

En thèse générale, la faune ichthyologique des côtes du Brésil a les plus grands rapports avec celle de la mer des Antilles, et la moitié environ des espèces sont communes à ces deux localités, ainsi qu'on peut s'en convaincre par les ouvrages de Para. de M. Guichenot (dans le travail de Ramon de la Sagra), et de M. Poey, sur les poissons de la Havane, etc.; un cinquième au plus de ces espèces se retrouve sur les côtes atlantiques des États-Unis. Environ dix pour cent s'étendent à des portions de la côte occidentale de l'Afrique, et le nombre des poissons qui sont communs à la mer des Indes et aux côtes du Brésil est certainement très faible, bien que l'on ait pensé le contraire, à une époque où les

espèces étaient distinguées les unes des autres d'une manière beaucoup moins rigide qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce ne sont que quelques espèces : 1^o à force natatrice très grande, telles que certains *Serranus*, par exemple, ou 2^o qui, par leur forme, se laissent entraîner et balloter au gré des eaux, telles que les *Coffres*, etc., qui sont dans ce cas. Il importe donc beaucoup de se tenir en garde contre les indications des zoologistes antérieurs à notre siècle. Ainsi Linné, Bloch, etc., indiquent l'immense majorité des espèces comme habitant, par exemple, le Brésil et le Japon, et ne font aucune difficulté de réunir des poissons des mers glaciales à ceux de Ceylan, par exemple. Les études modernes ont fait justice de toutes ces énormités; mais, il faut l'avouer, la géographie ichthyologique est encore dans son enfance.

MM. Forskael, Ruppel, Ehrenberg, etc., nous ont fait connaître avec détail la faune de la mer Rouge, et il est douteux qu'aucune espèce de ces parages se retrouve identiquement semblable sur les côtes du Brésil.

Si actuellement nous jetons un coup d'œil sur les espèces particulière aux eaux douces, nous verrons que celles de l'Amérique du Sud sont toutes propres à cette partie du continent, et que les poissons du bassin de l'Amazone semblent différer presque toujours de ceux qui habitent les affluents de la Plata. Les familles qui abondent le plus sont celles des *Sciënoides*, des *Sitaroides* et des *Salmonoides*, tandis que les *Cyprinoides* manquent entièrement au Brésil, et ne semblent offrir quelques rares représentants que dans les lacs et les cours d'eau de la Cordillère des Andes, qui présentent le type si anormal des *Orestias*. Les *Anguilliformes* offrent d'assez nombreux représentants dans les eaux douces de la partie tropicale de l'Amérique du Sud, et plusieurs d'entre eux sont remarquables par leurs formes souvent très curieuses; mais ce que l'on y rencontre de bien plus singulier, ce sont des *Raies* que l'on avait, jusque dans les derniers temps, regardées comme essentiellement marines. Ainsi donc, les grands fleuves de ces curieuses régions présentent : dans la classe des Poissons, des *Raies*; dans celle des Cétacés, des *Dauphins*, et dans celle des Oiseaux, des *Mouettes*, des *Cormorans* et des *Becs-en-ciseaux*. En vérité, la nature semble prendre plaisir à détruire tous les travaux des savants systématiques.

Je suis heureux de pouvoir exprimer ici ma reconnaissance envers MM. Duméril père et fils, qui mirent le plus grand empressement à faire réunir les nombreux objets que j'avais envoyés, et qui étaient disséminés dans les immenses collections du Muséum; à M. Guichenot, pour l'aide qu'il m'a prêtée dans plus d'une occasion, et enfin à M. Kiener, qui voulut bien mettre à ma disposition son cabinet d'études sans lequel il m'eût été impossible de me livrer pendant l'hiver à la rédaction de ce travail, ce qui était rendu nécessaire par le séjour limité que les exigences de ma carrière me permettent de faire en France.

LISTE DES PLANCHES.

Les espèces précédées d'un astérisque (*) sont celles dont j'ai fait des dessins coloriés sur le vivant ; les autres ont été enluminées sur des individus conservés.

Planches.		Planches.	
I.	1. * <i>Serranus caranx</i> , Margr. 2. * — <i>niveatus</i> , Cuv., Val. 3. * — <i>ouatabili</i> ? Cuv., Val. 4. * <i>Centropomus nebulosus</i> , Cast.	XIV.	1. <i>Bagrus fuscus</i> , Cast. 2. — <i>punctulatus</i> , Cast.
II.	1. * <i>Pomacanthus pictus</i> , Cast. 2. * <i>Pristipoma bicolor</i> , Cast.	XV.	1. * <i>Phractopcephalus hemilopterus</i> , Agas. 2. <i>Arios</i> ? <i>longibarbis</i> , Cast.
III.	1. <i>Heliopsis marginata</i> , Cast. 2. <i>Apogon americanus</i> , Cast. 3. * <i>Pomacanthus variabilis</i> , Cast.	XVI.	1. * <i>Genidens granulatus</i> , Cast. 2. <i>Pimelodus bahianus</i> , Cast. 3. — <i>versicolor</i> , Cast.
IV.	1. <i>Johannes amazonicus</i> , Cast. 2. — <i>aureatus</i> , Cast.	XVII.	1. * <i>Doras Weddellii</i> , Cast. 2. <i>Agracilus ucayalensis</i> , Cast. 3. <i>Galrichthys araguanensis</i> , Cast.
V.	1. * <i>Ayricthys splendens</i> , Cast. 2. * <i>Johannes cravina</i> , Cast.	XVIII.	1. — <i>bahiensis</i> , Cast. 2. * <i>Callichthys ciliquios</i> , Cast. 3. * — <i>splendens</i> , Cast.
VI.	1. <i>Chromys unicellatus</i> , Cast. 2. — <i>ucayalensis</i> , Cast. 3. — <i>obscura</i> , Cast.	XIX.	1. * <i>Callichthys latosa</i> , Cast. 2. <i>Platyura punctifera</i> , Cast.
VII.	1. * — <i>proxima</i> , Cast. 2. — <i>unimaculata</i> , Cast. 3. — <i>appendiculata</i> , Cast.	XX.	1. <i>Hypostomus alatus</i> , Cast. 2. — <i>asperatus</i> , Cast. 3. — <i>pardalis</i> , Cast.
VIII.	1. * — <i>punctata</i> ? Bloch. 2. — <i>unipunctata</i> , Cast. 3. <i>Cyela lucasii</i> , Cast.	XXI.	1. — <i>subcarinatus</i> , Cast. 2. — <i>aureolatus</i> , Cast. 3. * — <i>niveatus</i> , Cast.
IX.	1. * <i>Chromys</i> ? <i>arora</i> , Cast. 2. * — ? <i>fasciata</i> , Cast. 3. * <i>Aulastoma Margravi</i> , Cast.	XXII.	1. — <i>nigricans</i> , Cast. 2. — <i>pictus</i> , Cast. 3. — <i>spinatus</i> , Cast.
X.	1. * <i>Cyba toconarai</i> , Cast. 2. * — <i>multifasciata</i> , Cast. 3. * — <i>caerulea</i> , Cast.	XXIII.	1. — <i>vicius</i> , Cast. 2. <i>Loricaria amazonica</i> , Cast. 3. — <i>carinata</i> , Cast. 4. — <i>castanea</i> , Cast.
XI.	1. * <i>Acanthurus bahianus</i> , Cast. 2. * <i>Holocanthus formosus</i> , Cast. 3. <i>Plataxoides Dumerilii</i> , Cast.	XXIV.	1. <i>Trichomycterus Pentlandi</i> , Cast. 2. — <i>pictus</i> , Cast. 3. — <i>punctulatus</i> , Cast. 4. * — <i>pusillus</i> , Cast.
XII.	1. * <i>Chromys lapidifer</i> , Cast. (1). 2. * <i>Acanthurus caeruleus</i> ? Bl. 3. * <i>Clinus fasciatus</i> , Cast.	XXV.	1. * <i>Vastres gigas</i> , Cuv. 2. * <i>Osteoglossum minus</i> , Vandell.
XIII.	1. <i>Matthia setata</i> , Cuv., Val. 2. <i>Bagrus Valenciennesi</i> , Cast. 3. — <i>flavicans</i> , Cast.	XXVI.	1. <i>Vastres gigas</i> (ête omise).
		XXVII.	1. <i>Orestias Tschudi</i> , Cast. 2. — <i>Pentlandi</i> , Cuv., Val. 3. — <i>Jamal</i> , Cuv., Val.
		XXVIII.	1. * <i>Vaudella Piazzi</i> , Cast.

(1) Est indiqué par erreur, sur le texte, pl. VIII, fig. 1.

Planchas

- XXVIII. 2. *Yandellia cirrhosa*, Cuv., Val.
3. *Pristigaster Phaeton*, Cuv., Val.
- XXIX. 1. * *Leporinus bimaculatus*, Cast.
2. * — *maculatus*, Cuv., Val.
3. * — *vittatus*, Cuv., Val.
- XXX. 1. — *pachyrus*, Cuv., Val.
2. *Salminus maxillaris*, Cuv., Val.
3. *Epicrystus paradoxus*, Möller.
- XXXI. 1. * *Salminus Hilarii*, Cuv., Val.
2. * *Prochilodus brama*, Cuv., Val.
3. * — *nigricans*, Agass.
- XXXII. 1. * *Pisabaca vittata*, Cuv., Val.
2. * *Tetragonopterus fasciatus*, Cuv.
3. — *orbicularis*, Cuv., Val.
- XXXIII. 1. * — *sawa*, Cast.
2. — *fusco-aureatus*, Cast.
3. — *vittatus*, Cast.
- XXXIV. 1. * *Myletes dudyzodon*, Cuv., Val.
2. * — *doriventris*, Cuv.
- XXXV. 1. * *Chalcus carophagus*, Cuv., Val.
- XXXVI. 1. *Myletes bidens* (tête osseuse).
2. — *Devillei*, Cast.
3. * *Chalcus auritus*, Cuv., Val.
- XXXVII. 1. * — *trifurcatus*, Cast.
2. * *Serranalmus humeralis*, Cuv., Val.
3. * — *rhombus*, Lacép.
- XXXVIII. 1. * — *gilbus*, Cast.
- XXXIX. 1. * *Pygocentrus piraya*, Cuv.
2. * *Pygopristis serrulatus*, Cuv., Val.
- XXXIX. 1. *Cynodon vulpinus*, Spix.
2. * — *scombroides*, Cuv., Val.
- XL. 1. * *Xiphosoma Oerri*, Cast.

Planchas

- XL. 2. *Xiphosoma maculata*, Cuv., Val.
3. *Rhombus aramaca*, Margr.
- XLI. 1. — *bahianus*, Cast.
2. * *Plagusia brasiliensis*, Spix.
3. * *Monochir punctifer*, Cast.
- XLII. 1. * *Murenophis rostrata*, Spix.
2. — *curvilineata*, Cast.
3. * — *punctata*, Cast.
4. * — *vicina*, Cast.
- XLIII. 1. * *Murenophis cerasura*, Cast.
2. * — *variegata*, Cast.
3. * *Conger limbatas*, Cast.
4. * — *microstoma*, Cast.
- XLIV. 1. — *multidentis*, Cast.
2. * *Ophisurus Gomesii*, Cast.
3. *Synbranchus vittatus*, Cast.
- XLV. 1. *Sternarchus albifrons*, Pollac.
2. — *Bomparilli*, Cast.
3. — *Lacépèdei*, Cast.
4. * — *Maximiliani*, Cast.
- XLVI. 1. * *Carapus tangulaeformis*, Cast.
2. * *Rhamphichthys marmoratus*, Cast.
3. — *pantheriours*, Cast.
- XLVII. 1. — *lineatus*, Cast.
2. * *Monacanthus Roppelli*, Cast.
3. * *Tetraodon bejaui*, Cast.
- XLVIII. 1. * *Tetraodon Duménilii*, Cast.
2. * — *Mulleri*, Cast.
3. — *Heudei*, Cast.
- XLIX. 1. — *Dorbignii*, Cast.
2. * *Uraptera Agassizii*, Möller et Henle.
- L. 1. *Lepidosiren dissimilis*, Cast.

POISSONS OSSEUX.

ORDRE DES ACANTHOPTÉRYGIENS.

FAMILLE DES PERCOÏDES.

GENRE SERRANUS.

N° 1. SERRANUS GUTTATUS, Bloch, t. VII, p. 26, pl. 224.

Pira pizanga, Margr., livr. 4, p. 153.

Ce *Serran* est connu à Bahia sous le nom de *Gato*, qui, en portugais, signifie chat. On l'apporte assez communément au marché, surtout dans les mois de novembre à mars. Il est, en dessus, d'un jaune olivâtre, et blanc en dessous; il est entièrement couvert de taches arrondies, assez grandes, serrées et de couleur brune; les nageoires caudale, anale et pectorales sont, dans leur partie postérieure, d'un violet presque noir et terminées par une bordure jaune; les yeux sont de cette dernière couleur. La figure de Bloch est fort bonne.

Ce *Serran* paraît avoir un habitat fort étendu, car il est commun sur les côtes du Brésil; Bloch l'indique de Sainte-Hélène, et Cuvier des Indes orientales.

N° 2. SERRANUS CARAUNA, Margrave, livr. 4, p. 147.

(PLANCHE I, fig. 1.)

Serranus caraua? Lich., *Mém. Acad. Berlin*, 1820, p. 278.

— Cuv., Val., *Poissons*, t. II.

Connu à Bahia sous le nom de *Garupinha*; il est assez fréquent dans les mois de décembre à mars; atteint plus de 60 centimètres de longueur. Il est entièrement d'un beau rouge, tout couvert, excepté sur le dessous du corps, de petits points nombreux et d'un bleu noir; la partie inférieure de la caudale et les deux tiers postérieurs de l'anale et des ventrales, d'un bleu obscur.

Ce poisson est probablement le *Jacob Evertsen rouge* de Vlaming, auquel Cuvier rapporte le *Serranus cyanostigma* de Kuhl et Van Hasselt. Il règne une grande confusion dans la détermination des grands *Serrans* tachetés ou piquetés. Ce sont, en général, des animaux munis d'une force natatoire fort considérable, et qui probablement étendent leur habitat aussi bien sur l'Atlantique que sur la mer des Indes.

N° 3. SERRANUS NIVEATUS, Cuv., Val., t. II, p. 385.

(PLANCHE I, fig. 2.)

Corps d'un brun violet avec le dessous de la gorge jaunâtre; une tache noire à la base de la queue; les nageoires jaunâtres, l'anale et les ventrales verdâtres; le corps parsemé de taches arrondies assez grandes et écartées, d'un bleu clair.

Observé à Rio-de-Janeiro.

N° 4. SERRANUS OUATALIBI? Cuv., Val., t. II, p. 381.

(PLANCHE I, fig. 3.)

Cette espèce, connue à Bahia sous le nom de *Yabu*, qu'il faut prononcer *Jabou*, ressemble beaucoup au précédent; mais il est plus petit, a un reflet verdâtre et a le corps couvert de petites taches punctiformes très nombreuses et très serrées, d'un bleu clair, qui s'étendent sur la dorsale; il est surtout commun au mois de mars. Au Muséum, ce poisson est réuni au *Serranus ouatalibi*; mais ce dernier est décrit comme étant rouge, et la couleur du nôtre est toujours constante: c'est peut-être la *Perca punctata* de Linné et de l'*Encyclopédie* (p. 130, pl. LV, fig. 214); mais Bonnatère la confond avec une espèce d'Afrique. Il y a déjà une si grande confusion dans ces Serrans tachetés, que j'ai craint de l'augmenter encore en lui appliquant, dans l'incertitude où je suis, le nom de Linné.

N° 5. SERRANUS ONGUS, Bloch, pl. 253 (*Holocentrus*).

Holocentrus angus, Lacép., t. IV, p. 380.

Serranus dichopterus, Cuv., Val., t. II, p. 293.

D'un brun obscur en dessus; ventre, flancs et nageoires d'un gris jaune; les parties latérales et inférieures du corps ayant des lignes irrégulières brunes; sur le dos, des taches arrondies et vertes.

Rio-de-Janeiro.

N° 6. SERRANUS UNDFLOSUS, Cuv., t. II, 296.

Ressemble au précédent, mais il a trois ou quatre lignes longitudinales brunes sur les opercules. Le corps est couvert de lignes semblables un peu plus régulières.

Les couleurs de cette espèce varient: tantôt il y a des taches vertes sur le dos, tantôt elles manquent; les nageoires sont plus ou moins tachetées, etc. Il est possible qu'elle ne soit qu'une variété de la précédente.

Rio-de-Janeiro.

N° 7. *SERRANUS IRRADIANS*, Quoy et Gaymard, *Voyage de l'Uranie*, Zool., p. 313, pl. 58.

Serranus irradians, Cuv., Val., *Poissons*, t. II.

Petite espèce d'un gris brunâtre clair, avec cinq ou six bandes longitudinales jaunes et une dizaine de bandes transversales peu régulières et d'un brun obscur; sur le front, des bandes transversales bleues; opercules jaunes avec des bandes longitudinales de la couleur de celles du front; nageoires d'un bleu clair avec des lignes longitudinales jaunes sur la dorsale; des points arrondis et nombreux sur la caudale.

Rio-de-Janeiro.

GENRE PLECTROPOMA.

N° 1. *PLECTROPOMA CHLOROPTERA*, Cuv., Val., t. II, p. 398.

D'un brun obscur avec les côtés et le dessous du corps verts, parsemés de taches irrégulières de la couleur du dos; nageoires obscures avec une ou deux bandes transversales brunes.

Rio-de-Janeiro.

N° 2. *PLECTROPOMA BRASILANUM*, Cuv., Val., *Poissons*, t. II, p. 397.

Brun, avec six bandes transversales d'un lilas clair; ventre d'un cendré lilas; nageoires et dessous de la tête d'un gris jaunâtre.

Rio-de-Janeiro.

GENRE APOGON.

N° 1. *APOGON AMERICANUM*, nov. sp.

(PLANCHE III, fig 2.)

Longueur totale, 10 centimètres. La première dorsale est formée de 6 rayons épineux; la deuxième est très allongée et composée d'une forte épine et de 9 rayons; la caudale, de 18 rayons; l'anale, d'une épine et de 8 rayons; les ventrales, d'une épine et de 5 rayons; les pectorales allongées et formées de 8 rayons.

Après avoir séjourné dans la liqueur, ce poisson paraît d'un lilas clair avec les nageoires jaunâtres et diaphanes.

Cet *Apogon* est, je crois, le seul du genre qui ait été encore rencontré dans les eaux de l'Amérique. Il vient de Bahia.

GENRE MIRIPRISTIS.

N° 1. *MIRIPRISTIS YACOBUS*, Desm., *Dict. cl. d'hist. nat.*

Miripristis yacobus, Cuv., Val., t. III, p. 162.

Connu à Bahia sous le nom d'*Olho de vidre* (œil de verre); en dessus, d'un beau

rouge éclatant; côtés et dessous du corps d'un blanc argenté avec d'assez nombreuses lignes longitudinales roses; nageoire dorsale grise avec les rayons bordés d'un rouge foncé et une large tache transversale derrière l'opercule, et qui couvre son angle postérieur; yeux très grands et jaunes.

Rio-de-Janeiro et Bahia.

NOTA.—Les couleurs de ce poisson sont exactement celles du *Sparus pagrus*, Bloch, pl. 267.

GENRE MESOPRION.

N° 1. MESOPRION UNINOTATUS, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 66.

Mesoprion uninotatus, Cuv., Val., *Poissons*, t. II, p. 340.

Lutjanus Aubrieti, Desm., 1^{re} década, *Ichthyologie*.

Lutjanus Aubrieti, Desm., *Diet. cl. d'hist. nat.*

Dipterodon Plumieri, Lacép., t. IV, p. 167.

Sparus vernicularis, Bloch, édit. Schneider, p. 278.

Sparus synagris, Linné.

Salpa purpurascens variegata, Catesby, pl. 17, fig. 1.

Beau poisson d'un rose rouge avec six ou sept bandes longitudinales d'un jaune doré; nageoire dorsale jaune en avant, et rose bordé de jaune dans le reste de sa longueur; queue rouge avec un liséré noir; côtés de la tête, ventre et nageoires inférieures d'un blanc argenté; pectorales roses; une tache noire vers les deux tiers postérieurs du corps.

Rio-de-Janeiro.

N° 2. MESOPRION ANALE, Cuv., Val., t. II, p. 452.

Gris en dessus avec huit à dix bandes transversales peu régulières, d'un gris d'acier sur les flancs; joues et opercules jaunes avec des lignes longitudinales bleues et d'autres rouges à la partie inférieure. A part les bandes transversales, il y a sur tout le corps des lignes longitudinales un peu obliques, d'un jaune doré, qui deviennent bleues sur le dos et roses sur le ventre : ce dernier est d'un bleu clair; la mâchoire inférieure est rose, de même que les nageoires ventrales et anale; la dorsale est grise, de même que la caudale : cette dernière a une large bordure rouge.

De même que l'espèce précédente, celle-ci a une tache arrondie et assez grande sur les côtés du corps; mais dans cette espèce elle est située un peu plus en avant.

Rio-de-Janeiro.

N° 3. MESOPRION CHRYSURUS, Bloch (*Sparus*), pl. 262.

Sparus chrysurus, Lacép., t. IV, p. 115.

Mesoprius chrysurus, Cuv., Val., t. II, p. 459.

Mesoprius aurorittatus, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 66.

Acara pitamba, Margrave, livr. 4, p. 155.

Ce poisson est commun à Bahia sous le nom de *Rababela*. Il devient assez grand et il est très estimé.

Le dessus du corps est d'un brun violet; les flancs et les côtés de la tête roses et le ventre blanc; sur chaque côté, une large bande longitudinale; queue et nageoire dorsale d'un beau jaune doré.

Commun à Bahia.

N° 4. MESOPRIUS JOCU, Parra, pl. 25, fig. 2.

Anthias jocu, Schneider, Bloch, p. 310, n° 22.

Mesoprius jocu, Cuv., Val., t. II, p. 352.

Ardoisé en dessus; ventre blanc avec le bord des écailles teinté de rose; tête d'un brun clair avec des points bleus sur les côtés; nageoires dorsale et anale avec une légère bordure rouge.

Ce poisson est connu à Bahia sous le nom de *Cioba*. C'est le plus estimé et le plus cher des poissons de ce port; il atteint quelquefois près de 1 mètre de long.

GENRE CENTROPRISTIS.

N° 1. CENTROPRISTIS NEBULOSUS, Mus. Par., nov. sp.

(PLANCHE I, fig. 4.)

Le corps est d'un gris bleu ardoisé; nageoire dorsale avec des taches rouges et d'autres jaunes sur le bord supérieur; tête et nageoires rosées; une tache d'un rouge foncé sur la base de la pectorale; nageoire caudale obscure avec un bord terminal lilas; ventre d'un blanc grisâtre.

Rio-de-Janeiro.

GENRE HOLOCENTRUM.

N° 1. HOLOCENTRUM CORNIGERUM, Cuv., Val., t. VIII, p. 481.

Corniger spinosus, Spix, pl. 75.

Beau poisson d'un rouge foncé, surtout sur le dos; ventre d'un rose obscur.

Rio-de-Janeiro.

GENRE PERCOPHIS.

N° 1. PERCOPHIS FABRE, Quoy et Gaymard, Voy. Freycinet, Zool., p. 354, pl. 53, fig. 1 et 2.

Percophis brasiliensis, Cuv., Val., t. III, p. 281.

Lilas avec des taches vermiculaires brunes; ventre argenté; queue un peu obscure.

Rio-de-Janeiro.

GENRE RYPTICUS.

N° 1. RYPTICUS MICROPS, Brisssonet, *Encyclop. (Perc.)*.*Anthias saponarius*, Schneid., édit. Bloch, p. 310, n° 20.

Ce poisson est connu à Bahia sous le nom de *Sabaô*. Ce mot signifie, en portugais, *savon*, et se rapporte à sa peau gluante et écumeuse. Il est violet, avec le dos et les nageoires plus obscures et presque noires; la gorge est rougeâtre; les yeux d'un jaune clair; tout le corps est couvert de marbrures obscures. J'en ai rapporté une variété où les taches forment des sortes de bandes longitudinales.

Fréquent dans le mois de février et de mars.

GENRE DULES.

N° 1. DULES ATRIA, Cuv., Val., t. III, p. 412.

Rio-de-Janeiro.

GENRE SPHYROENA.

N° 1. SPHYROENA BARRACUDA, Shaw (*Essex*); Catesby, t. II, pl. t, fig. 1; Sloane, *Hist. nat. Jamaïq.*, t. II, p. 155, pl. 347, fig. 3.

Connu à Bahia sous le nom de *Solteira*, d'un gris ardoisé; yeux d'un jaune clair; ventre blanc.

N° 2. SPHYROENA BECUNA, Schneider, Bloch, p. 109.

Sphyrene becuna, Lacép.; *Picuda*, Parra, p. 94.

Violet clair en dessus; une bande longitudinale jaune de chaque côté; tête et ventre bleus.

Rio-de-Janeiro.

GENRE UPENEUS.

N° 1. UPENEUS MACULATUS, Bloch (*Mullus*), pl. 349, fig. 1.*Pera metara*, Margrave, p. 156 et 181.

D'un beau rouge; nageoires et joues nuancées de jaune; ventre blanc avec des lignes longitudinales jaunes; quelques lignes obliques et violettes devant et sous les yeux; deux taches noires de chaque côté, l'une sous la première et l'autre sous la seconde dorsale.

Rio-de-Janeiro.

N° 2. UPENEUS METARA, Cuv., Val., t. III, p. 478.

Lilas; ventre et nageoires jaunes; la caudale nuancée de rouge; quelques lignes violettes et obliques devant les yeux.

Toute la côte du Brésil depuis Rio-de-Janeiro jusqu'à Bahia; il porte le nom de *Serambuleta*. Il est surtout commun vers le mois de mars.

FAMILLE DES JOUES CUIRASSÉES.

GENRE DACTYLOPTERUS.

N° 1. DACTYLOPTERUS VOLITANS, Linn. (*Trigla*).

Mitcipira et *Pirabrêbe*, Maugrave, p. 162.

Corps brun, tacheté de bleu; ventre blanc avec trois larges bandes transversales brunes; nageoires ventrales et quelquefois une partie du ventre d'un rouge vif; pectorales noires avec des taches et quelques lignes transversales blanches.

Connu sous le nom d'*Aroador*.

Rio-de-Janeiro et Bahia.

GENRE PRIONOTUS.

N° 1. PRIONOTUS PUNCTATUS, Bloch (*Trigla*), pl. 352; Cuv., Val., t. IV, p. 93.

Gris marbré de brun; la ventrale ordinairement bordée de bleu.

Rio et Bahia.

GENRE SCORPÆNA.

N° 1. SCORPÆNA HASCASIO, Parra, *Description*, p. 34, pl. 18, fig. 1.

Scorpena gibbosa? Bloch, Schneider, p. 102, pl. 44.

Scorpena Plumieri, Bloch, Nauc. *Mém. Stock.*, t. X.

Scorpena bufo, Cuv., Val., t. IV, p. 306.

Brun; sur le corps, deux larges bandes transversales irrégulières obscures; sur la queue, trois ou quatre semblables; dessous du corps et bouche rouges; côtés de la tête et opercules verts; une tache arrondie noire sur la dorsale, entre la sixième et la septième épine; nageoires variées et marbrées de vert, de brun et de rouge.

Ce poisson, connu à Bahia sous le nom de *Beatinha*, est médiocrement bon à manger. Il atteint plus de 60 centimètres de long.

N° 2. SCORPÆNA BRASILIENSIS, Cuv., Val., t. IV, p. 305.

D'un gris violacé; trois ou quatre bandes transversales brunes sur le dos et deux sur la queue; cette dernière et le dessous du corps rouges; la dorsale variée de jaune.

Je rapporte à cette espèce, comme jeune âge, un tout petit individu de Rio-de-Janeiro, de même que le précédent, dont le corps est d'un lilas clair, couvert de taches plus ou moins arrondies, jaunes, bordées de noir; il n'y a que des vestiges, des bandes du corps, mais celles de la queue sont bien marquées; le ventre rosé ainsi que la bouche; les nageoires sont jaunes, marbrées de brun.

FAMILLE DES SCIÉNOÏDES.

GENRE UMBRINA.

N° 1. UMBRINA ARENATA, Cuv., Val., t. V, p. 100.

Rio-de-Janeiro.

N° 2. UMBRINA COROÏDES, Cuv., Val., t. V, p. 187.

Petoto? Humboldt, *Observ. zool.*, t. II, p. 189.

Rio-de-Janeiro.

GENRE PRISTIPOMA.

N° 1. PRISTIPOMA RUBRUM, Cuv., Val., t. V, p. 283.

Rio-de-Janeiro.

N° 2. PRISTIPOMA ACARA PINIMA, Margrave, p. 152.

Sparus virginicus, Linn.

Perca juba et *Sparus vittatus*, Bloch.

Lutjan virginien et *Sparus juba*, Lacép., Catesby, pl. 6, fig. 1??

Sparus vittatus, Bloch, pl. 263.

Grammistes Mauriti, Bloch, Schneider, p. 185.

Perca juba, Bloch, pl. 308, fig. 2.

Guacuba juba? Margrave, p. 153.

Pristipoma rode, Cuv., Val., t. V, p. 274.

Ce joli *Pristipome* est connu à Bahia sous le nom de *Freade*, qui signifie *moine*. Il est commun dans les mois de janvier, février et mars; sa chair est très estimée. Il est d'un brun argenté, avec six ou sept bandes longitudinales d'un jaune doré; les nageoires sont jaunes; on remarque deux bandes transversales obliques, assez larges et noires, situées l'une au-dessus de l'œil et l'autre un peu en arrière de l'opercule; les yeux sont blancs.

N° 3. PRISTIPOMA BICOLOR, nov. sp.

(PLANCHE II, fig. 2.)

Ressemble au précédent pour la forme, mais le corps est d'un jaune clair marqué de six bandes longitudinales noires; à la base de la nageoire caudale on voit

une tache ronde de cette dernière couleur, et les nageoires, ainsi que la tête, sont obscures et d'un violet presque noir; sur les joues quelques nuances jaunes.

J'ai observé cette espèce à Bahia, particulièrement vers le mois de mars; elle est connue sous le nom de *Maria-Preta*; sa chair n'est pas estimée.

GENRE POMACENTRUS.

N° 1. POMACENTRUS FUSCUS, Cuv., Val., t. V, p. 432.

Brun; tête et nageoires inférieures plus obscures; ventre plus clair que le dos.
Rio-de-Janeiro.

N° 2. POMACENTRUS VARIABILIS, nov. sp.

(PLANCHE III, fig. 3.)

Ce poisson est d'assez petite taille; on le connaît à Bahia sous le nom de *Maria-Molle*; il est surtout commun au marché dans le mois de février. Sa chair est assez estimée; sa couleur est brune en dessus, et cette couleur passe au jaune vers les parties inférieures du corps; on observe sur le dos, en avant de la nageoire, une tache arrondie et noire; quelquefois le ventre est brun comme le dos.

N° 3. POMACENTRUS PICTUS, nov. sp.

(PLANCHE II, fig. 1.)

Diffère du précédent par sa couleur entièrement noire et sa queue dont la partie supérieure est d'un jaune-citron.

NOTA. — Dans ces deux *Pomacentrus*, qui ne sont peut-être que des variétés l'un de l'autre, la nageoire dorsale est formée de 12 aiguillons et de 14 rayons; la ventrale, de 2 épines dont la première courte et la seconde très forte, et de 12 rayons.

GENRE HELIASIS.

N° 1. HELIASIS MARGINATA, nov. sp.

(PLANCHE III, fig. 1.)

Longueur totale, 10 centimètres. Brun en dessus, argenté jaunâtre sur les côtés et en dessous. Nageoire dorsale formée de 11 aiguillons et de 12 rayons: elle est brune, à l'exception des trois derniers rayons qui sont blancs; la nageoire caudale est très fourchue et blanche, avec une bordure latérale d'un brun noir; ventrale blanche, formée de deux épines, dont la première fort courte, et de 11 rayons; les ventrales composées d'une épine et de 5 rayons; les pectorales longues, blanches, et formées de 11 rayons.

Bahia.

GENRE EQUES.

N° 1. EQUES LANCEOLATUS, Linn. (*Chetodon*).

Eques americanus, Bloch, t. X, p. 76, pl. 347.

Eques balteatus, Cuv., Val., t. V, p. 165; Edwards, pl. 210; Parra, pl. 2, fig. 2.

Connu à Bahia sous le nom de *Maria-Naga*, à cause des bandes obliques de la tête que l'on a comparées aux lignes tatouées de la joue des nègres de la nation des *Nagos*, dont un grand nombre est réduit en esclavage dans cette partie du Brésil. Ce poisson se voit rarement au marché, ce qui tient peut-être à ce qu'il se putréfie d'une manière presque instantanée. Ses jolies couleurs sont assez bien représentées dans Bloch. Sa forme est tellement différente de celle des autres *Chevaliers*, que je ne doute pas qu'on ne l'érige par la suite en genre particulier.

N° 2. EQUES ACUMINATUS, Bloch, Schneider, p. 184 (*Grammistes*); Seba, t. III, pl. 26, fig. 33.

Eques lineatus, Cuv., Val., t. V, p. 169.

Corps d'un gris ardoisé, avec des bandes longitudinales plus obscures; la queue avec une bordure noire.

Rare à Bahia.

GENRE HOEMULON.

N° 1. HOEMULON FORMOSUS, Bloch (*Anthias*), pl. 323.

Hemulon elegans, Cuv., Val., t. V, p. 227.

Capeuna, Margr., *Bras.* (mais non la figure).

Forme allongée; corps d'un gris bleuâtre en dessus avec une grande tache ovale noire à la base de la nageoire caudale; sur le corps, plusieurs lignes longitudinales d'un jaune doré, et deux bandes semblables de même couleur, l'une au-dessus de l'œil et l'autre passant par celui-ci; les nageoires d'un jaune sale; celle de la queue obscure; intérieur de la bouche et côtés de la mandibule inférieure d'un rouge vif.

Connu à Bahia sous le nom de *Quatinga*. Je l'ai observé de janvier à mars.

N° 2. HOEMULON PARVE, Desmarest (*Dinabasis*), 1^{re} décade, *Ichthyol.*, et *Dict. cl. d'hist. nat.*

Acara pitanga, Margrave, p. 177.

Hemulon caudimaculatum, Cuv., Val., t. V, p. 236.

Ressemble sous tous les rapports de coloration au précédent, mais en diffère par sa forme beaucoup plus courte et plus ramassée.

Connu à Bahia sous le nom de *Carapato branco*; il est bon à manger.

NOTA. — Je rapporte à cette espèce un petit individu dans lequel les bandes longitudinales jaunes ne sont représentées que par des séries de taches un peu obscures et très peu marquées; la bouche n'est pas rouge. Si ce n'est pas, comme je le crois, le jeune âge du *Para*, je propose de le nommer *Hamulon similis*. Il vient également de Bahia.

N° 3. *HEMULON CANNA*, Agassiz, *Poissons de Spix*, pl. 69; Cuv., Val., t. V, p. 233.

Blanc; sur tout le corps des lignes d'un jaune doré qui deviennent obliques vers la partie supérieure du corps; nageoires inférieures et caudale un peu obscures.

Connu également à Bahia sous le nom de *Carapato branco*. Fréquent au mois de janvier.

N° 4. *HEMULON AUROLINEATUM*, Cuv., Val., t. V, p. 237.

Bleu clair; de nombreuses lignes d'un jaune doré, longitudinales sur la tête, et obliques et flexueuses sur le corps; nageoires jaunes; une tache arrondie et noire à la base de la caudale.

Connu à Bahia sous le nom de *Carapato*, qui s'applique à tous les *Hamulons*; il est très médiocre à manger.

GENRE GLYPHYSODON.

N° 1. *GLYPHYSODON SAXATILIS*, Linn. (*Chetodon*).

Chetodon marginatus et *Mauritii*, Bloch??

On a établi qu'il n'y avait qu'une espèce de *Glyphysodon* au Brésil, et dès lors on a rapporté au *saxatilis* tous les individus de ce genre qu'on s'y est procurés; mais je crois que l'on a ainsi confondu ensemble plusieurs espèces distinctes, et je suis loin d'être assuré avec MM. Cuvier et Valenciennes, que l'on doit réunir en une espèce les *Chetodon marginatus* et *Mauritii*. J'ai rapporté du Brésil deux *Glyphysodon*: l'un de Rio, à corps d'un cendré très obscur, avec le bord des écailles noir, le dessus de la tête et des bandes longitudinales larges et noires: elles sont au nombre de quatre sur le corps et de deux sur la queue; l'autre de Bahia, jaune en dessus, cendré et argenté en dessous; il a sur le dos cinq bandes transversales noires dont l'une à la base de la queue. On le désigne sous le nom de *Piabinha*.

GENRE JOHNIUS.

N° 1. *JOHNIUS GROUVINA*, nov. sp.

(PLANCHE V, fig 1.)

Longueur totale, 44 centimètres; plus grande hauteur, 11 centimètres; Première dorsale formée de 9 aiguillons; deuxième, d'un aiguillon et de 32 rayons;

caudale de 17 rayons; anale d'un aiguillon et de 7 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorale de 16 rayons.

Corps argenté à reflets bleus. Nageoire dorsale d'un noir ardoisé, avec une teinte rouge au milieu, dans le sens de la longueur; quene et nageoire ventrale d'un rouge obscur; nageoires pectorales hyalines et transparentes; partie postérieure du corps à reflets rouges et dorés; une tarbe noire et en demi-cercle derrière la base de la nageoire pectorale; oeil jaune à reflets verts; quene arrondie, écailleuse.

Nous avons vu ce poisson, pour la première fois, dans le rio Crivas, et depuis nous l'avons pris dans l'Araguay. Il est fort bon à manger, et les pêcheurs le désignent sous le nom de *Craucina*. Ils le désignent aussi sous le nom de *poisson ayant deux pierres dans la tête*. Quelques individus atteignent 80 centimètres de long.

N° 2. JOHNIUS AMAZONIENS, nov. sp.

(PLANCHE IV, fig. 1.)

Longueur totale, 25 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande largeur du corps, 6 centimètres. Première dorsale, 9 aiguillons; deuxième dorsale, un aiguillon et 34 rayons; nageoire caudale, 17 rayons; nageoire anale, un aiguillon et 7 rayons; nageoire ventrale, un aiguillon et 5 rayons; pectorale, 16 rayons.

Ressemble beaucoup au précédent; opercule triangulaire; la membrane de l'opercule se prolonge en une espèce de pointe derrière le deuxième angle de celui-ci; la queue a ses rayons du milieu plus prolongés que les autres; la tache noire sous la base de la pectorale est peu visible.

De l'Amazonie.

N° 3. JOHNIUS ACHATIS, nov. sp.

(PLANCHE IV, fig. 2.)

Longueur totale, 27 centimètres; plus grande hauteur, 6 centimètres $\frac{1}{2}$. Première nageoire dorsale, 9 aiguillons; deuxième dorsale, un aiguillon et 36 rayons; nageoire caudale, 17 rayons; anale, un aiguillon et 7 rayons; ventrale, un aiguillon et 5 rayons; pectorale, 18 rayons.

Ressemble encore beaucoup aux deux précédents; le corps est un peu plus haut à proportion; la teinte générale est dorée; la queue est fortement prolongée au milieu; la ligne latérale est plus courbe.

De l'Ucayala.

NOTA — Dans ces trois espèces, la ligne latérale se prolonge jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale.

Dans la *Craucina*, les grosses dents sont assez peu nombreuses, mais fortes et coniques.

Dans l'*amazonicus*, elles sont également assez rares, mais très aiguës.

Dans l'*auratus*, enfin, elles sont nombreuses, épaisses et obtuses.

On peut reconnaître ces trois espèces par les caractères suivants :

Caudale	{ arrondie.	<i>Crouvina.</i>
	{ ou anglé à l'opercule.	<i>Auratus.</i>
	{ pointue { deux angles à l'opercule.	<i>Amazonicus.</i>

GENRE CHROMYS.

N° 1. *CHROMYS PUNCTATA*? Bloch (*Lobrus*), pl. 295.

Dorsale de 14 aiguillons et 8 rayons; caudale de 16 rayons; anale de 3 aiguillons et 5 rayons; pectorale de 12 rayons.

Longueur totale, 10 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande longueur du corps, 4 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la pectorale, 2 centimètres $\frac{1}{2}$.

Forme ovulaire, un peu élevée; corps d'un jaune sale devenant d'un brun clair sur le dos; yeux d'un brun rouge; une tache un peu obscure vers l'extrémité de la dorsale; sur le corps, quatre taches arrondies noires, rangées longitudinalement; queue piquetée de noir; ventre d'un blanc jaunâtre; la pectorale un peu allongée.

Ce poisson a été trouvé dans le Tocantins; il est connu sous le nom de *Carao do corgo*.

N° 2. *CHROMYS UNIPUNCTATA*, nov. sp.

(PLANCHE VIII, fig. 2.)

Dorsale de 13 aiguillons et 11 rayons; caudale de 16 rayons; anale de 3 aiguillons et de 7 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorale de 13 rayons.

Longueur totale, 10 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande hauteur, 3 centimètres; longueur de la pectorale, 2 centimètres $\frac{1}{2}$.

Ressemble beaucoup au précédent; d'un jaune sale devenant d'un brun clair sur le dos; une seule tache arrondie et noire de chaque côté du corps; queue pointillée de noir.

Du rio Paraguassu, dans la province de Bahia.

N° 3. *CHROMYS UNIMACULATA*, nov. sp.

(PLANCHE VII, fig. 2.)

Dorsale de 16 aiguillons et de 10 rayons; caudale de 16 rayons; anale de 3 aiguillons et de 8 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorale de 14 rayons.

Longueur totale, 16 centimètres; plus grande hauteur, 5 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la pectorale, 4 centimètres.

Corps ovulaire, mais très élevé au-dessus des yeux. Une grande tache obscure et arrondie de chaque côté, vers le milieu du corps; queue pointillée de noir; nageoires ventrales prolongées; les premiers rayons ayant 4 centimètres $\frac{1}{2}$.

Je n'ai pas de dessin de ce poisson fait sur le frais; mais il paraît avoir été d'un jaune sale, probablement brun sur le dos.

Il vient des eaux douces des environs de Rio-de-Janeiro.

N° 4. *CHROMYS OBSCURA*, nov. sp.

(PLANCHE VI, fig. 2.)

Dorsale de 14 épines et 12 rayons; caudale de 16 rayons; anale de 3 épines et 8 rayons; ventrales d'une épine et 5 rayons; pectorales de 14 rayons.

Longueur totale, 14 centimètres; plus grande hauteur, 7 centimètres; longueur de la pectorale, 3 centimètres $\frac{1}{2}$.

Corps élevé, paraissant avoir été entièrement d'un brun chocolat; la dorsale et la ventrale grandes et se prolongeant en arrière; la caudale assez longue et ayant des lignes transversales sous la ventrale de 3 centimètres de long.

Du rio Paraguassu (province de Bahia).

N° 5. *CHROMYS OBLONGA*, nov. sp.

Dorsale de 15 aiguillons et de 8 rayons; caudale de 15 rayons; anale de 7 aiguillons et de 7 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorales...

Longueur totale, 12 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande hauteur, 4 centimètres.

Cette espèce est remarquable par la forme très allongée de son corps, qui s'élève au-dessus de la tête, puis se prolonge de hauteur égale jusque vers les trois quarts postérieurs du corps.

Je n'ai rapporté qu'un individu, dans le plus mauvais état, de cette espèce; il n'a plus ni écailles, ni nageoires pectorales. On le trouve dans le Tocantins (province de Goyaz).

N° 6. *CHROMYS PROXIMA*, nov. sp.

(PLANCHE VII, fig. 1.)

Dorsale de 16 aiguillons et de 12 rayons; caudale de 15 rayons; anale de 3 aiguillons et de 7 rayons; ventrales d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorales de 14 rayons.

Longueur totale, 18 centimètres; plus grande hauteur, 6 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la pectorale, 6 centimètres $\frac{1}{2}$; celle de la ventrale, 5 centimètres.

Ressemble beaucoup à *l'aminaculata*, mais s'en distingue par le corps plus ovulaire et beaucoup moins élevé au-dessus des yeux; la tache obscure des côtés est située plus en avant; les pectorales sont beaucoup plus longues ainsi que les ventrales; la dorsale est aussi plus prolongée en arrière, et la queue ne semble pas avoir été piquetée de noir.

Le corps paraît avoir été d'un jaune sale, probablement brun sur le dos, et le ventre blanchâtre.

Ce poisson vient d'un lac près de l'Ucayale, dans la mission de Sarayacu, au Pérou. Il paraît voisin du *Centrarchus cyclo* de Schomb. (*Poissons de la Guyane*, t. II, pl. 11), mais en diffère par la forme des pectorales, etc.

N° 7. *CHROMYS UCAYALENSIS*, nov. sp.

(PLANCHE VI, fig. 2.)

Dorsale de 11 aiguillons et de 13 rayons; caudale de 14 rayons; anale de 3 très forts aiguillons et de 10 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorale de 13 rayons.

Longueur totale, 20 centimètres; plus grande hauteur, 8 centimètres; longueur de la pectorale, 7 centimètres $\frac{1}{2}$; de la ventrale, 4 centimètres $\frac{1}{2}$.

Corps de forme ovulaire, couvert de grandes écailles; il semble avoir été doré et éclatant avec le dos obscur; les nageoires dorsales et ventrales sont couvertes de taches obscures et violettes qui forment des sortes de bandes obliques.

Cette espèce est remarquable par la très grande longueur des nageoires pectorales et ventrales. Elle vient de Sarayacu (Pérou).

N° 8. *CHROMYS UNIOCELLATA*, nov. sp.

(PLANCHE VI, fig. 1.)

Dorsale de 15 aiguillons et de 10 rayons; caudale de 19 rayons; anale de 3 aiguillons et de 7 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorale de 15 rayons.

Longueur totale, 17 centimètres; plus grande hauteur, 6 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la pectorale, 6 centimètres; longueur de la ventrale, également 6 centimètres.

Corps de forme ovulaire, un peu allongé; écailles grandes; couleur de l'animal conservé dans la liqueur, d'un brun chocolat obscur avec une tache ocellée sur le dos à la base de la nageoire dorsale; le ventre paraît avoir été plus clair et les opercules dorés.

Du rio Ucayale, mission de Sarayacu.

N° 9. *CHROMYS APPENDICULATA*, nov. sp.

(PLANCHE VII, fig. 3.)

Dorsale de 15 aiguillons et de 12 rayons; caudale de 15 rayons; anale de 8 aiguillons et de 13 rayons; ventrale de 5 rayons et d'un aiguillon; pectorales de 12 rayons.

Longueur totale, 18 centimètres; plus grande hauteur, 8 centimètres; longueur de la pectorale, 5 centimètres; longueur de la ventrale, 7 centimètres $\frac{1}{2}$.

Le corps est très élevé en proportion de la longueur; les nageoires dorsales et

ventrales sont très prolongées en arrière; la caudale est aussi longue; la pectorale plus courte que dans l'espèce précédente, mais la ventrale ayant son premier rayon prolongé en filet. Le corps est d'un brun chocolat, mais il semble avoir été varié d'une nuance plus claire.

De l'Ucayale (Pérou).

N° 10. CHROMYS OCELLATA, Spix (Labate), pl. 68.

Cyelia rubro ocellata? Schomb. (Fishes of Guyana), t. II, pl. 40.

Ressemble beaucoup à l'*umiozellata*, mais en diffère par sa forme beaucoup plus allongée; ses nageoires dorsales et pectorales moins prolongées en arrière; la ventrale également beaucoup moins prolongée. Les taches ocellées de la dorsale varient pour le nombre et la forme, mais elles manquent entièrement dans l'*umiozellata*.

De l'Amazone et de l'Ucayale.

N° 11. CHROMYS LAPIDIFERA, nov. sp.

(PLANCHE VII, fig. 1.)

Longueur totale, 19 centimètres; plus grande hauteur, 5 centimètres.

Dorsale de 13 épines et de 11 rayons prolongés; caudale grande, à rayons difficiles à distinguer, mais paraissant au nombre de 15 à 16; anale de 6 rayons prolongés et de 3 épines; ventrales de 6 rayons; pectorales prolongées de 15 rayons; tête très élevée et très bombée derrière les yeux; bouche un peu prostratile.

J'ai fait, sur l'Araguay, le dessin de ce poisson connu des pêcheurs sous le nom de *Wacara*, et qui ressemble à quelques espèces du genre *Cyelia*. Il est court, épais, à très grosse tête, et sa forme rappelle celle de certains *Siluroides* du genre *Hypostome*. Sa couleur est verte, avec cinq larges bandes plus foncées sur le dos; le ventre est blanc; les côtés de la tête sont jaunes et le dessous orange; devant les yeux on voit deux traits obliques et bleus; la nageoire dorsale est grande, bordée en dessus de rouge, et présente vers la partie postérieure une tache noire; toutes les nageoires sont obscures.

Ce poisson a été pris dans la grande cascade de l'Araguay (*l'axocira grande*). Il porte à terre une grande quantité de pierres de la grosseur du bout du doigt, et en forme un lit sur lequel il dépose ses œufs, qui ressemblent, par leur forme et leur couleur, à la graine de moutarde. Il porte ces pierres une à une dans la bouche.

N° 12. CHROMYS?? ACORA, nov. sp.

(PLANCHE IX, fig. 1.)

J'ai fait, sur l'Araguay, le dessin d'un joli petit poisson que je ne rapporte à ce genre que provisoirement. Il a le corps haut et les nageoires dorsales et pectorales prolongées en longues pointes, ce qui lui donne un peu la forme d'un *Squamipenne*. Le corps est blanc, orné de taches transversales violettes; une bande oblique noire commence derrière l'œil et va rejoindre la nageoire dorsale; une tache transversale et noire se voit à la base de la nageoire caudale; celle-ci est jaune avec deux bandes transversales brunes dont l'une est terminale; la nageoire anale est bordée de brun orangé et présente une large tache d'un noir violet.

Ce poisson, qui constitue sans doute un nouveau genre, vient des lacs de l'Araguay. Il vit sur la surface de l'eau, au milieu des hautes herbes, et reste couché sur le flanc; lorsqu'il est inquiet, il s'élance en l'air par sauts prolongés. Les sauvages le désignent sous le nom d'*Acora*.

N° 43. CHROMYS?? FASCIATA, nov. sp.

(PLANCHE IX, fig. 2.)

Je n'ai encore rapporté de cette espèce de l'Araguay qu'un dessin très imparfait, les individus ayant été perdus avec presque toutes nos collections de ces parties.

Ce poisson a encore le faciès d'un *Squamipenne*; il a une forme haute et comprimée, avec les nageoires dorsales et pectorales prolongées. Il est d'un jaune clair, couvert de points bruns et ayant six bandes transversales noirâtres; les nageoires sont variées de cette couleur.

GENRE CYCLA.

N° 1. CYCLA TOUCOUNARAI, nov. sp.

(PLANCHE X, fig. 1.)

Longueur totale, 35 centimètres; plus grande hauteur du corps, 10 centimètres; nageoires pectorales, 7 centimètres; nageoires ventrales, 7 centimètres de long.

Nageoire dorsale de 15 aiguillons et de 17 rayons; caudale de 17 rayons; anale de 2 aiguillons et de 11 rayons; ventrales de 1 aiguillon et de 5 rayons; pectorales de 14 rayons.

Le corps est couvert d'écailles assez grandes pour le genre; on en compte de 72 à 75 par ligne longitudinale.

La couleur générale est brune, passant au jaune vers la partie inférieure des flancs, et au blanc sur le ventre; en dessus on remarque quatre larges bandes

transversales noires qui s'étendent jusqu'aux deux tiers de la hauteur du poisson, et sur la base de la nageoire caudale une grande tache ocellée noire, entourée d'un cercle jaune vif. Les yeux sont de cette dernière couleur. Les membranes de la mâchoire inférieure et de l'opercule sont roses. Les nageoires supérieures sont nuancées de jaune ; l'anale est piquetée de rouge et de noir ; la queue a deux zones longitudinales obscures.

Nous avons trouvé, pour la première fois, ce poisson dans le lac des Perles de la province de Goyaz, puis nous l'avons retrouvé dans le Tocantins, et enfin dans l'Amazone. Il est partout connu sous le nom de *Toucoumarai*. Les Chambias de l'Araguay lui donnent le nom de *Kini-teray*. Sa chair est fort bonne, et il atteint quelquefois le double de la longueur que nous venons d'indiquer.

Ce n'est qu'avec doute que j'établis ce poisson comme une espèce nouvelle, car il est certainement très voisin du *Cycla nouoculus*, Spix (*Poissons du Brésil*, pl. 63), mais en diffère par l'absence constante des taches du ventre ; ce que je puis assurer, en ayant vu une immense quantité d'individus. Il paraît aussi excessivement voisin du *Cycla Flavomaculata* de Schomb. (*Fishes of Guyana*, pl. 6), mais en diffère par l'absence de points jaunes sur le corps, la coloration, etc., etc. Il est cependant possible que toutes ces espèces doivent être réunies en une seule. Enfin le *Sparus saxatilis* de Linné, dont Bloch a fait une *Perca* (pl. 309), semble encore être très voisin de notre poisson : c'est le *Paon* de l'*Encyclopédie méthodique*, pl. 48, fig. 184.

N° 2. CYCLA MULTIFASCIATA, nov. sp.

(PLANCHE X, fig. 2.)

Longueur totale, 14 centimètres ; plus grande hauteur, 2 centimètres !.

Je décris ce poisson sur le dessin d'un individu que nous avons trouvé dans un des affluents de l'Ucayale. Il ressemble beaucoup au *Toucoumarai*, mais en diffère par sa forme beaucoup plus allongée et ses bandes, qui sont obliques et au nombre de onze ; le dessus de la tête est noir, les côtés verts, le dessous blanc ; le corps est vert et les bandes noires ; le ventre est blanc, les nageoires vertes ; une tache ocellée comme dans le *Toucoumarai*.

De l'Ucayale (Pérou).

N° 3. CYCLA CONIBOS, nov. sp.

(PLANCHE X, fig. 3.)

Corps très allongé ; longueur totale, 12 centimètres ; plus grande hauteur, 2 centimètres. Ressemble beaucoup aux précédents, et a encore la tache ocellée ; corps vert à sept bandes obliques et noires ; les nageoires jaunes, les ventrales blanches

de même que le ventre; la queue échancrée et ayant quatre bandes transversales obscures.

De l'Ucayale.

N° 4. CYCLA LABRINA, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 43; Schomb., *Fishes of Guyana*, t. II, pl. 3.

La tache de la base de la queue disparaît quelquefois.

De l'Amazone.

N° 5. CYCLA LACUSTRIS, nov. sp.

(PLANCHE VII, fig. 3.)

Longueur totale, 16 centimètres; plus grande hauteur, 2 centimètres $\frac{1}{2}$.

Nageoire dorsale formée de 18 épines et de 13 rayons; elle est piquetée de violet à sa base et offre souvent une large tache arrondie, de même couleur, vers son milieu; nageoire caudale de 16 rayons; anale de 2 épines et de 9 rayons; ventrale de 5 rayons; pectorale de 16 rayons.

Conservé dans l'esprit-de-vin, tout le corps paraît d'un brun lilas, le ventre châtain; le dos piqueté longitudinalement de brun; une tache ocellée noire à la base de la queue.

Du Dique, ou étang près de Bahia.

FAMILLE DES SQUAMIPENNES.

GENRE CHETODON.

N° 1. CHETODON STRIATUS, Linné; Seba, t. III, pl. 25, fig. 9; Bloch, pl. 205, fig. 1; *Encyclop.*, pl. 37, fig. 177; Cuv., Val., t. VII, p. 10.

A Bahia; observé en septembre, janvier et mars.

GENRE HOLACANTHUS.

N° 1. HOLACANTHUS TRICOLOR, Bloch (*Chetodon*), pl. 426; Cuv., Val., t. VII, p. 102.

D'un beau jaune; manteau d'un noir de velours; nageoires dorsale et anale bordées de rouge; épine du préopercule de cette dernière couleur.

Commun à Bahia dans les mois de septembre, novembre et mars. Il est connu sous le nom de *Soldado*.

N° 2. HOLACANTHUS FORMOSUS, nov. sp.

(PLANCHE XI, fig. 2.)

Corps d'un brun violet, avec la queue, le devant de la tête, la partie antérieure du ventre, les nageoires caudales, pectorales et ventrales d'un jaune brillant. Sur

la tête, une large bande transversale noire, bordée de bleu, qui traverse les yeux; sur le corps, quatre bandes transversales bleues, dont la première est située un peu en avant de la moitié du corps et les trois autres en arrière. La nageoire dorsale est, dans la partie non prolongée, rouge, finement bordée de bleu; la partie prolongée est d'un bleu obscur, avec sa pointe rouge; l'anale également d'un bleu obscur.

La dorsale de 8 épines et de 25 rayons; la caudale de 20 rayons; ventrales de 2 épines et 21 rayons; anale formée d'une épine et de 5 rayons; pectorales de 15 rayons.

Longueur totale, 19 centimètres; plus grande hauteur, 7 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la pectorale, 4 centimètres.

Corps ovalaire; queue échancrée.

J'ai observé ce joli poisson à Bahia, dans les mois d'octobre, de novembre, de janvier et de mars.

GENRE POMACANTHUS.

N° 1. POMACANTHUS CINGULATUS, Cuv., Val., t. VII, p. 210.

Pomacanthus lutescens, Bon., *Encyclop.*, p. 182.

Pomacanthus jaunâtre, Lacép., t. IV, p. 518.

Gris, avec une bande étroite transversale et blanche; une semblable à la base de la nageoire caudale, qui est aussi terminée par du blanc; devant de la tête marron; une bande jaune sur la bouche.

Confondu à Bahia avec toute la famille des *Chetodonts* sous le nom de *Barbeiro*; de même que tous ses congénères, il est assez mauvais à manger.

N° 2. POMACANTHUS ARCATUS, Linné (*Chetodon*); Bloch, pl. 201, fig. 2; Bon., *Encyclop.*, p. 184, fig. 169.

Commun à Bahia, en octobre et novembre.

NOTA. — Le jeune âge n'a pas les nageoires dorsale et anale prolongées.

N° 3. POMACANTHUS QUINQUECINCTIS, Cuv., Val., t. VII, p. 210; Margrave, livr. 4, p. 178; Seba, t. III, pl. 26, fig. 5.

Diffère du précédent par sa couleur d'un noir verdâtre, le liséré jaune qui orne les écailles du milieu du corps, et la forme de la nageoire anale dont le prolongement se termine non en pointe, mais d'une manière arrondie.

GENRE EPHIPPUS.

N° 1. EPHIPPUS GIGAS, Cuv., Val., t. VII, p. 121; Agassiz, *Poissons de Spix*, pl. 61.

Habite Bahia.

N° 2. *EPHIPPUS FABER*, Linn., Cuv., Val., L. VII. p. 113.

Cette espèce semble varier, probablement suivant l'âge, quant à la forme des nageoires dorsale et anale, qui sont quelquefois échancrées et prolongées en pointes.

Habite toute la côte du Brésil.

GENRE PLATAXOÏDES, nov. gen.

Point de dents au palais; celles de la mâchoire supérieure au nombre de neuf de chaque côté, assez fortes et aiguës; celles de la mâchoire inférieure fines; de chaque côté, et en avant, une grande et arquée à cette même mâchoire. Corps très élevé, très comprimé. Dorsale et ventrale munies de longs filets prolongés.

Ce genre vient à côté de celui de *Platax*.

N° 1. *PLATAXOÏDES DUMERILII*, nov. sp.

(PLANCHE XI, fig. 3.)

Longueur totale, 6 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande hauteur, 4 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur du prolongement de la dorsale, 5 centimètres; longueur du prolongement de la ventrale, 7 centimètres $\frac{1}{2}$. Corps haut, très aplati, argenté.

Dorsale unique formée de 10 épines suivies de 2 rayons non prolongés et de 21 autres dont les premiers prolongés en filaments très longs, et les suivants allant toujours en diminuant avec la queue; la caudale arrondie, de 16 rayons; l'anale de 6 épines et de 24 rayons branchus. Les trois nageoires dont nous venons de parler sont obscures, avec des bandes transversales claires; la caudale en a 4; la ventrale est formée d'une forte épine et de 5 rayons dont les deux premiers ont un prolongement plus long que le corps entier; les pectorales, assez courtes, de 9 rayons. Tout le corps couvert d'écaillés assez grandes.

Trouvé au Para.

FAMILLE DES SPAROÏDES.

GENRE SARGUS.

N° 1. *SARGUS UNIMACULATUS*, Bloch (*Perca*), pl. 308, fig. 1.

Sparc salin, Lacép., t. IV, p. 136.

D'un bleu clair, avec des lignes longitudinales dorées; tête brune ainsi que les nageoires; une tache noire grande et arrondie au-dessus de la pectorale.

Rio-de-Janeiro.



FAMILLE DES MÉNIDES.

GENRE GERRES.

N° 1. GERRES PLUMIERI, Cuv., Val., t. V, pl. 167, p. 56.

Je ne suis pas bien certain que ce *Gerres* soit le *Plumieri*, car il diffère de la figure que je viens de citer par l'absence de petites zones longitudinales. Il est entièrement d'un gris blanc, avec la tête et la nageoire dorsale un peu jaunâtres; œil d'un jaune clair.

Bahia.

FAMILLE DES SCOMBÉROÏDES.

GENRE CARANX.

N° 1. CARANX PISQUETUS, Cuv., Val., t. IX, p. 97.

En dessus, d'un beau bleu clair; ventre argenté; nageoires caudale et pectorales jaunes.

Connu à Bahia sous le nom de *Solteira*; il est également commun à Rio-de-Janeiro. Il est estimé comme nourriture.

N° 2. CARANX FALLAX, Cuv., Val., t. IX, p. 95.

Guara tereba, Margrave, *Brasil.*, livr. 4, p. 172.

Diffère du précédent par son corps beaucoup plus haut, etc. Il est en dessus d'un bleu violet; les flancs et les nageoires jaunes et le ventre blanc.

De Rio-de-Janeiro.

NOTA. — On trouve encore à Bahia deux autres espèces que j'ai négligé d'en rapporter; ce sont :

N° 3. CARANX GUARAPUCE, Margrave, livr. 4, p. 179.

Connu sous le nom de *Carvalho*; c'est le meilleur et le plus estimé des poissons de Bahia.

N° 4. CARANX BONITO.

Curveta pinima, Margrave, p. 150.

Grand et beau poisson connu à Bahia sous le nom de *Bonito*, mais dont la chair n'est nullement estimée.

GENRE TRACHURUS.

N° 1. TRACHURUS TRACHURUS, Lacép. (*Caranx*), t. III, p. 62.

Scomber trachurus, Linn., Bloch., pl. 66.

Corps bleu, à reflets verts très brillants; dessous du corps argenté, à reflets irisés; yeux blancs et argentés.

Connu à Bahia sous le nom de *Chicharro*.

GENRE CYBIUM.

N° 1. CYBIUM REGALE, Bloch (*Scomber*), pl. 333.

Corororoca, Margrave, livr. 4, p. 179.

Atteint jusqu'à 66 centimètres de long; blanc argenté, avec le dos d'un gris bleu.

Se mange. A Bahia; il est fort estimé et porte encore le nom de *Sororoca*.

GENRE SERRIOLA.

N° 1. SERRIOLA COSMOPOLITA, Bloch (*Scomber*); Cuv., Val., t. IX, p. 211.

Cette espèce est très remarquable par l'extrême éclat de ses reflets argentés. La partie supérieure du corps est d'un bleu changeant au vert et au bronze; les flancs et le ventre sont d'un blanc d'argent très vif; les nageoires jaunes.

Ce poisson, connu à Bahia sous le nom de *Garapdo*, est commun au mois de février. Il est fort bon à manger.

GENRE TRACHYNOTUS.

N° 1. TRACHYNOTUS GLAUCUS, Bloch (*Chetodon*), pl. 210.

Bien figuré dans Bloch.

Rio-de-Janeiro.

GENRE ARGYREIOSUS.

N° 1. ARGYREIOSUS VOMER, Linn. (*Zeus*), *Mus. Ad. Fr.*, pl. 31, fig. 9.

Entièrement argenté. Fort commun au marché de Bahia et à celui de Rio. Il est peu estimé. On le désigne sous le nom de *Galo*.

Nota. — Je crois que plusieurs espèces sont confondues par les ichthyologistes. Margrave en figure deux, et le mien diffère de l'un et de l'autre, mais il est absolument semblable à celui de Spix (*Poissons du Brésil*, pl. 58); je crois qu'il doit constituer une espèce distincte que je propose d'appeler *Argyreiosus Spixii*, car ce ne peut être par suite d'accidents, comme le

pensent Cuvier et M. Valenciennes, que ces individus ont une partie de leurs nageoires tronquées, puisque j'en ai vu des milliers tous semblables. Mon espèce est reconnaissable à la grande brièveté de la deuxième dorsale, et par la première, qui n'a nullement de prolongement.

GENRE TRICHIURUS.

N° 1. TRICHIURUS LEPTURUS, Linn., *Syst. nat.*

Trichiurus lepturus, Bloch, part. 5, pl. 56; Lacép., t. II, p. 186.

Entièrement argenté.

De Rio-de-Janeiro.

FAMILLE DES TEUTHYES.

GENRE ACANTHURUS.

N° 4. ACANTHURUS BAHIANUS, nov. sp.

(PLANCHE XI, fig. 1.)

Longueur totale, 11 centimètres; plus grande hauteur, 5 centimètres ; 14 épines et 22 rayons branchus à la dorsale; 15 rayons à la caudale; 3 épines et 20 rayons à l'anale; une épine et 5 rayons à la ventrale; 18 rayons à la pectorale.

Corps ovalaire, oblong; la pectorale et la ventrale prolongées en pointe; la queue coupée carrément.

Brun; de chaque côté du ventre une longue tache blanche et irrégulière qui s'étend sur les joues, où elle prend une nuance gris bleu; queue bordée en arrière de jaune; yeux jaunes entourés de bleu et bordés d'un cercle rouge.

Ce poisson laisse échapper par la plaque de la queue une matière liquide et infecte, ce qui fait que l'on arrache cette partie avant de le manger; on lui coupe également la tête.

Il est commun au marché de Bahia dans les mois de février et de mars, et on le désigne sous le nom de *Barbeiro*, qui signifie *barbier*. Cette appellation vient de ce que l'on compare sa plaque caudale à un rasoir.

N° 2. ACANTHURUS CHIRURGICUS, Bloch (*Chetodon*), pl. 208; Cuv., Val., t. X, p. 168.

D'un jaune olivâtre. Corps avec trois bandes transversales brunes; nageoires dorsale et anale finement bordées de noir; œil bleu.

Une variété n'a aucune bande transversale.

Bahia, surtout au mois de novembre; connu également, et de même que tous les *Acanthurus*, sous le nom de *Barbeiro*.

N° 3. ACANTHURUS PHLEBOTOMUS, Cuv., Val., t. X, p. 176.

D'un bleu olivâtre; dorsale se terminant supérieurement par une nuance rouge; queue bordée en arrière de jaune; yeux jaunes.

NOTA. — Je rapporte à cette espèce, comme jeune âge, un tout petit individu à nuance brune et couvert de petits traits longitudinaux interrompus. Il ressemble beaucoup au *Moiraud* de l'*Encyclopédie*, pl. 45, f. 171; mais ce dernier est, dit-on, de la nœr Rouge et n'a pas les petites lignes.

N° 4. ACANTHURUS CERULEUS? Bloch (*Chetodon*); Cuv., Val., t. X, p. 179.

(PLANCHE XII, fig. 1.)

Violet; nageoires dorsale et ventrale d'un beau bleu, ainsi que les yeux.

Se trouve à Bahia presque toute l'année, et surtout de septembre à mars.

NOTA. — Les auteurs donnent en général au *Ceruleus* de petites lignes irrégulières sur le corps et une coloration différente de celle que je viens d'indiquer. Il serait possible que plusieurs espèces fussent confondues; dans ce cas, je propose pour la mienne le nom d'*Acanthurus violaceus*.

FAMILLE DES MUGILOÏDES.

GENRE MUGIL.

N° 1. MUGIL LIZA, Cuv., Val., t. III, p. 86.

Parati? Pison, p. 71.

C'est une grande espèce assez commune au marché de Rio-de-Janeiro.

N° 2. MUGIL BRASILIENSIS, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 72.

De Rio-de-Janeiro.

FAMILLE DES GOBIOÏDES.

GENRE BLENIUS.

N° 1. BLENIUS PILICORNIS, Cuv., Val., t. XI, p. 254.

Entièrement d'un brun obscur, légèrement marbré de noir, surtout sur la queue; nageoires d'un cendré obscur.

Rio-de-Janeiro.

GENRE CLINUS.

N° 1. CLINUS PECTINIFER, Cuv., Val., t. XI, p. 374.

Clinus pectinifer, Guérin, *Icon. reg. anim.*, pl. 38, fig. 2.

D'un brun violet; corps couvert de taches irrégulières et serrées, d'un vert jaune; queue claire, avec trois bandes transversales brunes; nageoires pectorales avec des bandes semblables, les autres nageoires d'un cendré obscur; une tache noire arrondie et assez grande sur l'opercule, derrière l'œil; ventre lilas.

De Rio-de-Janeiro.

N° 2. CLINUS FASCIATUS, nov. sp.

(PLANCHE XII, fig. 3.)

Ressemble pour la forme au *pectinifer*, et a une tache semblable à l'opercule. Le corps est d'un brun clair avec quatre larges bandes transversales d'un brun très obscur; l'opercule, la gorge, la partie inférieure de la tête et la moitié antérieure du dessous du corps sont d'un beau rouge vif; les nageoires anale et ventrale sont de cette même couleur.

De Rio-de-Janeiro.

GENRE GOBIUS.

N° 1. GOBIUS MARTINICUS, Cuv., Val., t. XII, p. 105.

Cette espèce, qui a été primitivement observée à la Martinique, se retrouve au Brésil: je l'ai rapportée de Bahia.

FAMILLE DES MALTHÉES.

GENRE MALTHERA.

N° 1. MALTHERA GUACUJUA, Margrave, *Brasil.*, p. 143.

Maltha longirostre, Cuv., Val., t. XII, p. 450.

Bahia.

N° 2. MALTHERA NOTATA, Cuv., Val., t. XII, p. 453.

(PLANCHE XII, fig. 3.)

Bahia.

FAMILLE DES BATRACHOÏDES.

GENRE BATRACHIUS.

N° 1. BATRACHIUS PACANO, Margrave, *Brasil*.*Batrachus cryptocentrus*, Cuv., Val., t. XII, p. 285.

Ce poisson est encore connu à Bahia sous le nom de *Pocomon*. Sa couleur est un brun marbré de noir. Il est seulement mangé par les pauvres ou les esclaves. Il est assez commun vers le mois de décembre.

FAMILLE DES LABROÏDES.

GENRE COSSYPHUS.

N° 1. COSSYPHUS VERRES, Bloch (*Lutjanus*), pl. 255.*Bodian*, Lacép., t. IV, p. 279.*Aipimixira*, Margrave, p. 135.*Cossyphus bodianus*, Cuv., Val., t. XIII, p. 110.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur. Tantôt elle est d'un jaune orange avec la tête violette; cette dernière couleur s'étend sur le dos dans plus de la moitié de la longueur du corps et couvre la nageoire dorsale, à l'exception des derniers rayons qui sont de la couleur générale; nageoires pectorales jaunes; ventrales et anales obscures. Tantôt tout ce qui est violet dans le précédent devient d'un beau rouge carmin, et le dessous du corps est rose; la partie postérieure de la dorsale, le dessus de l'espace qui s'étend entre elle et la queue, et cette dernière, sont d'un beau jaune. Une tache noire sur la partie supérieure de l'extrémité de la pectorale.

Ces deux variétés forment peut-être deux espèces distinctes; mais les formes étant les mêmes, j'ai cru devoir provisoirement les réunir.

De Bahia et de Rio-de-Janeiro.

GENRE JULIS.

N° 1. JULIS DIMIDIATUS, Agassiz; *Poissons*, Spix, pl. 53; Cuv., Val., t. XIII, p. 407.*Labrus cyanocephalus*? Bloch, t. VII, pl. 286.

En dessus, d'un bleu foncé; dessous, d'un bleu clair; opercule, nageoires pectorales et extrémité de la queue cuivrés; une bande oblique et sinuée jaune s'étend de l'arrière de la tête jusqu'à l'œil; nageoires dorsales et ventrales avec une faible bordure rouge.

Connu à Bahia sous le nom de *Papagaio* (perroquet), qui s'applique également à toutes les *Girelles*. Je l'ai observé de décembre à mars. Les *Jutis* sont peu recherchés pour la table.

N° 2. JULIS CROTAPHUS, Cuv., Val., t. XIII, p. 305.

Les couleurs de cette espèce sont très belles, mais extrêmement fugaces. Le corps est d'un joli bleu clair, nuancé de rose et de vert clair; la tête est marbrée de rose et de vert, avec une tache irrégulière d'un beau bleu derrière l'œil; la mandibule inférieure est jaune et la gorge blanche. La nageoire dorsale est verte, bordée de rose, et au milieu de l'espace qui s'étend entre chaque épine on voit une tache ovulaire allongée et blanche, au centre de laquelle se détache un point rouge; l'anale est d'un vert clair, avec la base rose: cette dernière couleur est bordée d'un trait arqué et bleu; nageoire caudale verte avec la base rose.

On voit que c'est à tort que l'on a donné à cette jolie espèce le nom de *Girelle aux temps noirs*.

De Rio et de Bahia.

N° 3. JULIS GARNOTI, Cuv., Val., t. XIII, p. 300.

Corps d'un gris café, brun en dessus; sur la tête trois bandes obliques bleues; mandibule inférieure couleur de chair, avec des taches bleues; sous les pectorales deux taches allongées et obliques peu marquées et bleues; partie postérieure du corps et nageoire caudale bleuâtre; nageoires dorsale et anale d'un bleu clair, avec deux bandes longitudinales brunes.

Rio-de-Janeiro.

GENRE XYRICHTHYS.

N° 1. XYRICHTHYS SPLENDENS.

(PLANCHE V, fig. 2.)

Longueur totale, 15 centimètres, dont la queue en comprend 2 $\frac{1}{2}$; plus grande hauteur, 4 centimètres.

Nageoire dorsale divisée en deux: la première de 2 rayons; la deuxième de 20 rayons; la caudale de 12 rayons; l'anale de 3 aiguillons et de 13 rayons; ventrales, d'un aiguillon et de 5 rayons, dont les deux premiers prolongés en un long filet; pectorales de 11 rayons.

Ecailles grandes; ligne latérale marquée par une série de petits rameaux longitudinaux.

Les couleurs de ce poisson sont des plus vives: le fond est d'un beau vert brillant, avec les flancs pourpres et le ventre bleu varié de violet; la tête présente

sept ou huit lignes transversales jaunes dont les entre-deux sont souvent bleus; la dorsale est bordée de rouge; les pectorales sont orangées; l'anale est blene, piquetée de brun et terminée par du vert; la queue est de cette dernière couleur, devenant jaunâtre vers l'extrémité.

De chaque côté du corps, vers le milieu de la longueur, mais au-dessus de la ligne moyenne, on voit une tache allongée et noire; les yeux jaunes, bordés de rouge.

De Bahia; vu au marché en mars 1849.

NOTA. — Cette jolie espèce a la tête moins bombée au-dessus des yeux que la plupart des autres de ce genre; ses joues sont nues; par sa tache noire latérale, elle se rapproche du *Xyrichtys unioellatus* de Spix, pl. 85; mais elle en diffère par la dorsale séparée en deux et par la tache elle-même, qui, dans cette espèce, est située, non sur le corps, mais sur la nageoire dorsale.

GENRE MALACANTHUS.

N° 4. MALACANTHUS PLUMIERI, Bloch (*Coryphæna*), pl. 175; Cuv., Val., t. XII, p. 319.

Ce poisson atteint 60 centimètres de long. Il est en dessus d'un brun châtain, qui devient presque blanc sous le ventre; tête avec des lignes longitudinales, devant les yeux, alternativement bleues et jaunes; la base de la nageoire caudale noire, avec les rayons latéraux d'un brun rouge; nageoires d'un bleu clair; la dorsale, avec une fine bordure jaune; la ventrale, avec une semblable, mais bleue.

Cette espèce paraît à Bahia vers le mois de février, et devient commune en mars.

GENRE LABRUS.

N° 1. LABRUS RADIANS, Cuv., Val., t. XII, p. 207.

Pudiano verde? Margrave, livr. A, p. 146.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur, ou du moins je lui rapporte des individus de nuances fort différentes. Les uns sont d'un joli vert varié de rose, surtout sur la tête; le ventre est jaune et la nageoire dorsale rose. Les autres sont bruns variés de plus obscur; le ventre d'un blanc rose, avec des marbrures rouges; nageoires dorsales et inférieures lie de vin; une tache allongée bleue en arrière de l'opercule et qui s'étend derrière la nageoire pectorale.

Commun au marché de Bahia dans les mois de février et de mars. On le désigne sous le nom de *Bodian*, d'où dérive celui de *Pudiano*.

FAMILLE DES FISTULAIRES.

GENRE AULASTOMA.

N° 1. AULASTOME MARGRAVIA, nov. sp.

(PLANCHE IX, fig. 3.)

Longueur totale, 87 centimètres, sur lesquels la queue en occupe 4 et son filet 18; tête de 22 centimètres de longueur; nageoire dorsale de 14 rayons, dont 7 de chaque côté du filet; l'anale, opposée exactement à la dorsale, est de 14 rayons; les ventrales, petites, de 6 rayons; les pectorales, plus grandes que les ventrales, de 14 rayons.

Tout le poisson est d'un vert-olive, avec de nombreuses taches arrondies et bleues. Sur le corps, quelques lignes longitudinales bleues, dont une bien marquée de chaque côté. Le ventre est aussi en général nuancé de cette dernière couleur; les yeux sont châtain.

J'ai observé ce poisson plusieurs fois tant au marché de Rio qu'à celui de Bahia. Dans ce dernier port, il est désigné sous le nom d'*Aguldo bandeira*. Il est assez estimé pour la table.

Cette espèce me paraît être le *Petimbuaaba* de Margrave, *Brasil*, p. 148 (Pison, p. 62). C'est une espèce voisine, mais bien distincte du *Fistularia tabacaria*, Linn., Bloch, pl. 387.



ORDRE DES MALACOPTÉRYGIENS.

FAMILLE DES SILUROÏDES.

GENRE BAGRUS.

Tous les *Bagres* que j'ai rapportés rentrent dans la division à six barbillons.

PREMIÈRE DIVISION.

Especies ayant un casque sur la nuque.

N° 1. BAGRUS VALENCIENNEI, nov. sp.

LANCBE XIII, fig. 4.)

Longueur totale, 1 mètre 6 centimètres; plus grande largeur, 18 centimètres; plus grande hauteur, 21 centimètres.

La tête a un casque coupé droit en arrière et couvert de gros tubercules disposés un peu en rayons; sur la nuque, on voit un autre casque peu arrondi, échancré en arrière et également couvert de tubercules.

Dorsale de 7 rayons et d'une épine osseuse de 16 centimètres de long; forte, droite, et couverte de tubercules. L'adipeuse allongée, ayant 9 centimètres de long et 5 de haut.

La caudale, probablement difforme dans l'individu que j'ai rapporté, puisqu'elle est supérieurement séparée en deux : la première partie formée de 17 rayons courts, dont plusieurs des premiers sont à peine marqués à la partie supérieure de la peau; le reste de la caudale formé de 13 rayons entiers et de 9 autres plus courts au bord inférieur; anale formée de 17 rayons dont les trois premiers plus courts que les autres; ventrales de 6 rayons; pectorales de 11 rayons et d'une épine assez grande, forte, aplatie, longue de plus de 16 centimètres, et fortement dentelée à ses deux bords.

Les yeux sont situés à 6 centimètres de la tête et à 16 centimètres du bord postérieur de l'opercule; les deux longs barbillons s'étendent jusqu'aux pectorales.

Ce poisson est entièrement d'un brun foncé, avec les parties osseuses et les rayons des nageoires blanchâtres.

J'ai rapporté ce beau poisson de la rivière des Amazones, et je le dédie à notre célèbre ichthyologiste M. Valenciennes; il a du rapport avec le *Doroides*.

DEUXIÈME DIVISION.

Espèces sans casque sur la nuque.

N° 2. BAGRUS FLAVICANS, nov. sp.

(PLANCHE XIII, fig. 2.)

Longueur totale, 1 mètre; plus grande hauteur, 15 centimètres; plus grande largeur du corps, 15 centimètres. Tête large, plate; le casque non sensiblement rugueux, formant au bord postérieur deux angles de chaque côté, et se prolongeant en pointe au milieu.

Dorsale de 6 rayons et d'une épine osseuse, grande, forte, arquée, un peu sinueuse, striée en long, mais non dentelée sur les bords et longue de 12 centimètres; adipeuse allongée, de 12 centimètres de long sur 3 centimètres de haut; caudale d'environ 18 grands rayons et de 5 autres plus courts de chaque côté, dont les premiers faisant à peine saillie au-dessus de la peau; anale à rayons branchus, difficiles à bien distinguer, mais paraissant en avoir 7; ventrales de 6 rayons; pectorales de 11 rayons et ayant une épine osseuse grande, arquée, aplatie, de 17 centimètres de long; sa surface est striée, mais elle n'a pas de dentelures sur les bords. Humérus saillant et formant un casque triangulaire couvert d'aspérités granuleuses; yeux à 8 centimètres du bord antérieur de la tête et à 14 centimètres du bord postérieur de l'opercule.

Barbillons de la mâchoire supérieure n'ayant que 16 centimètres de long, c'est-à-dire plus courts que la tête, les autres sensiblement moins longs que les précédents.

Ce poisson est entièrement d'un jaune clair.

Vient de l'Amazone.

N° 3. BAGRUS ROUSSEAUXXI, nov. sp.

(PLANCHE XIV, fig. 1.)

Longueur totale, 1 mètre 14 centimètres.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais s'en distingue par le casque de la tête, qui n'est pas bianguleux au bord postérieur. La tête est plus lisse; l'humérus est à peine senti, étant recouvert d'une peau lisse, et ne forme pas de casque.

Les pectorales sont à proportion plus courtes; l'adipeuse est beaucoup moins longue et n'a que 8 centimètres, bien que l'individu soit sensiblement plus grand. La queue est plus échancrée.

Les barbillons maxillaires sont beaucoup plus longs que la tête et ont 32 centimètres.

Même couleur que le précédent.

De la rivière des Amazones.

NOTA. — Ces espèces doivent venir près de l'albicans.

Je dédie ce poisson à M. Rousseaux, aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle, et voyageur non moins zélé que photographe habile.

N° 4. BAGRUS PUNCTULATUS, nov. sp.

(PLANCHE XIV, fig. 2.)

Longueur totale, 85 centimètres; plus grande hauteur, 21; plus grande largeur, 13 centimètres $\frac{1}{2}$. Tête à casque couvert de rugosités formant, surtout en avant, des lignes allongées. Il est bianguleux de chaque côté en arrière et prolongé au milieu.

Nageoire dorsale de 6 rayons et d'une épine osseuse droite, striée et de 11 centimètres de long. Adipeuse allongée, de 10 centimètres de long et de 2 centimètres $\frac{1}{2}$ de haut; caudale d'environ 20 grands rayons et de 3 courts de chaque côté; anale de 7 rayons; ventrales de 6 rayons; pectorales grandes de 11 rayons et d'une épine osseuse large, longue de 17 centimètres, aplatie, sinuose et garnie, dans ses deux tiers postérieurs, de très fortes dents implantées à angle droit sur l'épine; yeux situés à 7 centimètres; du bord antérieur de la tête, et à 12 centimètres du bord postérieur de l'opercule.

Barbillons supérieurs de 23 centimètres de long, dépassant très notablement la longueur de la tête; les autres beaucoup plus courts, et n'ayant (les plus longs) que de 9 à 10 centimètres de longueur.

Ce poisson est, sur l'individu sec, d'un brun foncé en dessus, ayant le dos couvert, dans sa première moitié, de points arrondis d'un jaune clair; le dessous du corps et le dessous des nageoires inférieures d'un blanc jaune sale.

De la rivière des Amazones.

GENRE GENIDENS, nov. gen.

Je propose la formation de ce nouveau genre aux dépens des *Bagrus*. Il a pour type le *Bagrus genidens* de Cuvier et de M. Valenciennes, auquel vient se réunir une espèce que j'ai rapportée des eaux douces du centre de l'Amérique du Sud. Le dernier de ces savants ichthyologistes avait entrevu la nécessité de former un groupe particulier de ce singulier *Siluroïde*; mais on voit qu'il était arrêté par le fait qu'une seule espèce présentait jusqu'ici la disposition dentaire si remarquable de son *Bagrus genidens*.

Cette coupe est caractérisée par l'absence de dents palatines et par la présence,

de chaque côté, sur la partie supérieure de la membrane des joues, d'un système dentaire réuni en plaques ou en faisceaux.

Ce genre se compose aujourd'hui de deux espèces.

N° 1. GENIDENS CUVIERI.

Bagrus genidens, Cuv., Val., *Poissons*, t. XIV, p. 452, pl. 419.

Habite la Plata et les rivières qui s'y jettent.

N° 2. GENIDENS GRANULOSUS, nov. sp.

(PLANCHE XVI, fig. 1.)

Qui ressemble beaucoup au précédent, mais en diffère en ce qu'il a la tête plus élargie et plus bombée en avant, plus lisse en dessus, à sillon nasal beaucoup moins profond; les granulations de la tête ne s'avancent pas autant en avant, et s'arrêtent vers la ligne perpendiculaire qui serait tirée du bord postérieur de l'œil.

La longueur totale du poisson est de 32 centimètres; sa plus grande hauteur de 4 centimètres $\frac{1}{2}$, et sa plus grande largeur de 8 centimètres.

Les barbillons sont au nombre de six; la tête est couverte de grosses granulations.

Ce poisson ressemble au plus haut point au *Pimelodus versicolor* et à l'*Arius Milberti*. En faisant abstraction des dents, il n'en diffère que par les mêmes caractères qui le séparent du *Genidens Cuvieri*. Il est aussi très voisin du *Pimelodus lemniscatus*. Ce fait prouve combien sont peu naturelles toutes les divisions établies dans le genre *Bagrus*. Il faudra, ou en augmenter beaucoup le nombre, ou ce qui serait mieux, reconstituer ce genre dans son intégrité.

Cette espèce habite la rivière d'Araguay, dans la province brésilienne de Goyaz.

GENRE PIMELODUS.

N° 1. PIMELODUS CLARIAS, Bloch (*Silurus*), pl. 35.

Pimelodus Blochii, Cuv., Val., *Poissons*, t. XV, p. 488.

Des rios Crixas et Araguay, de l'Ucayale et de la rivière des Amazones.

NOY. — Sur le vivant, cette espèce est, en dessus, presque noire, ayant de chaque côté deux bandes blanchâtres; le dessus de la tête d'un vert obscur, la bouche rosée; le ventre d'un blanc argente; la nageoire dorsale cendrée, les autres jaunes, souvent tachées de noir, surtout l'adipose.

Les pêcheurs du Goyaz lui donnent le nom de *Mondi*, ainsi qu'à plusieurs,

autres *Siluroïdes*. Je ne l'ai jamais vu que d'assez petite taille; le plus grand individu que j'ai rapporté a 35 centimètres de longueur totale.

N° 2. *PIMELODUS CTENODUS*, Agassiz, *Poissons de Spix*, p. 21, pl. 8.

Trouvé sur la rivière des Amazones. Cette espèce se rapproche du *Pati* par la longueur de son adipeuse.

N° 3. *PIMELODUS PIRINAMPI*, Spix, *Poissons du Brésil*, p. 20, pl. 8.

Cette espèce est encore, plus que le *Pati* et le *Ctenodus*, remarquable par la longueur de son adipeuse et doit se placer à la suite de ces *Pimélodes*.

Longueur totale, 37 centimètres; plus grande hauteur, 65 centimètres; plus grande largeur 3 centimètres.

J'ai rapporté cette espèce de la rivière des Amazones, de même que la précédente; elle manquait jusque-là au Muséum de Paris.

N° 4. *PIMELODUS BAHIANUS*, nov. sp.

(PLANCHE XVI, fig. 2.)

Petite espèce de 12 centimètres de longueur totale; d'un peu moins de 2 centimètres de hauteur, et d'une épaisseur égale.

Le corps est allongé; la dorsale a 6 rayons et une épine lisse plus courte que les rayons branchus; l'adipeuse est longue de 2 centimètres; la caudale est très fourchue et a de 16 à 17 grands rayons, et d'autres, assez nombreux, plus courts, de chaque côté; l'anale est assez grande et a 10 rayons; les ventrales, 6; les pectorales, 8, avec une forte épine osseuse arquée et présentant, au bord interne, de fortes dents de scie qui ne s'étendent pas jusqu'à l'extrémité.

Les barbillons sont au nombre de 6, dont les maxillaires beaucoup plus longs que les autres, et atteignant presque la base de l'adipeuse.

Ce *Pimélode* est en dessus d'une couleur lie de vin un peu piquetée de brun; le dessous est blanc et les nageoires diaphanes.

Bien que j'aie rapporté des eaux douces des environs de Bahia plusieurs individus semblables de ce *Pimélode*, je ne puis assurer qu'ils aient atteint leur entier développement.

N° 5. *PIMELODUS VERSICOLOR*, nov. sp.

(PLANCHE XVI, fig. 3)

Longueur totale, 28 centimètres; plus grande largeur du corps, 3 centimètres; plus grande hauteur, 4 centimètres.

Cette espèce doit se placer près de l'*Arius Milberti*. La dorsale a une épine os-

osseuse de 3 centimètres de long, forte, comprimée, rugueuse au bord externe, et 7 rayons branchus dont le premier dépasse d'un quart de sa longueur l'extrémité de l'épine; les autres vont insensiblement en diminuant. L'adipeuse a 2 centimètres de long; la caudale est fourchue et a 18 grands rayons et 6 petits latéraux; l'anale a 16 rayons; les ventrales, 6 en tout; les pectorales ont un aiguillon fort, comprimé, dentelé surtout vers la base, et 10 rayons branchus.

Les barbillons sont courts, au nombre de 6; les maxillaires ont 5 centimètres de long; une des paires maxillaires 4 centimètres, et l'autre 3 $\frac{1}{2}$.

Le casque est granulé.

Lorsqu'il est frais, ce poisson a la tête d'un cenré noir, avec la bouche et quelques lignes transversales blanches sur les côtés; le dos est d'un vert foncé, avec une bande longitudinale jaune sur les côtés. Les nageoires supérieures sont jaunes, avec quelques teintes rouges sur les bords; la pectorale a une tache allongée et noire; la caudale est rouge avec deux bandes longitudinales d'un noir violet; l'anale est rouge; les ventrales et les pectorales sont roses.

J'ai rapporté cette espèce du rio Araguay, dans la province de Goyaz (Brésil).

NOTA. — Ce poisson est on ne peut plus voisin de l'*Arius Miltneri*, qui vient de l'Amérique du Nord; il ne s'en distingue que par ses dents palatines formant une bande transverse, par sa tête plus étroite et son sillon nasal plus fort. C'est une nouvelle preuve du peu de consistance, dans une méthode naturelle, des genres établis aux dépens des *Bogrus*.

GENRE ARIUS?

N° 1. ARIUS? LONGICARPUS, nov. sp.

(PLANCHE XV, fig. 2.)

Ce poisson est encore, suivant moi, un exemple de l'impossibilité de séparer les *Pimelodus* des *Arius*, car il appartient évidemment, sous le rapport des formes, au premier de ces groupes, et se place près des *Sapo*, *Puti*, etc., et cependant il a au palais deux petites plaques arrondies, ovalaires, transversales, bien séparées et couvertes de dents fines et serrées comme celles des mâchoires.

Longueur totale, 36 centimètres; plus grande hauteur, 4 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande largeur du corps, 5 centimètres $\frac{1}{2}$.

La tête est large et très aplatie; elle est lisse en dessus, avec un léger sillon nasal; la nageoire dorsale est grande et haute, formée de 11 rayons branchus et d'un osseux grêle. L'adipeuse est allongée et a 6 centimètres de long.

La caudale est formée de 16 ou 17 rayons; l'anale, de 8 rayons et d'une épine assez courte; les ventrales, de 5 rayons branchus et d'un rayon épineux; les pectorales, de 11 rayons branchus et d'un rayon épineux dentelé en dedans et prolongé en filet.

La tête est d'un brun presque noir; le corps est obscur, varié de gris, de noir et de blanc; le ventre est de cette dernière couleur; les nageoires sont obscures, avec des taches presque noires; les rayons osseux, annelés de blanc.

Les barbillons au nombre de 6 : ceux de la mâchoire supérieure atteignent presque l'extrémité de la caudale, les autres dépassent l'extrémité des pectorales.

De la rivière des Amazones.

GENRE GALEICHTHYS.

N° 1. GALEICHTHYS PARRE, Cuv., Vol., *Poissons*, t. XV, p. 33.

De Bahia.

N° 2. GALEICHTHYS ARAGUAYENSIS, nov. sp.

(PLANCHE XVII, fig. 3.)

Longueur totale, 67 centimètres; plus grande largeur du corps, 8 centimètres; plus grande hauteur, 10 centimètres.

Première dorsale, longue de 12 centimètres $\frac{1}{2}$, formée de 8 rayons, dont le premier sinueux, lisse et à peine âpre vers l'extrémité du bord externe; la deuxième, longue de 22 centimètres, et ayant par conséquent le tiers de la longueur totale du poisson; la caudale est entière, formée de 22 rayons en comptant les petits latéraux, ou de 16 se prolongeant dans toute la longueur; l'anale, de 9 rayons; la ventrale ayant une longueur de 8 centimètres et formée de 7 rayons, en y comprenant l'osseux; la pectorale de 11 centimètres $\frac{1}{2}$ de long, de 14 rayons et d'un osseux, grêle et lisse à sa première moitié, et finement denticulé aux deux bords dans l'autre.

Les barbillons au nombre de 6 : ceux de la mâchoire supérieure larges, plats, et ayant 30 centimètres de long.

La deuxième paire de la mâchoire inférieure égale presque la longueur des précédents, et la première d'un tiers plus courte.

La ligne latérale est bien visible dans toute la longueur du poisson. La couleur générale semble avoir été d'un châtain clair, avec le ventre blanc.

J'ai rapporté ce poisson du rio Araguay.

N° 3. GALEICHTHYS BAHIENSIS, nov. sp.

(PLANCHE XVIII, fig. 1.)

Ce poisson, qui a 28 centimètres de long, diffère du *Parra*, tel qu'il est décrit dans l'ouvrage de Cuvier et de M. Valenciennes, par sa nageoire anale formée de 19 rayons, et par sa dorsale à épine osseuse, de 5 centimètres de long, fortement dentelée au bord externe, et qui est suivie de 6 rayons branchus dont

le premier a un prolongement qui lui donne une longueur totale de 10 centimètres $\frac{1}{2}$, tandis que dans le *Parrae*, le premier rayon branchu n'est que d'un tiers plus haut que l'épine osseuse. Le dernier rayon a environ 1 centimètre $\frac{1}{2}$, et n'a par conséquent guère que le neuvième du premier, tandis que dans le *Parrae* il aurait le tiers de sa longueur.

La ligne latérale est visible seulement dans la moitié postérieure.

Les barbillons maxillaires ont 10 centimètres $\frac{1}{2}$ de long, et dépassent de plus de 2 centimètres l'extrémité de l'épine osseuse des pectorales. La couleur générale paraît avoir été dorée.

Ce poisson vient de Bahia.

GENRE CALLICHTHYS.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces allongées à tête déprimée.

N° 1. CALLICHTHYS ASPER, Cav., Val., *Poissons*, t. XV, p. 303.

Silurus callichthys, Linn., *Amoen. acad.*, I, 317, pl. 15, f. 1. — Bloch, p. 337.

De Bahia.

N° 2. CALLICHTHYS CHIQUITOS, nov. sp.

(PLANCHE XXVIII, fig. 2.)

Longueur totale, 13 centimètres; plus grande largeur, 3 centimètres; hauteur, 3 centimètres.

Je n'ai vu qu'un individu, en fort mauvais état, de ce poisson, et un dessin fait sur les lieux par M. Weddell. Presque toutes les nageoires sont mutilées; la forme générale est allongée comme dans l'espèce précédente; la tête est beaucoup moins élargie, plus pointue en avant; au milieu du front on voit une sorte de plaque creuse et en ovale allongé; le rayon osseux des pectorales est assez grêle, presque droit, et seulement un peu âpre au bord externe. Cette espèce n'a que 23 plaques latérales à la rangée supérieure, tandis que j'en compte 29 à l'espèce précédente.

M. Weddell représente ce poisson comme étant d'un vert sombre; dans la liqueur il a pris une teinte jaune. Les Chiquitos lui donnent le nom de *Hiruschiche*. Il est très abondant dans les flaques d'eau, au milieu des marais desséchés de la province de Chiquitos. On le prend sans peine à la main, lorsqu'il s'est enfoncé dans la boue, qui est son habitation ordinaire.

DEUXIÈME DIVISION.

*Espèces de forme raccourcie et à tête déprimée.*N° 3. *CALLICHTHYS SPLENDENS*, nov. sp.

(PLANCHE XVIII, fig. 3.)

Longueur totale, 6 centimètres $\frac{1}{2}$; largeur, 1 centimètre $\frac{1}{2}$; plus grande hauteur, 2 centimètres $\frac{1}{2}$.

Le seul individu de ce joli petit poisson que j'ai rapporté du rio Tocantins est en mauvais état; il a 24 grandes plaques latérales à la rangée supérieure, et 23 à celle de dessous. Il est d'un beau vert doré, avec les nageoires lie de vin; sur la caudale, une bande transversale brune.

Cette espèce est très voisine du *Callichthys punctatus*, figuré dans les *Poissons* de M. d'Orbigny, pl. 5, fig. 1, mais s'en distingue par la disposition des couleurs, l'absence de taches, etc.

N° 4. *CALLICHTHYS TATOSH*, nov. sp.

(PLANCHE XIX, fig. 1.)

M. Weddell a rapporté du pays des Chiquitos une autre espèce dont je n'ai pu voir que la figure que je reproduis ici; elle se distingue suffisamment de la précédente et de celles que je trouve dans les auteurs, pour que je n'hésite pas à la regarder comme nouvelle. Le nom que je lui ai appliqué est celui que lui donnent les Chiquitos. On la trouve dans les flaques d'eau du pays qu'habitent ces Indiens.

GENRE *PLATYSTOMA*.N° 1. *PLATYSTOMA LIMA*, Bloch (*Silurus*), édit. Schneider, p. 384.*Sorubim infra-ocularis*, Spix, pl. 15.

Ce poisson est assez abondant dans l'Amazone et ses affluents. Je le vis pour la première fois sur le Tocantins. Les Indiens Cherentes lui donnent le nom de *Jouripenséy*. Un des individus que j'ai déposés dans la collection du Muséum de Paris a 1 mètre 38 centimètres de long.

N° 2. *PLATYSTOMA TIGRINUM*, Cuv., Val., t. XV, p. 10;*Schomb. (Fishes of Guyana)*, pl. 8.

L'individu que j'ai rapporté de la rivière des Amazones a 71 centimètres de long.

N° 3. PLATYSTOMA CAPABARY, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 13.

Platystoma corrucans, Agassiz, *id.*, p. 26.

J'ai rapporté du rio Araguay, de la province de Goyaz (Brésil), un individu de cette espèce long de 77 centimètres.

N° 4. PLATYSTOMA PUNCTIFER, nov. sp.

(PLANCHE XIX, fig. 2.)

Longueur totale, 50 centimètres; plus grande largeur, 5 centimètres; plus grande hauteur, 4 centimètres $\frac{1}{2}$.

Dorsale de 7 rayons; caudale de 16 grands rayons; anale de 10 rayons, dont le premier plus court que les autres; ventrales de 6 rayons; pectorales de 10 rayons, sans compter l'osseux, qui est fortement dentelé en scie au côté interne.

Les longs barbillons de la bouche s'étendent presque jusqu'à l'extrémité des ventrales.

La tête ressemble beaucoup à celle du *tigrinum*, mais elle est moins plate et plus allongée.

Ce poisson, conservé dans l'alcool, est d'un brun foncé sur sa moitié supérieure et blanc sur celle inférieure; un peu au-dessous de la ligne de partage des couleurs se voient quatre gros points arrondis et obscurs et quelques autres semblables sur le dos. Sur la partie brune ou supérieure, on voit, de chaque côté du corps, une série de taches ou traits transversaux et blancs; les nageoires sont diaphanes, avec quelques points obscurs.

Ce beau poisson doit venir après le *Platystoma pardale* Val. (*Voyage d'Orbigny*, Poissons), pl. 4, fig. 2. Je l'ai rapporté de l'Amazonie.

N° 5. PLATYSTOMA PLATYRHYNCHOS, Cuv., Val., t. XV, p. 27.

Ce poisson vient de l'Amazonie; l'individu que j'ai donné au Muséum de Paris a 41 centimètres de long.

N° 6. PLATYSTOMA AFFINE, Cuv., Val., *Poissons*, t. XV, p. 24.

J'ai rapporté ce poisson de l'Araguay.

GENRE ARGES.

N° 1. ARGES SABALO, Cuv., Val., *Poissons*, t. XV, p. 335.

J'ai rapporté des rivières centrales du Brésil un individu qui, bien que plus petit que celui de M. Pentland, ne semble pas en différer.

GENRE HYPOSTOMUS.

PREMIÈRE DIVISION.

HYPOSTOMES VÉRITABLES.

Pas d'épines à l'interopercule.

N° 1. HYPOSTOMUS ALATUS, nov. sp.

(PLANCHE XX, fig. 1.)

Longueur totale, 34 centimètres; plus grande largeur, 7 centimètres; plus grande hauteur, 6 centimètres; longueur de la dorsale, 11 centimètres; longueur de la pectorale, 5 centimètres.

Première dorsale très grande, à 7 rayons branchus, l'osseux couvert d'aspérités; la deuxième dorsale à rayon osseux droit; nageoire caudale longue, échancrée, de 16 rayons, dont les deux extérieurs osseux et couverts d'aspérités; les ventrales, de 5 rayons branchus et d'un osseux arqué et épé; pectorales de 5 rayons branchus et d'un osseux, grand et couvert d'épines; les écailles du corps finement épineuses sur le bord, et ayant de petites lignes longitudinales.

Ce poisson, d'un brun lilas, est couvert de points jaunes; la dorsale a plutôt des marbrures que des points.

Cette espèce, remarquable par l'étendue de sa dorsale, vient du rio Sabara, dans la province de Minas Geraës (Brésil).

N° 2. HYPOSTOMUS ASPERATUS, nov. sp.

(PLANCHE XX, fig. 2.)

Longueur totale, 30 centimètres; plus grande largeur, 6 centimètres; plus grande hauteur, 3 centimètres; longueur de la dorsale, 4 centimètres; longueur de la pectorale, 6 centimètres.

Tête arrondie en avant, large, plate. Corps d'un brun jaune, entièrement rugueux, à l'exception de l'entre-deux des plaques.

Première nageoire dorsale, de 7 rayons branchus et d'un premier osseux, faible et arqué; deuxième dorsale, ayant son rayon osseux assez fort et arqué; caudale de 16 rayons, dont les deux externes peu différents des autres, et tous couverts d'aspérités; anale de 5 rayons; ventrale de 5 rayons branchus et d'un osseux, déprimé et arqué; pectorale de 5 rayons branchus et d'un osseux, gros et couvert de fortes épines.

De l'Araguay.

N° 3. HYPOSTOMUS PARDALIS, nov. sp.

(PLANCHE XX, fig. 3.)

Longueur totale, 39 centimètres; plus grande largeur, 7 centimètres; plus grande hauteur, 6 centimètres; longueur de la première dorsale, 8 centimètres; longueur de la pectorale, 9 centimètres ½.

Corps allongé. Tête obtuse en avant. Écailles du corps finement striées et ayant chacune une forte carène longitudinale, ce qui forme cinq lignes élevées et longitudinales de chaque côté du corps.

Ce beau poisson est entièrement d'un jaune clair, couvert de taches arrondies ou de points d'un brun obscur, qui s'étendent également sur les nageoires.

La dorsale est très grande, de 12 rayons branchus et d'un osseux, long, grêle, arqué et un peu rugueux; la deuxième dorsale a son rayon osseux assez grand, arqué, comprimé et rugueux; la caudale de 16 rayons; l'anale longue de 5 rayons et d'un osseux assez faible; la ventrale de 5 rayons branchus et d'un osseux un peu rugueux; les pectorales grandes et longues de 5 rayons branchus et d'un osseux, grand, fort, couvert d'aspérités qui deviennent de petites épines crochues vers l'extrémité; ventre blanc, couvert de points bruns.

De l'Amazonie.

NOTA. — Cette espèce est voisine du *duodecimalis* de M. Valenciennes (*Poissons*, t. XIV, p. 490), mais s'en distingue facilement. Il ne peut non plus être confondu avec l'*edenticulatum* de Spix (p. 4), qui rentre dans la division à grandes épines sur l'interoperculaire.

N° 4. HYPOSTOMUS SUBCARINATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXI, fig. 1.)

Longueur totale, 31 centimètres; plus grande largeur, 6 centimètres; plus grande hauteur, 4 centimètres; longueur de la première dorsale, 7 centimètres; de la pectorale, 6 centimètres ½.

Corps entièrement brun, à peine piqué de brun noir sur le dos; entre-deux des rayons des nageoires couverts de points violets; la dorsale est d'un bleu clair.

Tête déprimée, peu arrondie en avant, à museau obtus.

Bord postérieur du préoperculaire denticulé; écailles rugueuses, denticulées au bord postérieur; elles ont chacune une faible carène longitudinale, ce qui forme quatre lignes longitudinales élevées de chaque côté du poisson.

Première dorsale grande, de 7 rayons branchus, l'osseux long, grêle, rugueux; le rayon osseux de la deuxième dorsale assez fort, arqué et rugueux; caudale de 16 rayons, dont les deux externes ou osseux assez grêles et couverts d'aspérités; anale de 5 rayons et d'une épine; ventrales de 5 rayons branchus et d'un osseux

finement rugueux; pectorales de 6 rayons et d'un osseux grand, fort, couvert d'épines, surtout vers l'extrémité.

Des rivières de la province des Mines.

Cette espèce est voisine de la *punctata* de M. Valenciennes (t. XV, p. 494), mais s'en distingue, entre autres caractères, par le nombre des rayons de la caudale.

DEUXIÈME DIVISION.

MASTODONTES.

Interoperculaire garni d'épines longues que le poisson peut écarter à volonté; le premier rayon osseux des pectorales très fort et armé de longues épines.

N° 5. HYPOSTOMUS AURANTIACUS, nov. sp.

(PLANCHE XXI, fig. 2.)

Longueur totale, 24 centimètres; plus grande largeur, 8 centimètres; plus grande hauteur, 5 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la dorsale, 8 centimètres $\frac{1}{2}$; largeur de la pectorale.

Tête très large, plate. Corps court et épais. Première dorsale peu élevée, ayant un large rayon osseux et couvert d'aspérités et 7 rayons branchus; la deuxième dorsale ayant son rayon osseux gros, court, arqué et couvert d'épines; la caudale de 16 rayons presque osseux et couverts d'épines, surtout les deux extérieurs, qui sont très épais, arqués et très forts; l'anale de 5 rayons; la ventrale de 4 rayons branchus et d'un externe grand, arqué, aplati et épineux latéralement; les pectorales grandes, avec les épines du rayon osseux longues et arquées; les épines de l'interoperculaire crochues au bout; corps couvert d'écailles garnies de fines épines.

Ce poisson est entièrement d'un jaune orangé, avec le bord des nageoires carmin.

Cet *Hypostome* vient de l'Ucayale; il est voisin de l'*edenticulatum* de Spix (*Poissons du Brésil*, pl. 4), mais en diffère par la forme des épines de l'intermaxillaire, celle de la dorsale, etc., etc. Il paraît avoir aussi de très grands rapports avec le *Loricaria plecostomus* de Bloch, pl. 374 (*Loricaria flava*, Shaw, t. V, pl. 101), mais n'a pas les points que représente cet auteur. Ce poisson a un habitat fort étendu, car il ne semble différer en rien d'un individu trouvé dans l'Araguay, à San-Juan das duas Barras, où les pêcheurs le désignent sous le nom de *Wacari*.

N° 6. HYPOSTOMUS NIVEATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXI, fig. 3.)

Longueur totale, 29 centimètres; plus grande largeur, 9 centimètres; plus grande hauteur, 5; longueur de la pectorale, 7 centimètres $\frac{1}{2}$.

Dorsale de 6 centimètres de long, à rayon osseux rugueux, et à 7 rayons branchus; deuxième dorsale à rayon osseux arqué et rugueux; caudale de 16 rayons, dont les externes grands, fort osseux et convertis des très fines épines; anale de 5 rayons; ventrales grandes, de 5 rayons branchus et d'un osseux très fort et couvert d'aspérités; pectorales très grandes, de 5 rayons branchus et d'un osseux convert de longues épines arquées, blanches et courbées à l'extrémité; épines de l'interoperculaire très grandes et blanches. Écailles du corps couvertes de petites stries longitudinales, surtout vers la partie postérieure, et ayant leur bord couvert de petites épines.

Ce poisson, conservé dans l'alcool, est entièrement d'un brun bleuâtre obscur, points arrondis et blancs.

Du rio Araguay, de la province de Goyaz.

N° 7. *HYPOSTOMUS NIGRICANS*, nov. sp.

(PLANCHE XXII, fig. 1.)

Longueur du corps, 12 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande largeur, 4 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande hauteur, 2 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la dorsale, 2 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la pectorale, 3 centimètres.

Corps obscur, court, large, trapu. Tête peu arrondie, obtuse en avant. Écailles ayant chacune, surtout vers la partie postérieure du corps, plusieurs épines aiguës et plus prolongées que les autres; épines de l'interopercule moins longues que dans les espèces précédentes, peu égales et crochues au bout: elles sont blanches avec l'extrémité jaune.

Première dorsale de 7 rayons branchus, l'osseux arqué; deuxième dorsale à rayon osseux court, épais, trapu; caudale terminée obliquement, de 16 rayons, dont les externes osseux et arqués; anale de 4 rayons et d'une épine; ventrale de 5 rayons et d'un osseux rugueux et arqué; pectorales assez courtes, de 5 rayons branchus et d'un osseux long et couvert de longues épines crochues et blanches.

Cette petite espèce vient de l'Amazonie.

N° 8. *HYPOSTOMUS PICTUS*, nov. sp.

(PLANCHE XXII, fig. 2.)

J'ai rapporté de l'Ucayale un petit *Hypostome* en fort mauvais état, que j'ai d'abord regardé comme un jeune âge du *niveus*, mais qui s'en écarte par les rayons des nageoires proportionnellement plus minces et plus grêles, surtout celui de la deuxième dorsale qui est droit et aigu; le rayon osseux des pectorales est couvert d'aspérités, mais sans épines. Il n'a que 11 centimètres de long.

Lorsqu'il était vivant, sa couleur était d'un brun vert, parsemé de points jaunes;

les nageoires étaient jaunes, avec des taches nacrées, et leur extrémité rouge; le dessous du corps était d'un gris blanc.

N° 9. *HYPOSTOMUS SPINOSUS*, nov. sp.

(PLANCHE XXII, fig. 3.)

Longueur totale, 35 centimètres; plus grande largeur, 8 centimètres; plus grande hauteur, 4 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la première dorsale, 8 centimètres; longueur de la pectorale, 7 centimètres $\frac{1}{2}$.

Corps assez allongé, d'un brun obscur, couvert d'épines blanches. Tête peu arrondie, obtuse en avant, couverte d'aspérités et de petites épines, celles de l'operculaire assez courtes comparativement à celles des espèces précédentes. Chaque écaille du corps, à part ses aspérités, présente deux épines longues et droites, dont la postérieure est la plus allongée, ce qui forme, de chaque côté du poisson, quatre stries d'épines, celles placées sous le ventre n'en ayant pas, si ce n'est vers l'extrémité postérieure du corps.

On voit sur le corps quelques points noirs, et l'entre-deux des rayons des nageoires en est couvert.

La première dorsale est très grande, a 8 rayons branchus et un osseux qui est grand, arqué et rugueux; la deuxième dorsale a son rayon court, arqué et couvert de fortes épines; la caudale a 16 rayons couverts de petites épines; les deux osseux sont grands, arqués, et dépassent notablement les autres en longueur; l'anale, grande, de 5 rayons et d'un osseux rugueux; les pectorales, grandes, de 5 rayons branchus, ayant chacun quelques épines, et d'un osseux rugueux et sub-épineux; pectorales de 5 rayons branchus et d'un osseux fort et couvert, surtout vers l'extrémité, de grosses épines arquées. Dessus du corps parsemé de points obscurs.

De la rivière des Amazones.

N° 10. *HYPOSTOMUS VICINUS*, nov. sp.

(PLANCHE XXIII, fig. 1.)

Ressemble beaucoup au *nigricans*, mais s'en distingue par sa tête moins élargie; son museau plus arrondi en avant; les épines préoperculaires sont plus faibles. On voit des marbrures obscures sur la membrane de la nageoire dorsale.

Ce petit *Hypostome*, qui a été pris dans l'Ucayale, n'a que 9 centimètres de long.

GENRE LORICARIA.

N° 1. LORICARIA AMAZONICA, nov. sp.

(PLANCHE XXII, fig. 2.)

Ce poisson paraît être très voisin de celui rapporté des confluent de la Plata par M. d'Orbigny (*Poissons*, p. 6, f. 3). Il est à remarquer qu'aucune espèce de l'Amazonie ne semble se trouver dans la rivière que nous venons de citer; d'ailleurs notre poisson diffère du sien (le *maculata* de Bloch, pl. 375) par l'absence de bandes transversales sur le corps et par la nageoire anale, qui est diaphane et sans tache. Il a 21 centimètres de long.

N° 2. LORICARIA CARINATA, nov. sp.

(PLANCHE XXIII, fig. 3.)

Ce poisson ressemble beaucoup au précédent, mais s'en distingue par sa tête plus élargie, plus déprimée, et son museau se terminant en avant d'une manière moins arrondie et plus allongée; les nageoires n'ont pas de taches; les épines formant les carènes des flancs sont encore plus marquées que dans cette espèce et sont plus nombreuses à la partie antérieure du corps, puisque les deux écailles qui précèdent celle à laquelle s'articule la dorsale ont chacune deux carènes, et que les deux écailles qui bordent celles dont je parle en ont chacune une, en sorte qu'il y a dans cette partie du corps, en outre des deux carènes latérales, quatre autres carènes épineuses et raccourcies. Ce poisson a 25 centimètres de long.

De la rivière des Amazones.

N° 3. LORICARIA CANTANEA, nov. sp.

(PLANCHE XXIII, fig. 4.)

Cette espèce a encore la tête bien plus pointue, en avant, que la précédente, mais elle s'en distingue aisément par l'absence des petites carènes de la partie antérieure du corps.

Ce poisson, qui a 25 centimètres de long, est d'un châtain clair; il m'a été donné à Rio-de-Janeiro comme venant des rivières du voisinage.

NOTA. — Cette espèce, par sa couleur et sa forme, se rapproche du *Loricaria rostrata* de Spix (*Poissons*, pl. 3), mais s'en écarte par son museau qui, bien que plus allongé que celui des espèces précédentes, l'est cependant moins que dans celle-ci.

GENRE PHIRACTOCEPHALUS.

N° 1. PHIRACTOCEPHALUS HEMILOPTERUS, Bloch, édit. Schneider, p. 385, n° 22 (*Silurus*).

(PLANCHE XV, fig. 4.)

Sirarara bicolor, Agassiz, *Poissons de Spix*, pl. 6. — Cuv., Val., t. XV, p. 3.

Ce magnifique poisson atteint jusqu'à près de 1 mètre $\frac{1}{2}$ de long, car j'en ai vu plusieurs individus qui avaient 1^m.30, et l'on m'a assuré qu'il y en avait de beaucoup plus grands.

Bien qu'il ait été figuré plusieurs fois, j'ai cru devoir le représenter de nouveau à cause de ses couleurs qui sont entièrement différentes de celles qu'on lui a attribuées jusqu'à ce jour. Il faut remarquer que toutes les planches de l'ouvrage de Spix sont coloriées sur des individus conservés dans l'alcool, et, par conséquent, devenus méconnaissables sous ce rapport. Lorsqu'il est vivant, toute la partie supérieure de ce poisson est d'un brun obscur, et la partie inférieure d'un beau jaune. La queue est d'un rouge vif, qui forme aussi des monchetures sur la partie postérieure du corps. Les nageoires sont aussi bordées ou tachetées de cette même couleur qui se retrouve sur la mâchoire inférieure et sur ses tentacules. Le ventre est blanc.

J'ai trouvé, pour la première fois, ce poisson dans le rio Crixas, et je l'ai revu depuis dans l'Araguay et l'Amazone.

Les Chavantes lui donnent le nom de *Piarbé-pré*; les Carajas, celui de *Lai-tou*; les Chambias, de *To-rai*, et les pêcheurs de Goyaz, *Ouarara*.

GENRE AUCHENIPTERUS.

N° 1. AUCHENIPTERUS NUCHALIS, Spix (*Hypophthalmus*), *Poissons du Brésil*, pl. 47.

Cuv., Val., t. XV, p. 208.

L'individu de cette espèce, que j'ai rapporté de la rivière des Amazones, a 27 centimètres de long.

GENRE HYPOPTHALMUS.

N° 1. HYPOPTHALMUS EDENTULUS, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 9.*Hypophthalmus Spixii*, Cuv., Val., t. XV, p. 231.

Ce poisson n'avait pas été vu en nature, par les naturalistes français, avant mon voyage sur la rivière des Amazones, d'où je l'ai rapporté au Muséum de Paris.

L'individu que je décris a 38 centimètres de longueur totale; 9 de hauteur, et environ $\frac{1}{4}$ de largeur.

La figure de Spix est excellente sous tous les rapports ; seulement, dans mon individu, on ne compte guère que 63 rayons à l'anale.

GENRE DORAS.

N° 1. DORAS COSTATUS, Linné (*Silurus*), t. I, 1360, 19; Bloch, pl. 396.

J'ai trouvé ce beau poisson dans la rivière des Amazones.

N° 2. DORAS WEDDELLI, nov. sp.

(PLANCHE XVII, fig. 1.)

Longueur totale, 13 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande largeur, 4 centimètres; plus grande hauteur, 2 centimètres $\frac{1}{2}$.

M. Weddell, qui a trouvé ce poisson dans le pays des Chiquitos, en a rapporté un dessin et une peau, malheureusement en mauvais état, qui ne me permet pas de compter les rayons des nageoires.

La tête est large, déprimée : les barbillons sont au nombre de 6, dont les maxillaires, qui sont les plus longs, ont environ 3 centimètres.

La dorsale est formée de 5 rayons et d'une épine osseuse, large, forte et droite; la caudale est grande, coupée carrément au milieu, avec les rayons latéraux sensiblement plus longs que les autres; la caudale est précédée, en dessus et en dessous, de dix ou onze plaques osseuses qui vont en se prolongeant de plus en plus, pour former la base de la nageoire; l'épine osseuse des pectorales est très grande, arquée, déprimée, dentelée des deux côtés.

Les plaques latérales sont au nombre de vingt sept; leurs épines sont fortes, arquées et aiguës.

Ce poisson est représenté dans le dessin de M. Weddell, comme étant noirâtre et parsemé de taches noires; le dessous semble avoir été blanc et les nageoires diaphanes.

Cette espèce se trouve dans de petites flaques d'eau de la province des Chiquitos. Les Indiens de cette nation lui donnent le nom de *Uarioroch*, et craignent la piqure de l'épine de sa dorsale comme les Brésiliens redoutent celle que cause la *Raie*.

GENRE AGENEIOSUS.

N° 1. AGENEIOSUS INERMIS, Lacép.

Silurus inermis, Bloch, Seba, t. III, pl. 20.

De la rivière des Amazones.

NOTA. — Mon individu a 50 centimètres de long.

N° 2. *AGENEIOSUS UCAYALENSIS*, nov. sp.

(PLANCHE XVII, fig. 2.)

Longueur totale, 20 centimètres; plus grande largeur, 3 centimètres; plus grande hauteur, 2 centimètres.

Ce poisson, que j'ai pris dans un lac, près de l'Ucayale, et qui communiquait avec cette rivière, est réuni au Muséum de Paris avec l'*Ageneiosus militaris*, dont il serait probablement regardé comme étant la femelle; mais je ne puis partager cette manière de voir, à cause de la composition des nageoires.

La membrane branchiostège a 9 rayons; la dorsale 6 rayons et une épine plus courte, un peu denticulée extérieurement; la caudale est très fourchue, mais incomplète dans mon individu; l'anale est longue, étroite, presque égale en largeur dans toute sa longueur et de 46 rayons; la ventrale de 7 rayons; la pectorale de 14 rayons et d'un aiguillon un peu plus court et dentelé en scie au côté interne.

Ce poisson semble avoir été d'un blanc argenté, avec le dos d'un bleu violet. La tête est variée de cette dernière couleur.

GENRE *TRICHOMYCTERUS*.N° 1. *TRICHOMYCTERUS PENTLANDI*, nov. sp.

(PLANCHE XXIV, fig. 1.)

Ce poisson doit venir près du *Trichomycterus rivulatus* rapporté de l'Apurimac par le savant voyageur M. Pentland, auquel je me fais un plaisir de dédier l'espèce que je décris et que j'ai rapportée d'un lac situé près de la mission de Sarayacu, qui communique avec la rivière d'Ucayale.

Ce *Trichomyctère*, qui forme, je crois, la plus grande espèce connue, a 36 centimètres de longueur totale, 5 de hauteur et moins de 3 de largeur. Il est entièrement d'un châtain clair, couvert de petites nouchetures noires. Il a la forme du *rivulatus*; la dorsale a également 8 rayons; la caudale, 13 grands rayons et 6 ou 7 petits; l'anale, 6; les ventrales, 5; les pectorales, 9.

Les épines de l'interoperculaire sont longues et grêles.

N° 2. *TRICHOMYCTERUS PUNCTATISSIMUS*, nov. sp.

(PLANCHE XXIV, fig. 3.)

Longueur totale, 28 centimètres; plus grande largeur, 6 centimètres; plus grande hauteur, 3 centimètres $\frac{1}{2}$.

Cette espèce est très voisine du *Tr. punctulatus* (Cuv., Val., t. XVIII, p. 488),

mais en diffère par sa taille beaucoup plus grande, sa couleur générale d'un châtain clair. Il est entièrement couvert de très petits points d'un brun obscur très serrés et couvrant les nageoires supérieures. Le dessous du corps et les nageoires inférieures sont d'un brun jaune.

De l'Araguay.

NOTA. — Le *Pygidium dispar* de Tschudi Faun. Peruv., Poissons, p. 22, pl. 3) rentre certainement dans ce genre et pourrait bien être le *Trichomycterus punctulatus*, Val. (t. XVIII, p. 455). Les deux sexes paraissent différer beaucoup l'un de l'autre.

N° 3. *TRICHOMYCTERUS PICTUS*, nov. sp.

(PLANCHE XXIV, fig. 2.)

Cette espèce a quelque ressemblance avec la précédente, mais elle en est bien distincte.

Sa longueur totale est de 16 centimètres. La couleur générale est lie de vin obscur, couvert de taches serrées et confluentes plus obscures que le fond.

La dorsale a 10 rayons; la caudale, 12 grands rayons; l'anale, 7 rayons; les ventrales, 5; les pectorales, 9. Les épines operculaires sont fortes.

M. le docteur Weddell a rapporté plusieurs individus de cette espèce du grand lac de Titicaca.

N° 4. *TRICHOMYCTERUS PUSILLUS*, nov. sp.

(PLANCHE XXIV, fig. 4.)

Cette espèce est très voisine du *Tr. gracilis*, rapporté des environs du Cuzco par M. Pentland. Elle en diffère par sa forme plus allongée; sa tête beaucoup moins élargie en arrière, de forme plus carrée; ses yeux situés beaucoup plus en avant.

La couleur de mon espèce est, sur les individus conservés dans l'alcool, d'un brun obscur, piqué de plus clair, formant, chez quelques individus, des bandes longitudinales peu régulières. Le dessous du corps est blanc.

J'ai trouvé, pour la première fois, ce petit poisson dans l'Araguay, et je l'ai depuis retrouvé dans l'Amazone. Le plus grand de mes individus n'a que 9 centimètres de long.

Cette espèce est, de la part des pêcheurs de l'Araguay, l'objet d'un préjugé des plus singuliers : ils prétendent qu'il est fort dangereux d'uriner dans la rivière, car, disent-ils, ce petit animal s'élance hors de l'eau et pénètre dans l'urètre en remontant le long de la colonne liquide.

NOTA. — J'ai fait, sur l'Araguay, le dessin d'un *Trichomyctère* qui me semble se rapporter à cette espèce et qui a une tache d'un brun foncé sur le haut de la tête.

GENRE VANDELLIA.

Ce curieux genre a été établi par M. Valenciennes (*Hist. des Poissons*, t. XVIII, p. 386); il le place provisoirement dans la famille des *Esoces*, mais il me semble avoir de grands rapports avec les *Trichomycterus*, que l'on place parmi les *Siluroïdes*, et je me suis décidé à lui faire suivre ces poissons.

On n'avait encore décrit qu'une espèce, le *Vandellia cirrhosa*, dont on ne connaît pas exactement la patrie, mais qui vient certainement d'un des fleuves du Brésil, et probablement de l'Amazon. Nous allons en faire connaître une seconde.

N° 1. VANDELLIA PLAZAR, nov. sp.

(PLANCHE XXVIII, fig. 1.)

Cette espèce diffère de celle qui était connue jusqu'ici par son corps beaucoup plus allongé, et dont la hauteur est contenue treize fois dans la longueur, tandis qu'elle ne se trouve que de dix dans la *cirrhosa*. La tête est plus élargie, plus arrondie en avant; la queue est tronquée obliquement. Le corps est entièrement d'un blanc bleuâtre, uniforme, devenant un peu jaune en dessous; la tête est de couleur terre de Sienne; la nageoire caudale a sa moitié supérieure rouge et l'inférieure noire.

J'ai pris cette espèce dans le rio Ucayale (Pérou), le 13 septembre 1846.

Je dédie cette espèce au vénérable père Plaza, préfet des missions de la Pampa del Sacramento, qui nous reçut avec autant de bienveillance que d'humanité, lorsque après des souffrances inouïes, nous parvîmes enfin à Sarayacu, dans un état qui fit verser des larmes à ce digne missionnaire.

NOTA. — Comme point de comparaison, j'ai fait figurer, pl. 28, fig. 2, le *Vandellia cirrhosa*.

FAMILLE DES CYPRINOÏDES.

GENRE ORESTIAS.

N° 1. ORESTIAS TSCHUDI, nov. sp.

(PLANCHE XXVIII, fig. 1.)

La forme générale se rapproche de celle de l'*Orestias Jussiei* (Cuv., Val., t. XVIII, p. 236), mais la taille est sensiblement plus grande; le dos est moins arqué en dessus; les yeux sont plus petits à proportion et situés plus bas; les écailles des joues sont beaucoup plus nombreuses et moins grandes dans le *Jussiei*, elles ne

forment que deux rangées, tandis que dans mon espèce elles en contiennent quatre. La couleur est beaucoup plus obscure.

Longueur totale, 16 centimètres; plus grande hauteur, 4 centimètres.

Du lac de Titicaca, rapporté par M. Weddell.

J'ai dédié cette espèce au savant voyageur M. le docteur Tschudi, auteur de la *Faune du Pérou*, etc.

Pour faire ressortir les caractères comparatifs de cette espèce, j'ai fait figurer, pl. 27, fig. 3, l'*Orestias Jussiei*.

N° 2. ORESTIAS PENTLANDI, Cuv., Val., *Poissons*, t. XVIII, p. 230.

Également rapporté du lac de Titicaca par M. Weddell.

FAMILLE DES ÉSOCES.

GENRE BELONA.

N° 1. BELONA TUMUCU, Margrave, *Braz.*, ch. 14, p. 168; Cuv., Val., *Poissons*, t. XVIII, p. 426.

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est gris, très argenté, un peu obscur sur le dos; sur les flancs, des reflets bleus forment une sorte de bande latérale, surtout dans la seconde moitié du corps; ventre à reflets pourpres; nageoires jaunâtres.

Commun aux marchés de Rio et de Bahia; dans ce dernier port on le désigne sous le nom d'*Agulha branca*.

GENRE HEMIRAMPHUS.

N° 1. HEMIRAMPHUS BRASILIENSIS, Linn., *Syst. nat.* (*Esoc*).

Hemiramphus Brownei, Cuv., Val., *Poissons*, t. XIX, p. 13; Brown, *Jamaica*, pl. 45, fig. 2.

Corps argenté, d'un gris bleu sur le dos; une bande longitudinale jaune et argentée sur les côtés; nageoires grises; le prolongement de la mâchoire inférieure est tantôt bleu et tantôt noir, mais toujours terminé par du rouge; yeux jaunes.

Très commun à Rio et à Bahia; dans ce dernier port il est désigné sous le nom d'*Agulha creola*. Bon à manger.

FAMILLE DES BUTYRINS.

GENRE ALBULA.

N° 1. ALBULA UNBARANA, Margrave, p. 154.

Albula Parra, Cuv., Val., t. XIX, p. 359.*Amia immaculata*, Schn., Bloch, pl. 451, n° 2.*Le Mocabi*, Parra, t. 35, fig. 1, p. 58.*Engraulis sericus*, Spix, pl. 23.

Lorsqu'il est vivant, il est très argenté, avec les parties supérieures d'un gris de fer; sur les nageoires dorsales, ventrales, pectorales et anales, ainsi que sur les côtés de la tête, on voit des nuances jaunes; tout le corps présente des lignes longitudinales un peu obscures; nageoire caudale d'un gris semblable à celui du dos; yeux jaunes.

Ce poisson est commun au marché de Bahia; on estime peu sa chair à cause de ses nombreuses arêtes; on le désigne encore sous le nom de *Barana*, qui rappelle celui qu'emploie Margrave.

N° 2. ALBULA MACROCEPHALA, Cuv., Val., t. XIX, p. 324.

Cette espèce est entièrement argentée; les nageoires supérieure et caudale, ainsi que la tête, ont une nuance jaune; la tête est en grande partie de cette dernière couleur; yeux également jaunes.

Cette *Albula* est désignée à Bahia sous le nom de *Sama*.

FAMILLE DES HYODONTES.

GENRE OSTEOGLOSSUM.

N° 1. OSTEOGLOSSUM MINUS, Vandelli, *Mém. Acad. Lisbon.*

PLANCHE XXV, fig. 2.)

Osteoglossum Vandellii, Cuv., Val., t. XIX, p. 294.*Ichthosoma bicirrhosum*? Spix, *Poissons du Brés.*, pl. 25.

L'*Osteoglossum* atteint 1 mètre de long; on le connaît sur le Tocantins sous le nom d'*Aronana*. Ce poisson est d'un blanc argenté à reflets rouges et vifs, avec le dessus du corps et les nageoires d'un blanc vert assez clair; chacune de ses grandes écailles a un disque vert entouré d'un cercle brillant et doré; les yeux jaunes.

J'ai trouvé, pour la première fois, l'*Aronana* dans le Tocantins, au fort de San-Juão das duas Barras, et je l'ai revu depuis dans l'Amazonie. Sa chair est fort bonne à manger.

FAMILLE DES VASTRES.

GENRE VASTRES.

. N° 1. VASTRES GIGAS, Cuv., *Règne animal*.

(PLANCHE XXV, fig. 1, et pl. XXVI.)

Vastres Cuvieri, Val., t. XIX, p. 441.

Les *Vastres*, dont les naturalistes modernes font plusieurs espèces, sont désignés par toutes les tribus de l'Amazonie sous le nom de *Pirarucu*, qui, en guarani, signifie *poisson rouge*, par allusion à l'extrême éclat de leurs couleurs. Rien ne peut en effet donner une idée de la beauté de ces géants des eaux douces, lorsqu'on vient de les retirer de l'élément qu'ils habitent. Que de fois je me suis senti frappé d'une impression profonde en voyant ces êtres énormes qui semblent appartenir à une création antédiluvienne, étendus sans vie sur les bords des lagunes où ils se trouvent en si grand nombre, que leur chair, jointe à celle du Lamentin, suffit à la nourriture des nombreuses nations indiennes qui habitent cette portion du globe terrestre. Absolument privé de tout moyen de défense, le *Pirarucu* ne peut échapper à ses ennemis que par la solidité de la boîte écailleuse qui le recouvre. Une fois frappé du harpon, il cherche un instant à fuir, mais il perd bientôt ses forces, et se laisse traîner sans résistance sur le rivage.

Le ventre est la partie la plus estimée comme nourriture.

Le *Pirarucu* habite exclusivement l'Amazonie et ses nombreux embranchements; sa chair se conserve facilement, et je ne doute pas que l'on n'établisse bientôt des pêcheries fructueuses dans les parties où il se trouve le plus abondamment. Mais cette espèce, qui depuis la création du monde, peut-être, résiste aux faibles moyens d'attaque de l'Indien sauvage, pourra-t-elle échapper, à cause de sa taille gigantesque, à l'ingénieux massacre qu'en fera la civilisation. Il est permis d'en douter, et de croire qu'elle est destinée à s'éteindre et à aller rejoindre, dans les musées futurs, tous ces autres êtres singuliers qui n'ont laissé de leur existence passagère qu'un souvenir, soit dans la mémoire des hommes, soit gravé sur les schistes et les calcaires antiques.

Le *Vastres* est d'un vert bronzé et brillant; les côtés paraissent tachetés d'une nuance plus obscure, ce qui provient de ce que les écailles sont d'un olive un peu plus foncé, bordées de vert sale; le ventre est blanc, mais chaque écaille est bordée de carmin vif. Plus on se rapproche de la partie postérieure du corps, plus ce poisson prend un éclat écarlate, ce qui vient de ce que les écailles couvrant ces parties ont le disque vert entouré d'une bordure rouge qui devient de plus en plus large. La caudale, l'anale et la dorsale sont semblables sous ce rapport; le des-

sous de la tête et la gorge sont blancs; les pectorales et les ventrales verts; les yeux d'un jaune vif.

On voit que, sous le rapport de la coloration, les écailles de ce poisson se divisent en quatre sortes : celles du dos, entièrement vertes; celles des flancs, d'un vert foncé, bordées de blanc ou de vert sale; celles du ventre, blanches, avec une bordure de rouge vif; celles de toute la partie postérieure du corps, vertes, entourées de rouge.

La longueur moyenne du *Pirarucu* est de 2 mètres $\frac{1}{2}$, et il pèse alors environ 150 kilogrammes.

Ce poisson habite généralement le fond des lacs qui communiquent avec les grandes rivières; mais il vient quelquefois, lorsque le soleil est au-dessus de l'horizon, se jouer à quelques décimètres au-dessous de la surface des eaux, et c'est alors qu'on parvient à le harponner. Le mois de mai est le plus favorable pour la pêche. Je ne l'ai vu que rarement dans le cours même des rivières.

Bien que privé, ainsi que nous l'avons déjà dit, de moyens de défense formidables et en rapport avec ses dimensions gigantesques, le *Pirarucu* femelle, suivant le rapport unanime des pêcheurs, défend avec fureur ses petits contre le mâle, qui cherche à les dévorer. Ce fait semblerait inexplicable chez un animal ovipare.

J'ai indiqué, depuis longtemps, le parti que l'on pourrait tirer de ce géant de l'Amazone. (Voy. *Relation du voyage*, t. I^{er}, p. 394, et t. V, p. 140.)

FAMILLE DES ÉRYTHROÏDES.

GENRE ERYTHRINUS.

N° 4. ERYTHRINUS BRASILIENSIS, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 20.

Je réunis ici les deux genres *Erythrinus* et *Macrodon*, qui ne me paraissent pas reposer sur des caractères suffisants pour pouvoir être séparés l'un de l'autre.

M. Valenciennes (Cuv., Val., *Poissons*, t. XIX, p. 519) réunit les *Erythrinus trahira* et *brasiliensis* de Spix, pour en former une espèce qu'il nomme *Macrodon tateira*, nom pris dans Margrave, mais qui n'est qu'une corruption du mot *trahira*, sous lequel ce poisson est encore désigné au Brésil.

Je ne puis, après avoir étudié ces espèces vivantes, adopter cette manière de voir, et les deux espèces de Spix me paraissent parfaitement distinctes.

L'*Erythrinus brasiliensis* atteint plus d'un demi-mètre de long; il est en dessus d'un châtain à reflets verts, avec des lignes longitudinales de cette dernière couleur sur la partie antérieure du corps; la tête est verte, avec des taches allongées noires; la caudale, ainsi que les nageoires anale et ventrale, ont deux bandes trans-

versales noires; la dorsale est nuancée de jaune et d'obscur; les pectorales sont jaunes.

Il varie pour la couleur, et les taches vertes disparaissent quelquefois entièrement.

Je l'ai pris dans le rio Carandahy, branche du rio das Mortes, dans la province de Minas Geraës. Les gens du pays le désignent sous le nom de *Trahira*.

N° 2. *ERYTHRINUS TRAHIRA*, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 18.

Il est toujours d'un brun foncé; sa taille ne dépasse pas 25 centimètres. Commun dans les eaux douces des environs de Bahia.

N° 3. *ERYTHRINUS VITTATUS*, Cuv., Val., t. XIX, p. 490, pl. 585.

De la rivière des Amazones.

FAMILLE DES CLUPÉOÏDES.

GENRE HARENGULA.

N° 1. *HARENGULA HUMERALIS*? Cuv., *Règne animal*; Cuv., Val., *Poissons*, t. XX, p. 205.

De Bahia.

NOTA. — Ce n'est qu'avec doute que je rapporte mes individus à *l'humeralis*; ils présentent un éclat doré que n'ont pas ceux de cette espèce également conservés dans l'alcool.

GENRE PELLONA.

N° 1. *PELLONA CASTELNEANA*, Cuv., Val., t. XX, p. 206.

M. Valenciennes décrit ainsi ce *Pellone* que j'ai rapporté de l'Amazone :

« Une seconde espèce de *Pellone* vient d'être rapportée par M. de Castelnau; voisine de celle de M. d'Orbigny, elle en diffère :

» Par une paupière adipeuse beaucoup plus large, par une tête plus convexe et plus arrondie; elle a de nombreuses vésicules ramifiées sur le préopercule et sur le haut de l'opercule; les dents sont beaucoup plus fortes que celles de l'espèce précédente. On voit très bien sur le palais les trois groupes de dents palatines, ptérygoïdiennes et celles de la langue. Il n'y en a point sur le vomer. Les pectorales sont imbricées plus bas; le premier rayon est plus large; l'écaille de son aisselle est beaucoup plus longue; l'anale est coupée en faux, et les rayons antérieurs sont un peu plus hauts. Les lobes de la caudale sont plus larges et plus arrondis.

B. 6; D. 19; A. 36-38.

» La couleur était verdâtre sur le dos, argentée sous le ventre. La dorsale a des teintes verdâtres; la caudale, entièrement couverte d'écailles, a le lobe inférieur marqué d'une large tache noire. Les autres nageoires sont jaunâtres.

» Nous possédons deux exemplaires de ce poisson, dont l'un a 17 pouces.»

NOTA. — Les deux individus s'étant égarés, je n'ai pu figurer cette espèce.

GENRE PRISTIGASTER.

N° 1. PRISTIGASTER MARTII, Agassiz, *Poissons* de Spix, pl. 24.

Cette espèce n'existait pas dans les collections du Muséum avant mon voyage. Je l'ai trouvée dans la rivière des Amazones.

N° 2. PRISTIGASTER PHAETON, Cuv., Val., t. XX, p. 358, pl. 28, fig. 3.

(PLANCHE XXVIII, fig. 3.)

M. Valenciennes, le comparant aux espèces déjà connues, dit qu'il en diffère :

« Parce qu'il a le ventre moins saillant, d'où il résulte que le corps est plus allongé. La hauteur est contenue deux fois et un tiers dans la longueur totale, en n'y comprenant pas les filets de la caudale, tandis que dans l'espèce précédente elle surpasse sensiblement la moitié de la longueur du corps. L'anale est beaucoup plus allongée; elle ressemble, sous ce rapport, au *Pristigaster* de Cuvier, qui a 52 rayons.

D. 15; A. 51, etc.

» La caudale, qui est fourchue, a ses lobes plus étroits et plus pointus que ceux de l'espèce précédente. Les trois rayons externes du lobe supérieur sont prolongés en filaments plus longs que le lobe. Les épines de la carène du dos sont fortes. La couleur ressemble à celle des précédentes, c'est un verdâtre sur le dos. Tout le reste du corps brille d'un bel éclat d'argent poli.

» La longueur du poisson est de 4 pouces $\frac{1}{2}$, sans compter les filets, et de 6 pouces, au moins, en mesurant depuis le bout du museau jusqu'à leur extrémité.»

FAMILLE DES SALMONOÏDES.

GENRE CURIMATUS.

N° 1. CURIMATUS CIPRINOÏDES, Linn. (*Salmo*), *Syst. nat.*, 13^e édit., p. 1385; Gronov., *Lus.*, 378; Cuv., Val., *Poissons*, t. XXII, p. 7.

Salmo edentulus? Bloch, t. XI, p. 380.

J'ai rapporté ce poisson de l'Amazone.

N° 2. CURIMATUS CILIATUS, Muller et Troschel (*Anodus*), *Horæ ichth.*, p. 3, t. IV, fig. 4 ;
Cuv., Val., t. XXII, p. 15.

J'ai été le premier à rapporter ce poisson au Muséum de Paris. Je l'ai trouvé dans l'Amazonie.

N° 3. CURIMATUS LATIOR, Spix, Cuv., Val., *Poissons*, t. XXII, p. 19.

Même observation que pour le précédent; il habite aussi l'Amazonie.

N° 4. CURIMATUS ELONGATUS, Agassiz (*Anodus*), *Poissons* de Spix, pl. 40 ; Cuv., Val.,
Poissons, t. XXII, p. 20.

J'ai rapporté ce poisson de l'Amazonie, ainsi que les précédents; il n'existait pas avant au Muséum de Paris.

GENRE LEPORINUS.

N° 1. LEPORINUS IMMACULATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXIX, fig. 1.)

Dessus du corps, d'un vert obscur; ventre, côtés et dessous de la tête d'un blanc argenté; deux grandes taches arrondies et noires de chaque côté du corps; la première vers le milieu et l'autre plus en arrière; nageoires, pectorales et ventrales jaunes; la deuxième dorsale rose à la base et noire dans l'autre moitié; la première dorsale, l'anale et la ventrale olivâtres; cette dernière ayant sa moitié la plus rapprochée du corps plus obscure que l'autre.

Ce poisson est commun dans le rio Vermelho de Goyaz, où on le désigne sous le nom de *Piaho*. Je l'ai revu dans le Tocantins, à San-Juão das duas Barras, où on le désignait sous le nom d'*Aracou*. Cette espèce est très voisine du *Curimatus obtusidens* de M. Valenciennes (*Poissons* de d'Orbigny, pl. 8, fig. 2), et c'est celle que ce professeur indique comme appartenant à cette espèce (*Poissons*, t. XXII, p. 28), et rapportée par moi de l'Amazonie. Le seul fait que l'*obtusidens* habite la Plata me faisait concevoir des doutes sur l'exactitude de ce rapprochement, et la figure dessinée sur le vivant de mon poisson suffira, je crois, pour établir nettement les différences spécifiques qui obligent de les séparer. Les couleurs empêchent de confondre ce poisson avec le *Salmo Frederici* de Bloch.

N° 2. LEPORINUS MACULATUS, Muller et Troschel, *Horæ ichth.*, p. 11; Cuv., Val., t. XXII, p. 31.

(PLANCHE XXIX, fig. 2.)

Corps d'un jaune sale, avec trois bandes transversales noires, entre chacune desquelles on voit une tache plus courte; celle qui est la plus rapprochée de la queue est arrondie; le ventre et le dessus de la tête sont blancs.

Ce poisson est bien celui décrit par M. Valenciennes, mais je ne suis pas certain que ce soit celui de MM. Muller et Troschel.

Il vient du rio Crivas, dans la province de Goyaz, et porte le nom de *Pizo*.

N° 3. *LEPORINUS VITTATUS*, Cuv., Val., t. XXII, p. 33.

(PLANCHE XXX, fig. 3.)

J'ai rapporté cette espèce de l'Araguay, dans la province de Goyaz. M. Valenciennes la décrit de la manière suivante :

« Une espèce de *Léporin*, à corps allongé comme celui de la précédente, s'en distingue par ses dents tronquées comprimées.

» Elle a le museau un peu plus obtus; la caudale plus engagée sous les écailles du corps.

B. 4; D. 11; A. 9; C. 23; V. 9; P. 16.

» Les écailles, plus nombreuses sur les flancs, sont au nombre de quarante-cinq. La tête est couverte de points noirâtres; des taches plus grosses, disposées par séries longitudinales, marquent cinq ou six bandes longitudinales sur le haut du côté. Le ventre n'a que quelques taches effacées. Je vois sur chaque lobe de la caudale trois raies noires obliques. Il y a aussi une raie sur la dorsale. Le fond de la nageoire me paraît avoir été jaunâtre; les autres nageoires sont sans taches.

» Je possède deux individus de cette espèce, longs de 6 pouces $\frac{1}{2}$, et qui ont été rapportés de l'Amazone par M. de Castelnau.

N° 4. *LEPORINUS BRACHYURUS*, Cuv., Val., t. XXII, p. 36.

(PLANCHE XXX, fig. 1.)

J'ai rapporté cette espèce de l'Araguay. M. Valenciennes en a donné la description sur ces individus :

« L'une de ces espèces, remarquable par la taille de quelques individus, a été rapportée de l'Amazone par M. de Castelnau.

» Ce sont des poissons à corps trapu, à queue courte, dont la caudale est remarquable par la largeur et l'épaisseur de ses rayons. L'anale est basse.

B. 4; D. 11; A. 9; C. 23; P. 17; V. 9.

» Les écailles sont de grandeur moyenne, assez épaisses; il y en a quarante entre l'aine et la caudale. La tête est courte et grosse. Le front est très large. Les dents sont fortes; celles de la mâchoire supérieure tout à fait tronquées; les deux moyennes d'en bas sont longues, épaisses et proportionnellement beaucoup plus pointues que celles du *Leporinus obtusidens*, quoique l'individu que je décris soit beaucoup plus grand; ce qui prouve que les dents de ces poissons ne deviennent pas émoussées avec l'âge.

» La couleur me paraît avoir été un vert assez uniforme sur le dos et sur les flancs, avec le centre des écailles un peu plus clair. Le dessous du ventre était blanc argenté; les nageoires n'ont conservé aucune trace particulière des taches.

» Le plus grand de nos individus a 17 pouces; un second, plus petit, n'en a que 14.»

GENRE EPICYRTUS.

N° 1. EPICYRTUS PARADOXUS, Muller, *Horæ ichthyol.*, fascicule 1^{re}.

Epicyrus exodon, Cuv., Val., t. XXII, p. 46, pl. 636.

Ce joli petit poisson est en dessus d'un vert à reflets olivâtres et pourpres; il présente sur le dos deux grandes taches arrondies, un peu transversales, d'un noir velouté à reflets bleus: l'une est placée en avant de la dorsale, et l'autre à la base de la queue; sur les flancs, une bande longitudinale assez large et jaune; ventre d'un blanc argenté et rosé. Nageoires rouges; la première dorsale est mélangée de jaune; la caudale, de cette dernière couleur, avec une tache terminale rouge. Tête argentée.

Ce poisson est connu des pêcheurs du Goyaz sous le nom de *Conniveta*. Les Carajas lui donnent celui d'*Arum*.

Nous le vîmes pour la première fois dans le rio Crixas, et ensuite dans l'Araguay; enfin je l'ai repris dans l'Amazone.

N° 2. EPICYRTUS GIBBOSUS, Linn. (*Salmo*), *Syst. nat.*; Cuv., Val., *Poissons*, t. XXII, p. 43, pl. 636.

Des eaux douces de la province de Minas Geraës.

GENRE SALMINUS.

N° 1. SALMINUS HILARI. Cuv., Val., t. XXII, p. 64.

(PLANCHE XXXI. fig. 1.)

Le corps est d'un bleu clair, devenant presque noir sur le dos; le ventre est argenté; sur les flancs quelques petits traits interrompus et rouges. La première nageoire dorsale, noire dans sa moitié antérieure; l'autre portion est rouge à sa partie supérieure et jaune à l'inférieure; la seconde dorsale est noire; la caudale est bleue au milieu avec les portions latérales de trois couleurs: noire à la base, rouge vers le bord externe, et jaune en dedans. L'anale est jaune avec sa partie antérieure rouge; les ventrales et pectorales rouges. La tête est jaune, à reflets rouges; elle présente une sorte de bande longitudinale obscure derrière les yeux.

Ce poisson, remarquable par la vivacité de ses couleurs, se trouve dans le rio Vermelho, qui traverse la ville de Goyaz; sa chair est fort estimée. Les gens du

pays lui donnent le nom de *Rabo Vermelho* (queue rouge). Je l'ai retrouvé depuis dans la rivière des Amazones.

M. Valenciennes le décrit ainsi :

« Il faut d'abord remarquer que toutes les pièces sous-orbitaires sont plus lisses que dans le *maxillosus*; que le premier sous-orbitaire a sa portion descendante beaucoup plus courte que celle de l'espèce précédente, car elle n'atteint pas à l'orbite. Son bord est presque droit; les dents me paraissent plus petites; les écailles sont plus grandes, je n'en compte que soixante-huit rangées le long des flancs. La caudale est beaucoup plus profondément fourchue.

B. 4; D. 10; A. 23; C. 25; P. 15; V. 9.

» L'anale est plus courte, elle a quatre rayons de moins. »

N° 2. SALMINUS MAXILLOSUS, Cuv., Val., t. XXII, p. 62.

(PLANCHE XXX, fig. 2.)

Cette espèce a été établie sur un très grand individu que j'ai rapporté de l'Amazone, et qui est long de 95 centimètres. Je dois avouer que les différences entre cette espèce et la précédente me semblent se rapporter à l'âge, et que co *Salminus* pourrait bien être simplement un individu adulte de l'*Hilaria*.

M. Valenciennes le décrit de la manière suivante :

« Je crois devoir distinguer du poisson précédent (*Salminus Cuvieri*) un autre individu qui a des formes un peu plus trapues, dont la tête est surtout beaucoup plus grosse et beaucoup plus large. Tout le dessous est sensiblement plus convexe; l'intervalle qui sépare les deux yeux contient plus de trois fois le diamètre; il n'est que double dans l'espèce précédente. Les ciselures du crâne sont plus nombreuses et en même temps plus rugueuses. Le museau est plus large. Les dents de l'intermaxillaire sont plus égales entre elles. Les branches de la mâchoire inférieure sont beaucoup plus larges, plus arrondies; leur forme donne une tout autre physionomie à cet individu. Les dents sont toutes égales entre elles. Le maxillaire est proportionnellement plus long et beaucoup plus épais; aussi y a-t-il plus d'un diamètre de l'orbite entre le bord antérieur de l'œil et la pointe des dents. Le premier sous-orbitaire a la partie supérieure plus large et plus rugueuse; la portion inférieure, proportionnellement plus longue, est bien profondément ciselée. L'échancre du bord postérieur offre plus de sinuosités. Le bord postérieur du second sous-orbitaire a en arrière un angle très marqué. Les stries de la surface sont beaucoup plus profondes, et il en est de même de celles du troisième et du quatrième. Ce troisième sous-orbitaire est plus large, surtout vers le bas. L'interoperculaire est profondément ciselé. Je trouve les écailles proportionnellement plus petites, puisque nous en comptons cent cinq entre l'aîne et

la caudale; l'anale me paraît moins haute de l'avant et plus basse de l'arrière. La caudale est trilobée. Quant aux couleurs, elles diffèrent très peu de celles de l'espèce précédente. Ce sont des rangées de points le long des flancs, au nombre de vingt-deux à vingt-quatre au-dessous de la dorsale.

B. 4; D. 11; A. 57; E. 25; P. 16; V. 9.

» L'individu que je décris est long de 2 pieds 8 pouces. »

GENRE PROCHILODUS.

N° 1. PROCHILODUS BRAMA, Cav., Val., t. XXII, p. 82.

(PLANCHE XXXI. fig. 2.)

M. Valenciennes a décrit cette espèce d'après l'individu que j'ai envoyé au Muséum :

« Voici encore une espèce nouvelle, aussi caractérisée par ses formes générales que par les différents détails qu'une étude attentive de ses parties peut y ajouter.

» Ce poisson a la tête large, car cette largeur égale à peu près les deux tiers de la longueur. Le dessus du crâne est beaucoup plus plat que celui du *Prochilodus dobula*. Le sillou médian est assez marqué. Le front, le devant du museau, les sourciliers, les sous-orbitaires, le limbe du préopercule et l'interopercule sont lisses et sans aucune strie ni granulation. Il n'y a que quelques stries très faibles le long du bord de l'opercule; tout le reste de sa surface est aussi uni que luisant. Il en est de même du préopercule, qui est beaucoup plus large que celui des espèces précédentes. L'œil est grand; son diamètre est trois fois et deux tiers dans la longueur de la tête, et deux fois et trois quarts seulement dans la largeur du crâne. Le tronc de ce poisson est haut et le dos est élevé, surtout au commencement de la dorsale. Sous l'aplomb de cette nageoire la hauteur n'est que deux fois et deux tiers dans la longueur totale. La courbure du ventre est soutenue. La dorsale est haute et pointue; l'anale est courte et haute de l'avant. Sous ce rapport, ce poisson ne ressemble pas autant à une *Brème* que son nom pourrait l'indiquer; mais c'est par la forme générale que j'ai saisi cette ressemblance. L'adipose, quoique petite, est un peu plus développée que celle des espèces précédentes. La pectorale est étroite et pointue, elle n'atteint pas à la ventrale, mais sa pointe en approche plus que celle du *Prochilodus costatus*.

D. 11; A. 12; C. 23; P. 16; V. 9.

» Les écailles sont sensiblement plus petites que celles de toutes les autres espèces, nous en comptons soixante rangées le long de la ligne latérale. »

Il est, en dessus, d'un joli bleu clair, avec les flancs, le ventre, les côtés et le dessous du corps blancs et argentés. Le dessus de la tête est d'un vert foncé; l'opercule un peu jaune; les yeux de cette dernière couleur; les nageoires d'un

gris cendré, la queue et l'anale obscures, bordées de rouge; les ventrales, de cette dernière couleur.

J'ai trouvé cette espèce dans le Tocantins, à San-Juão das duas Barras, dans la province du Para, où on le désigne sous le nom de *Jaraki*.

N° 2. *PROCHILODUS NIGRICANS*, Agassiz (*Pach*), *Poissons de Spix*; Cuv., Val., *Poissons*, t. XXU, p. 81.

(PLANCHE XXXI, fig. 3.)

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est en dessus lie de vin; le haut de la tête est d'un jaune vert; les côtés et le dessous du corps et de la tête d'un blanc argenté; sur l'épaule, des reflets verts; la première dorsale rose tachetée de noir; la queue ayant son lobe supérieur d'un rose très pâle, avec de petites taches noires; le lobe inférieur blanc, également ponctué de noir; l'anale d'un rose carminé, avec la base jaune; les pectorales roses bordées de rouge et blanchâtres vers la base; les pectorales d'un jaune sale.

Le ventre a des lignes blanches qui se détachent sur le fond argenté.

J'ai rapporté ce poisson du Tocantins; il y est désigné sous le nom de *Papatera*.

N° 3. *PROCHILODUS DORLINUS*, Cuv., Val., t. XXII, p. 81.

Décrit par M. Valenciennes de la manière suivante :

« Nous décrirons sous ce nom une belle et grande espèce rapportée de l'Amazonie par M. de Castelnau, parce qu'elle ressemble à l'un de nos *Cyprins* (*Cyprinus dobula*).

» La largeur de sa tête est, sans contredit, plus grande que celle d'aucune autre espèce du genre. Le corps est un ovale assez régulier, parce que le dos n'est pas, à beaucoup près, aussi arqué que celui des espèces précédentes; mais comme le ventre l'est un peu plus, on retrouve la forme générale que j'indique ici. La dorsale ne me paraît pas avoir été très haute; ses rayons sont gros; la caudale a les siens très élargis; il en est de même de l'anale et de la ventrale. La pectorale est courte et arrondie.

B. 4; D. 11; A. 12, C. 23; P. 16; V. 9.

» Les écailles sont un peu plus petites et plus lisses. Nous en comptons cinquante le long de la ligne latérale. La couleur paraît avoir été un argenté assez uniforme. Il n'y a aucune tache sur les nageoires.

» L'individu est long de 20 pouces. »

L'individu de cette espèce n'ayant pas été retrouvé, je n'ai pu le faire figurer.

GENRE PIABUCA.

N° 1. PIABUCA FASCIATA. Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 46.*Schizodon fasciatus*, Schomb., *Fishes of Guyana*, t. 1, pl. 26.*Piabuca schizodon*, Cuv., Val., t. XXII, p. 412.

De l'Amazone et de l'Ucayale.

N° 2. PIABUCA VITTATA, Cuv., Val., t. XXII, p. 415.

(PLANCHE XXXII, fig. 1.

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est en dessus d'un gris obscur à reflets verts; il a trois bandes transversales d'un bleu d'azur, et une autre longitudinale de même couleur sur les flancs, et surtout visible en arrière; le ventre est argenté; les nageoires grises, excepté les pectorales qui sont jaunes; yeux blancs à reflets rouges.

J'ai rapporté ce poisson de l'Araguay. M. Valenciennes l'a décrit sur l'individu que j'ai déposé au Muséum de Paris :

« Une autre espèce, semblable à la précédente par la forme générale, par la brièveté de son anale, par la petitesse de sa tête et par son museau déprimé, offre cependant un caractère remarquable par la force des épines qui hérissent le bord des dents.

B. 4; D. 41; A. 9; C. 25; P. 16; V. 10.

» Les écailles paraissent un peu plus petites, j'en ai compté quarante-cinq rangées le long de la ligne latérale. Les couleurs sont sensiblement différentes de l'espèce précédente. Le dos est vert plus ou moins foncé, et les flancs sont argentés. Il y a quelques traces de taches noires assez larges, mais diffuses, le long des flancs. L'antérieure, très effacée, répond à la pectorale. La seconde et la troisième sont plus diffuses; elles répondent d'abord à l'insertion de la pectorale; puis, pour la seconde, à l'intervalle qui sépare les ventrales de l'anale. Mais une ligne longitudinale, noire, et très marquée, est tracée par le milieu du tronçon de la queue. »

GENRE HEMIODUS.

N° 1. HEMIODUS NOTATUS, Schomb. (*Anodus*), *Fishes of Guyana*, t. 1, pl. 45; Cuv., Val., t. XXII, p. 410, pl. 638.

Il est fort probable que mon poisson est bien celui de Schomburgh, mais il diffère en plusieurs points de la coloration indiquée par ce voyageur.

Il est argenté; le dos est bleu à reflets verts; les nageoires sont rosées et hya-

lines; la queue est hyaline dans son lobe supérieur; l'inférieur présente une tache allongée et noire et une large bordure jaune au bord inférieur; sur les flancs une tache arrondie et noire; œil argenté à reflets jaunes.

J'ai trouvé ce poisson dans l'Araguay. Les pêcheurs de Salinas lui donnent le nom de *Gourdinha*.

GENRE TETRAGONOPTERUS.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces à corps plus ou moins orbiculaire.

N° 1. TETRAGONOPTERUS ORBICULARIS, Cuv., Val., t. XXII, p. 138.

(PLANCHE XXXII, fig. 2.)

Rapporté de l'Amazone et décrit par M. Valenciennes de la manière suivante :

« Je désigne sous ce nom (*Tetragonopterus orbicularis*) une espèce qui se distingue des précédentes par un corps plus arrondi. La hauteur n'est qu'une fois et demie dans la longueur totale. La nuque est un peu moins concave. La dorsale est moins pointue de l'avant. La tête est proportionnellement plus courte, car elle n'est que le cinquième de la longueur totale. L'œil est contenu deux fois et demie dans cette tête. Le troisième sous-orbitaire a son angle inférieur plus fermé, et le limbe du préopercule, sous lui, est aussi plus anguleux. La caudale est plus fourchue, et ses lobes un peu plus aigus.

B. 4; D. 11; A. 34; C. 21; P. 11; V. 7.

» La dorsale est moins haute, l'anale est plus courte. Le nombre des écailles, sur les flancs, est de trente-cinq. »

N° 2. TETRAGONOPTERUS SAWA, nov. sp.

(PLANCHE XXXIII, fig. 1.)

Longueur, 8 centimètres; hauteur, 3 centimètres 1/2.

Cette espèce est bien distincte par sa dorsale, dont les premiers rayons sont très prolongés.

Ce poisson a de grands rapports avec le *Tetragonopterus rufipes* (Val., Poissons d'Orhigny, pl. 11, fig. 1), mais s'en distingue, lorsqu'il est frais, par la couleur, qui, sur le mien, est en dessus d'un joli bleu verdâtre; la nageoire dorsale est d'un bleu plombé, le ventre blanc, les pectorales de cette dernière couleur, les ventrales et l'anale rouges. J'ai trouvé cette petite espèce sur le rio Crixas qui se jette dans l'Araguay; les pêcheurs lui donnent le nom de *Sawa*.

DEUXIÈME DIVISION.

Espèces à corps allongé.

N° 3. TETRAGONOPTERUS FASCIATUS, Cav. (*Chalcurus*), *Mém. du Mus.*, t. V, p. 352, pl. 26, fig. 2; Cuv., Val., t. XXII, p. 159.

(PLANCHE XXXII, fig. 2.)

J'ai trouvé cette petite espèce dans l'Araguay et le Tocantins; sur la première de ces rivières elle porte le nom de *Piquira*, et sur la seconde celle de *Lambari do Cargo*. Lorsqu'il est vivant, ce poisson est brun en dessus, avec des reflets bleus sur le ventre. On voit, de chaque côté, deux taches plus ou moins arrondies et noires, l'une placée derrière l'opercule et l'autre à la base de la queue. Les nageoires sont roses.

Les nombreux individus que j'ai observés n'avaient que 5 à 6 centimètres de long.

N° 4. TETRAGONOPTERUS FUSCO-AURATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXXIII, fig. 2.)

Longueur, 8 centimètres; plus grande hauteur, 2 centimètres $\frac{1}{2}$.

Cette espèce, abondante dans les eaux douces des environs de Bahia, se distingue du *Linnaei*, dont elle est très voisine par sa couleur d'un brun assez obscur et doré, et une tache noire à l'extrémité de la queue qui couvre souvent la base de la nageoire caudale; la dorsale a 10 rayons; la caudale a 18 grands rayons à la queue, sans compter ceux des côtés qui sont moins longs; l'anale a une petite épine et 27 rayons; ventrales de 8 rayons; pectorales de 12 à 13 rayons.

La forme est celle du *Linnaei*.

NOTA. — Les nuances que j'ai indiquées sont prises sur des individus conservés dans la liqueur; lorsque le poisson est vivant, je ne doute pas que les couleurs ne soient très brillantes.

N° 5. TETRAGONOPTERUS VITTATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXXIII, fig. 3.)

Longueur, 10 centimètres; largeur, 3 centimètres.

Nageoire dorsale grande et longue, formée d'une épine et de 9 rayons; caudale de 18 grands rayons, et en tout de 24; anale, avec une petite épine et 34 rayons; les ventrales de 8 rayons; les pectorales longues, falciformes, de 14 rayons.

Le corps est ovalaire, plus élargi que dans le précédent. La couleur est, dans l'alcool, d'un cendré lilas. On voit une grande tache arrondie derrière l'opercule et une ligne plus claire de chaque côté, qui prend l'apparence d'une bande argentée.

De Bahia.

GENRE MYLETES.

N° 1. MYLETES CURIVENTRIS, Cuv., *Mém. du Mus.*, t. IV, pl. 22; Cuv., Val., *Poissons*, t. XXII, p. 208.

J'ai trouvé ce poisson dans l'Amazone.

N° 2. MYLETES DODYXODON, Cuv., Val., t. XXII, 222.

(PLANCHE XXXIV, fig. 1.)

C'est sur les individus que j'ai rapportés de l'Amazone que M. Valenciennes a établi cette espèce :

« M. Castelnau a rapporté de l'Amazone un *Myletes* dont les dents commencent à s'éloigner, par leur forme comprimée et en cuilleron, des poissons précédemment décrits. La nuque est à peine concave. La courbe du dos, jusqu'à l'épine dorsale, qui est très forte, n'est pas très arquée; celle du ventre devait l'être beaucoup plus, autant que je puis en juger du moins d'après mon exemplaire, car la carène de l'abdomen n'a pas été assez ménagée par le préparateur. Il ne reste plus que les deux dernières épines de l'anus, elles sont assez fortes. Je vois à l'intermaxillaire une première rangée de quatre dents, véritables incisives tranchantes, à couronne taillée en biseau, un peu rétrécie au collet, elliptique et sans crénelures. Il y a derrière elles, et de chaque côté, quatre dents à couronnes triangulaires, dont l'arête postérieure est très peu pointue. La mâchoire inférieure a des dents très peu différentes de la supérieure, cependant les deux moyennes ont un petit talon à l'angle externe, et quelques traces de festons; derrière elles existent deux très petites dents coniques, pointues et courbées en crochet; elles sont si petites, qu'il faut y regarder avec attention pour les apercevoir. Cette dentition ne laisse pas que d'être assez différente de celle des autres *Myletes*, cependant je ne puis fonder sur elle la diagnose d'une coupe générique. La dorsale est assez longue, et a les premiers rayons prolongés en petits filaments. L'anale a trois lobes. L'extrémité des rayons ne se termine pas en pointes divergentes. Les premiers sont courbés en lame de sabre, ne sont pas larges. La caudale est fourchue.

D. 22; A. 35.

« Les écailles sont très petites. La couleur était plombée, rembrunie sur le dos et argentée sur le reste du corps. »

N° 3. MYLETES RHOMBOIDALIS, Cuv., *Mém. du Mus.*, t. IV; Cuv., Val., *Poissons*, t. XXII, p. 210.

Tetragonopterus latus, Schomb., *Fishes of Guyana*, t. 1, p. 241.

Je l'ai rapporté de l'Amazone.

N° 4. MYLETES BIDENS, Spix, p. 75, pl. 32; Cuv., Val., t. XXII, p. 201.

(PLANCHE XXXV, fig. 1, 2, 3.)

Cette espèce n'existait pas au Muséum de Paris avant que je l'eusse envoyée des rivières centrales de l'Amérique du Sud.

NOTA. — Je crois qu'il y a quelque confusion dans ce qui a rapport à cette espèce. Le poisson que j'ai rapporté, et qui a été décrit par M. Valenciennes, est le *Pacu* du rio Paraguay, dont il est plusieurs fois question dans la relation de mon voyage. Il est excellent à manger, et forme la nourriture presque exclusive de ceux qui naviguent sur cette rivière. Il est donc presque certain que cette espèce doit être différente de celle de Spix, qui venait de l'Amazonie. Il faudrait pouvoir comparer ces poissons à l'état frais et ayant encore leurs couleurs. Celui du Paraguay est de nuances obscures, il atteint 70 centimètres de long. Pour le pêcher, on attache un fruit à l'hameçon, car tout autre appât serait enlevé par les *Piranhas*, bien que ces dernières soient beaucoup moins communes que dans les affluents de l'Amazonie (elle est de couleur grise). Le nom de *Pacou* ou *Pacoup* est donné, dans différentes parties du Brésil, à une foule d'espèces différentes. Si, comme je le pense, le *Myletes* du Paraguay forme une espèce particulière, je propose de lui donner le nom spécifique d'*edulis*.

GENRE CHALCEUS.

N° 1. CHALCEUS CARPOPHAGUS, Cuv., Val., *Poissons*, t. XXII, p. 252.

(PLANCHE XXXIV, fig. 3.)

Cette espèce est, pendant la vie, d'un lilas clair sur le dos; le ventre est argenté; la partie postérieure du corps offre des reflets verts et bleus; la tête est d'un jaune olive. La ligne latérale est garnie de chaque côté de petits traits branchus, vermicellés et rouges. La première nageoire dorsale est d'un jaune sale à reflets rougeâtres; la deuxième est verte; les nageoires caudales et les inférieures sont blanches à reflets rouges.

J'ai observé ce *Chalceus* dans le rio de Sabara de la province de Minas Geraës; on lui donne le nom de *Piabana*.

N° 2. CHALCEUS HILARI, Cuv., Val., t. XXII, p. 249.

(PLANCHE XXXVI, fig. 1.)

Pendant la vie, ce poisson est argenté, avec le dos d'un brun à reflets bleus; les nageoires sont d'un bleu noir à reflets rouges; la caudale est d'un bleu obscur, avec sa partie postérieure jaune. La tête a des reflets verts, l'œil jaune.

Ce *Chalceus* atteint une longueur d'un demi-mètre. Les pêcheurs de Salinas lui donnent le nom de *Matrinchão*.

N° 3. *CHALCEUS DEVILLEI*, nov. sp.

(PLANCHE XXXVI, fig. 2.)

Longueur totale, 18 centimètres; plus grande hauteur, 4 centimètres.

Dorsale, grande, de 11 rayons; caudale bifide, formée de 19 rayons entiers et de 3 plus courts de chaque côté; l'anale de 27 rayons, dont les 7 premiers vont constamment en augmentant de longueur de derrière à l'avant, tandis que les autres sont égaux et plus courts; ventrales de 8 et pectorales de 14 rayons.

Corps ovalaire allongé; écailles assez grandes, au nombre d'environ cinquante par rangées longitudinales. Ligne latérale placée très bas, comme dans plusieurs autres poissons de ce genre.

Conservé dans l'alcool, ce poisson paraît argenté, avec le dos obscur. La caudale est obscure à la base et à l'extrémité; la plupart des autres nageoires semblent avoir été terminées par une teinte presque noire.

De Bahia.

Je dédie cette espèce à M. Émile Deville, mon infortuné compagnon de voyage, qui, après avoir échappé aux horreurs de l'Ucayale, a été mourir de la fièvre jaune à Rio-de-Janeiro.

NOTA. — Cette espèce est très voisine des *Chalceus ararapeira* (Cuv., Val., t. XXII, p. 244), mais elle s'en distingue par le museau, qui est beaucoup plus allongé que dans le poisson de l'Essequibo.

GENRE *CHALCINUS*.N° 1. *CHALCINUS AURITUS*, Cuv., Val., t. XXII, p. 262.

(PLANCHE XXXVI, fig. 3.)

J'ai rapporté cette nouvelle espèce de la rivière d'Araguay. M. Valenciennes la décrit ainsi :

« Une seconde espèce, rapportée de l'Amazone par M. de Castelnau, se distingue de la précédente :

» Par un corps plus allongé et moins élevé; en effet, la hauteur, portée sur la longueur, y est comprise quatre fois et demie. Il se distingue par un opercule beaucoup plus grand, plus prolongé en arrière, car l'angle, ici, répond à l'aisselle de la pectorale : cela rend la tête plus longue; elle n'est cependant que cinq fois dans la longueur totale. L'œil est plus petit et plus près du bout du museau. L'intervalle, entre les yeux, est plus convexe, et l'espace d'un œil à l'autre est égal à une fois et demie le diamètre de l'œil. Le troisième sous-orbitaire est beaucoup plus étroit; le sous-operculaire est plus visible. L'interopercule est tout autant

recouvert que dans l'espèce précédente. La pectorale est plus longue, plus étroite; elle atteint jusqu'au milieu de la ventrale.

D. 11; A. 26; C. 25; P. 12; V. 7.

» Les écailles sont plus petites que celles du précédent; nous en comptons quarante-quatre rangées le long de la ligne latérale. La couleur est d'un verdâtre plus argenté. Les joues et l'opercule sont surtout très brillants. La longueur de notre poisson est de 10 pouces. »

N° 2. *CHALCINUS TRIFURCATUS*, nov. sp.

(PLANCHE XXXVII, fig. 1.)

Ressemble beaucoup au *brachipomus* (Cuv., Val., t. XXII, p. 259), mais s'en distingue par sa nageoire caudale dont les rayons du milieu se prolongent de manière à former une pointe.

Lorsqu'il est frais, ce poisson a un éclat très argenté; le dos est d'un brun vert, les nageoires dorsales jaunes, la queue variée de gris et de jaune; les rayons prolongés du milieu, bleus. Les nageoires inférieures sont d'un blanc nacré et argenté comme le ventre.

Ce *Chalcinus* atteint 17 centimètres de longueur totale; sa plus grande hauteur est de 5 centimètres.

Cette espèce est remarquable par le renflement de la gorge en avant des pectorales; ce caractère la rapproche du *Chalcinus angulatus* de Spix (Schomb., p. 209). La dorsale est située bien en avant de l'anale.

Ce petit *Chalcinus* est assez commun dans l'Araguay. Les gens de Salinas lui donnent le nom de *Sardinha*.

GENRE SERRASALMUS.

N° 4. *SERRASALMUS RHOMBEUS*, Linn., Lacép., Cuv., Val., t. XXII, p. 272.

(PLANCHE XXXVII, fig. 2.)

Cette espèce ne dépasse guère 22 centimètres de long. Elle est en dessus d'un vert clair; les flancs sont blancs et argentés; le ventre, ainsi que le bord postérieur de l'opercule, d'un jaune vif et doré; les yeux sont rouges. Les nageoires dorsale, caudale et anale sont d'un vert foncé; les ventrale et pectorale, d'un jaune clair; le lobe supérieur de la caudale est moins développé que l'inférieur. Il y a souvent une tache rouge sous la tête.

De l'Araguay.

Cette espèce est désignée dans le pays sous le nom de *Candirou*; elle se nourrit de sang et attaque les nageurs.

N° 2. *SERRASALMUS GIBBUS*, nov. sp.

(PLANCHE XXXVIII, fig. 1.)

Cette espèce a été confondue jusqu'ici avec la précédente. Elle s'en distingue par sa forme plus allongée, moins haute mais plus bombée derrière la tête; par ses dents inférieures plus grandes, plus larges, et ayant chacune un tubercule latéral; la couleur de la partie inférieure de la tête et du ventre est plus orangée. Les nageoires dorsale et caudale sont d'un gris de fer, bordées en arrière de noir; l'anale est grise avec sa base verte.

Ce poisson est désigné dans l'Araguay, où je l'ai observé, sous le nom de *Piranha branca*. C'est peut-être la troisième espèce de *Piraya* de Margrave.

N° 3. *SERRASALMUS HUMERALIS*, Cuv., Val., t. XXII. p. 279.

(PLANCHE XXXVII, fig. 2.)

M. Valenciennes a décrit cette espèce sur l'individu que j'ai rapporté de l'Araguay. On le confond avec le précédent sous le nom de *Piranha branca*.

« Une autre espèce, voisine de celle de M. d'Orbigny (*Serrasalmus marginatus*), s'en distingue par des sous-orbitaires encore plus étroits; ils sont striés, ainsi que les autres pièces operculaires. La mâchoire inférieure est moins saillante au-devant de la supérieure, bien qu'elle la dépasse de toute la largeur de sa branche. Le museau est arrondi, convexe au-devant de la narine, un peu concave en dessus des yeux. La crête interpariétale est convexe.

B. 4; D. 16; A. 33; P. 16; V. 7.

« La couleur est bleu d'acier au-dessus de la ligne latérale, argentée sous le ventre; une tache noire, très marquée, est derrière l'ouïe. Le dos et les flancs sont couverts de points bleus foncés, presque noirâtres. La caudale a une large bordure noirâtre.

« Notre exemplaire est long de 5 pnaues. »

Il est, en dessus, d'un bleu clair; le ventre est d'un jaune orange, ainsi que le bord postérieur de l'opercule et du préopercule; les pectorales sont d'un jaune vif; les dorsales et la base de la caudale noires; le reste de cette dernière est blanc; l'anale est jaune, avec sa partie inférieure d'un rouge orange; une tache noire est allongée en arrière de la tête.

De l'Araguay.

N° 4. *SERRASALMUS AUREUS*, Spix, Cuv., Val., t. XX. p. 282.

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est entièrement d'un brun foncé, devenant pourpre sur les flancs et sur le dessous de la tête.

Je l'ai rapporté de l'Amazonie et de l'Araguay. Les pêcheurs du Goyaz lui donnent le nom de *Rodolera*.

GENRE PYGOCENTRUS.

N° 1. PYGOCENTRUS PIRAYA, Cuv. (*Serrasalmus*), *Mém. du Mus.*, pl. 28, t. VI.

Serrasalmus Piranha, Spix, pl. 28.

(PLANCHE XXXVIII, fig. 2.)

Ce poisson est, en dessus, d'un gris noir à reflets verdâtres; le ventre, le dessous de la tête, les nageoires ventrales, pectorales et l'anale, d'un beau rouge vif; la partie postérieure du dessous du corps est d'un gris argenté, de même que la caudale et les dorsales.

Cette espèce est très commune dans toutes les eaux douces de Goyaz. Je l'ai pris pour la première fois dans le lac des *Perles*, et je l'ai revu depuis dans l'Araguay et le Tocantins; enfin il se trouve, mais moins abondamment, dans l'Amazonie.

C'est la *Piranha* des Brésiliens, le *Coïcoa* des Chavantes, et la *Djuta* des Carajas.

Ce *Pygocentrus* est l'animal le plus redouté des populations qui habitent le bord des rivières, si peu connues encore, qui arrosent la vaste province de Goyaz. Familiarisés avec le danger, les individus de notre race qui vivent dans ces contrées, soit qu'ils appartiennent à la classe des pêcheurs et des chasseurs métis ou nègres, soit qu'ils fassent partie de la famille cuivrée aborigène, tous, dis-je, sont habitués aux dangers sans nombre que présente la vie des coureurs de bois vierges. Pour eux, la chasse du tigre est un jeu, le combat contre un alligator un passe-temps ordinaire, la rencontre d'un boa ou d'un serpent à sonnettes une affaire de chaque jour, et l'habitude les a conduits à braver, sans les remarquer à peine, des périls de toute nature. Mais parlez-leur de la *Piranha*, et vous verrez tous leurs traits se contracter, et une véritable terreur s'emparer de leur regard. C'est que la *Piranha* est, en effet, l'animal le plus à craindre dans le désert. Une rivière, gonflée par la tempête, arrête souvent les pas du chasseur. Celui qui ne craint aucun des dangers prévus ne peut s'élancer à la nage vers la rive opposée, distante de quelques brasses, car il sait que la dent de la *Piranha* l'arrêtera avant le milieu de sa course, et que son corps, dépecé en quelques secondes par des myriades de ces terribles animaux, sera converti en un squelette semblable à ceux des musées anatomiques. On a vu des chasseurs intrépides se laisser mourir de faim dans des situations semblables, sans oser braver un danger contre lequel ils ne pouvaient opposer ni leur force ni leur courage.

Lorsque, fatigué d'une longue et pénible marche dans les bambous et au mi-

lieu des lianes, on parvient, haletant et fiévreux, au bord d'une eau limpide échauffée par le soleil puissant du tropique, on voudrait s'y plonger à l'ombre des arbres séculaires qui surplombent au-dessus de votre tête; mais on sait que sous ces jolis nénuphars, sous ces victorias aux éclatantes corolles, qui tapissent la surface de ces nappes brillantes, se meuvent les sombres bandes de *Piranhas* aux dents tranchantes comme des rasoirs, et, soumis au supplice de Tantale, vous êtes contraint de renoncer à un bain délicieux.

Le voyageur affamé aperçoit des bandes nombreuses d'oiseaux aquatiques: les hérons, les cormorans, passent en foule au-dessus de sa tête; son adresse lui procurerait bientôt un repas nécessaire, mais l'animal blessé tombe dans la rivière, et avant qu'il en ait atteint la surface, les *Piranhas* s'élancent en l'air pour le saisir au passage. Toujours les *Piranhas*. Ah! à elles seules les *Piranhas* feraient fuir ces régions.

Quant à moi, après des années de séjour dans le désert, je puis déclarer que je n'y redoute que deux sortes de dangers, mais que ceux-là me causent une terreur profonde! ce sont les *Piranhas* et les *Mousquites*.

Du reste, comme compensation aux ennuis qu'ils nous causaient, les *Piranhas* faisaient en général les frais du déjeuner de nos gens. Pour s'en procurer, il suffisait de présenter à la surface de l'eau un morceau de viande ou de poisson, et aussitôt il était mordu avec furie par ces animaux qui y engageaient assez profondément leurs dents pour qu'une seconesse rapide pût les faire tomber dans les embarcations, et en quelques minutes on s'en procurait ainsi une vingtaine: ils formaient une addition notable à nos frugales provisions. On voit que l'on retrouve encore ici la grande loi des compensations; mais, cependant, malgré leurs avantages culinaires, je crois que l'on se passerait sans regret de la présence des *Piranhas*.

GENRE PYGOPRISTIS.

N° 1. PYGOPRISTIS SERRULATUS, Cuv., Val., t. XXII, p. 304.

(PLANCHE XXXVIII, fig. 3.).

Ce poisson est, de son vivant, d'un bleu clair sur le dos, passant au vert en approchant de la queue. Les flancs sont rougeâtres et le ventre blanc; le dessus de la tête, les pectorales et la deuxième dorsale sont verts; la base de la caudale est de cette dernière couleur; puis vient un espace blanc, et enfin un liséré noir; l'anale est blanche dans son premier tiers et rouge dans le reste, elle est bordée en arrière de noir; la première dorsale est d'un bleu clair et finement bordée de noir en arrière.

J'ai pris ce poisson sur l'Araguay et ensuite sur l'Amazone. Les pêcheurs de Goyaz lui donnent le nom de *Pacoup*.

Il a été décrit de la manière suivante par M. Valenciennes, sur l'individu que j'ai envoyé au Muséum.

« Je possède une seconde espèce dont les formes diffèrent sensiblement de la précédente (*Pygopristis denticulatus*). La concavité du profil au devant de la nuque est beaucoup plus sentie. La tubérosité au devant des narines est plus forte, et l'extrémité du profil est presque coupée droite et obliquement. La courbure du dos remonte beaucoup plus brusquement jusqu'à la dorsale, implantée sur une ligne qui descend plus obliquement en arrière. La mâchoire inférieure est plus saillante. Le profil du ventre a sa plus grande gibbosité au-dessous de la pectorale. La ligne de dentelures se rend ensuite presque horizontalement jusqu'au premier rayon de l'ovale, et le bord de cette nageoire remonte en ligne droite jusqu'à la queue, d'où il résulte que la circonscription du corps est plutôt rhomboidale qu'orbiculaire. Sa hauteur égale la moitié de la longueur totale. L'œil est plus grand et plus saillant; le premier sous-orbitaire plus petit, les autres sont plus fortement striés; le un de la joue est plus étroit. Le limbe du préopercule a le bord plus droit; l'interopercule est un peu plus large. Les dents sont en même nombre aux deux mâchoires; mais celles d'en bas sont plus obliques. Les dentelures sont moins nombreuses et moins profondes. Les épines du ventre sont plus longues et plus libres, ce qui rend la carène plus nettement dentée en scie. Je lui trouve la pectorale plus pointue; l'épine de la dorsale est plus détachée et plus aiguë; la ligne latérale est moins infléchie; enfin, la caudale me paraît un peu plus fourchée, et l'adipeuse est sensiblement plus petite.

B. 4; D. 16; A. 33; P. 16; V. 6.

» La couleur paraît plus cuivrée que celle de l'espèce précédente, et il y a auprès de l'épaule quelques traces d'une large tache noire; les nageoires sont plus rembrunies.

» Notre exemplaire, long de 6 pouces, a été rapporté de l'Amazone par M. de Castelnau. »

GENRE CYNOPOTAMUS.

N° 1. CYNOPOTAMUS ARGENTEUS, Cuv., Val., t. XXII, p. 317.

Mon individu ressemble beaucoup à celui de la planche 9, fig. 1, des *Poissons* de M. d'Orbigny, qui représente le *Cynopotamus argenteus*; mais il m'est impossible de ne pas concevoir des doutes sur l'identité spécifique d'un poisson du bassin de l'Amazone avec un de ceux de la Plata. Mon exemplaire, qui vient de l'Araguay, est du reste en trop mauvais état pour lever toutes les incertitudes à cet égard.

N° 2. CYNOPOTAMUS GIBBOSUS, Cuv., Val., t. XXII, pl. 321, p. 645.

J'ai rapporté cette espèce de la rivière des Amazones et de celle de l'Ucayale.

GENRE CYNODON.

N° 1. CYNODON SCOMBEROIDES, Cuv. (*Hydrocyon*), Val., t. XXII, p. 321.

(PLANCHE XXXIX, fig. 2.)

La figure de Spix est tellement défectueuse, que je ne me fonde, pour y rapporter mon espèce, que sur l'autorité de M. Valenciennes.

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est en dessus d'un gris argenté, à reflets jaunes sur le ventre; les nageoires dorsales sont noires; la caudale et l'anale sont à reflets rouges et lie de vin; les pectorales et les ventrales sont d'un blanc transparent. La tête est argentée à reflets assez vifs; les deux grandes dents de la mâchoire inférieure dépassent beaucoup la longueur des canaux dans lesquels elles traversent la mandibule supérieure, en sorte qu'elles forment, lorsque la bouche est fermée, des espèces de défenses devant les yeux; une tache allongée et noire se voit derrière l'opercule.

Ce *Cynodon*, que je n'ai rencontré que sur l'Araguay et au lac des Perles, est désigné, à cause de ses dents, sous le nom de *Cachorro* (chien) par les pêcheurs brésiliens; les Indiens Carajas le nomment *Gorossé*.

N° 2. CYNODON VULPINUS, Spix, *Poissons*, pl. 26.

(PLANCHE XXXIX, fig. 1.)

Habite communément la rivière des Amazones.

N° 3. CYNODON GIBBUS, Ag., *Poissons* de Spix, p. 27.

J'ai trouvé ce poisson dans la rivière des Amazones.

GENRE XIPHORHYNCHUS.

N° 1. XIPHORHYNCHUS FALCATUS, Bloch (*Salmo*), t. XI, pl. 385.

J'ai trouvé ce poisson dans l'Amazone.

N° 2. XIPHORHYNCHUS HEPSETICUS, Cuv., Quoy et Gaynard, Val., *Poissons* de d'Orbigny, pl. 9, fig. 1; id., *Poissons*, t. XXII, p. 343.

J'ai rapporté cette espèce de Bahia.

GENRE XIPHOSTOMA.

N° 1. XIPHOSTOMA MACULATA, Cuv., Val., t. XXII, p. 357.

(PLANCHE XL, fig. 2.)

Cette espèce, que j'ai rapportée de l'Amazone, a été décrite de la manière suivante par M. Valenciennes, sur l'individu que j'ai déposé au Muséum de Paris.

« Quoique très voisine des précédentes (*Cuvieri*, *ocellatum*), elle se distingue par son museau pointu, par la dorsale, qui est tellement reculée, qu'elle est presque au-dessus de l'anale. La caudale est profondément fourchue.

D. 10; A. 11; P. 17.

» Le dessus du crâne est plat. Le poisson paraît rembruni, avec le centre des écailles plus pâle. De grandes taches noirâtres couvrent principalement les trois nageoires impaires. J'en vois aussi quelques-unes sur l'opercule, dans l'aisselle de la pectorale et même sur les nageoires paires.

» Le seul individu que nous possédions est long de 11 pouces. »

N° 2. XIPHOSTOMA OSERYI, nov. sp.

(PLANCHE XL, fig. 1.)

Xiphostoma Cuvierii, Val., t. XXII, p. 355.

Je dédie à mon infortuné compagnon de voyage, Eugène d'Osery, une belle espèce de *Xiphostome* que j'ai trouvée dans le Tocantins, et que M. Valenciennes rapporte, mais avec doute, au *Xiphostoma Cuvieri* de Spix, dont il diffère évidemment par plusieurs caractères, et particulièrement par la forme de l'extrémité du museau, qui est pointu et relevé; il est possible, du reste il faut l'avouer, que cette partie se soit abaissée dans l'individu conservé.

D'après un dessin fait par moi sur le vivant, ce poisson est d'un brun clair en dessus; le ventre est blanc et argenté; la lèvre supérieure est noire. A la partie postérieure de la queue, on voit une tache arrondie et noire bordée en arrière de jaune. La caudale est brune, avec une bande transversale jaune et son extrémité rouge. La première dorsale est d'un jaune clair, la deuxième brune, les nageoires inférieures blanches.

Les pêcheurs du Tocantins lui donnent le nom de *Bicudo*.

M. Valenciennes dit :

« Je retrouve, parmi les poissons apportés au Muséum par M. de Castelnau, une espèce qui ressemble beaucoup à celle dédiée par Spix à Cuvier. Quoique très voisine de la précédente (*Xiphostoma lucius*, Spix), elle me paraît avoir l'extrémité du museau plus pointue, le dessus du crâne plus plat, l'œil placé plus

haut sur la joue, car le cercle de l'orbite entaille la ligne du profil; le dernier sous-orbitaire et le sourcilier sont plus étroits. Les nombres diffèrent très peu.

„D. 10; A. 11.

» Les lobes de la caudale sont plus aigus. La couleur de notre individu, conservé dans l'esprit-de-vin, est d'un roux verdâtre au-dessus de la ligne latérale, et blanc argenté en dessous. Un ocelle noir, très marqué, est à l'extrémité de sa queue.

» Cet exemplaire est long de 8 pouces.»

GENRE SAURUS.

N° 1. SAURUS LEMNISCATUS, Lacép., t. V, pl. 6, fig. 1.

Saurus truncatus, Ag., *Poissons de Spéc.*, pl. 45.

Saurus myops, Cuv., Val., *Poissons*, t. XXII, p. 487.

Lorsqu'il est vivant, ce *Saurus* est d'un brun lilas, avec le ventre d'un blanc argenté; la queue a des reflets rouges assez vifs. La tête est d'un brun rouge en dessus et jaunâtre varié de rouge sur les côtés; la gorge est blanche. Les nageoires sont transparentes; celle de la queue est jaune à la base.

Observé au marché de Rio-de-Janeiro.

N° 2. SAURUS FIETENS, Linn. (*Salmo*), *Syst. nat.*, 13^e éd., t. 1, part. 3, p. 4386.

Saurus fietens, Cuv., Val., t. XXII, p. 472.

Corregonus ruber, Lacép., t. V, p. 144.

De Bahia.

N° 3. SAURUS ANOLIS, Cuv., Val., t. XXII, p. 483.

De Bahia.

ORDRE DES MALACOPTÉRYGIENS SUBBRACHIENS.

FAMILLE DES PLEURONECTES.

Les Pleuronectes, ou *poissons plats*, forment un des groupes les plus naturels et les plus anormaux de la classe des poissons.

Les espèces que j'ai rapportées du Brésil sont au nombre de six, dont trois *Rhombus*, un *Plagusia* et deux *Monochir*.

GENRE RHOMBUS.

N° 1. RHOMBUS OCELLATUS, Spix, pl. 46.

Ce poisson est plus allongé que ne l'indique la figure de Spix, qui, du reste, est manifestement faite sur un jeune individu.

Lorsqu'il est vivant, ce *Rhombus* est brun, couvert de taches ocellées irrégulières, bleues, entourées d'un cercle noir, et renfermant un point brun; dans les intervalles que laissent ces taches, on voit de nombreux points noirs.

Cette espèce ressemble, pour la distribution des couleurs, au *Pleuronectes Argus* de Bloch (pl. 48), mais il en diffère par la forme, etc.

Ce Pleuronecte a entièrement perdu ses couleurs dans l'alcool, et l'on ne retrouve qu'avec peine des vestiges de taches.

De Rio-de-Janeiro.

N° 2. RHOMBUS BAHIANUS, nov. sp.

(PLANCHE XII, fig. 1.)

Longueur totale, 10 centimètres; plus grande largeur, 5 centimètres; avec les nageoires, 6 centimètres.

Nageoire dorsale d'environ 70 rayons; caudale de 16 rayons; pectorales de 7 rayons.

Le mauvais état de l'individu ne permet pas de compter les rayons avec précision. Les dents sont très serrées, petites et fines. Le corps, conservé dans la liqueur, est entièrement d'un gris brun, le dessous blanc.

Observé une seule fois au marché de Bahia.

N° 3. RHOMBUS ARAMACA, Margr., livr. 4, p. 122; Johnston, p. 198.

(PLANCHE XI, fig. 3.)

Longueur totale, 35 centimètres; plus grande largeur du corps, 12 centimètres sans les nageoires; avec les nageoires, 16 centimètres.

Nageoire dorsale de 65 rayons; anale de 51 rayons; caudale de 15 rayons; pectorales de 11 rayons, dont le premier très court.

A la mâchoire supérieure on voit trois fortes dents coniques, espacées et aiguës intérieurement; de chaque côté cinq dents semblables et également espacées; et en avant, deux autres plus grandes et un peu courbes, ayant l'apparence des dents venimeuses des ophidiens. Le corps est entièrement couvert d'écaillés à peu près semblables entre elles. La couleur, sur les individus conservés dans l'alcool, est d'un gris cendré; les nageoires portent la trace de taches arrondies et blanches.

Ce poisson est commun au marché de Bahia, où on le désigne sous le nom de *Armação* (prononcez : *armaçan*), qui ressemble à celui qu'indique Margrave.

GENRE PLAGUSIA.

N° 1. PLAGUSIA BRASILIENSIS, Spix, *Poissons du Brésil*, pl. 48.

(PLANCHE XII, fig. 2.)

Cette espèce est commune au marché de Rio-de-Janeiro. La figure de Spix est faite, comme à l'ordinaire, sur des individus décolorés par l'alcool; mais, lorsque le poisson est vivant, il est entièrement d'un lilas clair, avec sept bandes transversales et étroites noires, qui ne s'étendent pas sur les nageoires; on voit aussi une tache semblable à la partie inférieure de la tête.

Dans cet état, ce poisson ressemble beaucoup au *Pleuronectes zebra* (Bloch, t. VI, pl. 187), mais les bandes sont là plus nombreuses que dans mon espèce, et s'étendent sur les nageoires; d'ailleurs il vient des Indes.

Sur les individus que j'ai déposés au Muséum de Paris, et qui sont conservés dans la liqueur, les bandes ont si complètement disparu, que je ne saurais les reconnaître, si mon dessin n'avait pas été fait sur les mêmes poissons.

GENRE MONOCHIR.

N° 1. MONOCHIR MACULIPENNIS, Spix, pl. 49.

Vivant, ce poisson est entièrement d'un brun assez obscur et présente sur le dos une ligne longitudinale noire et neuf autres transversales; on lui voit de plus quelques taches irrégulières noires.

Ces traits se sont bien conservés sur l'individu dans l'esprit-de-vin; le dessous du corps est d'un brun rougeâtre.

C'est, je pense, l'*Achirus lineatus* de M. Valenciennes, *Poissons* de d'Orbigny (*Poissons*, pl. 16, fig. 2); mais mes individus n'avaient pas la bordure rouge indiquée sur cette figure.

Il est assez commun à Rio, et se voit aussi quelquefois au marché de Bahia.

N° 2. MONOCHIR PUNCTIFER, nov. sp.

(PLANCHE XLI, fig. 3.)

Longueur totale, 12 centimètres $\frac{1}{2}$; plus grande largeur, sans les nageoires, 7 centimètres; avec les nageoires, 9 centimètres.

Nageoire dorsale de 48 rayons; anale de 42 rayons; caudale de 16 rayons.

Les écailles sont fines et âpres, surtout celles de la tête. Le poisson est entièrement d'un brun vert, et convert, ainsi que les nageoires, de points noirs nombreux et assez rapprochés les uns des autres; en dessous, il est d'un brun rougâtre.

J'ai trouvé une seule fois ce *Monochir* au marché de Rio.

FAMILLE DES ANGUILLIFORMES.

GENRE MURENOPHIS.

N° 1. MURENOPHIS ROSTRATA (*Gynothorax*), Spix, *Poissons*, pl. 50.

(PLANCHE XLII, fig. 1.)

Grande et belle espèce jaune, couverte de taches assez petites et serrées, de couleur brune.

Cette magnifique espèce atteint 1 mètre de long; elle est surtout remarquable par le renflement de la gorge qui forme une sorte de goître : dans cette partie, le poisson a 10 centimètres $\frac{1}{2}$ de large. A la mâchoire supérieure, il y a de chaque côté quatre ou cinq grandes dents coniques, aiguës et écartées les unes des autres et une autre en avant; en arrière, il y a de chaque côté une rangée de dents serrées, égales, coniques, dirigées obliquement en arrière; au palais, une rangée de trois grandes dents coniques, aiguës et écartées; à la mâchoire inférieure, il y a quatre fortes dents de chaque côté en avant, et une rangée de dents serrées et nombreuses plus en arrière.

Le museau est rétréci et prolongé : d'où vient le nom que lui a imposé M. Spix. A la mâchoire inférieure, au-dessous et un peu en avant de l'extrémité de la bouche, on voit un pore bien marqué et qui se trouve placé au milieu d'une tache arrondie et jaune; des lignes arquées et brunes derrière les coins de la bouche.

L'anus est situé avant le milieu du corps, et derrière lui commence immédiatement la nageoire anale; les taches qui couvrent ce poisson présentent une tendance à devenir ocellées.

Cette espèce semble être fort rare, car je ne l'ai vue qu'une seule fois au marché de Rio-de-Janeiro; depuis, je m'en suis procuré un autre petit individu à Bahia.

La planche de Spix ne me paraissant pas bien rendre ce magnifique poisson, j'ai cru devoir en donner une nouvelle figure.

N° 2. *MURENOPHIS CURVILINEATA*, nov. sp.

(PLANCHE XLII, fig. 2.)

Longueur, 58 centimètres; plus grande hauteur, un peu moins de 4 centimètres.

Cette espèce ressemble beaucoup au *rostratus*, mais en diffère par sa taille beaucoup plus petite, sa gorge non renflée, son museau peu rétréci. Le corps est entièrement d'un brun noir, couvert de piquetures fines et jaunes. A la mâchoire inférieure, et derrière le coin de la bouche, s'étendent des traits arqués et d'un brun obscur.

De chaque côté de la bouche, cinq grandes dents écartées à la partie antérieure et deux plus petites en avant; à la mâchoire inférieure, deux grandes dents de chaque côté; aux deux mâchoires en arrière, une rangée de dents petites, fines, serrées et dirigées en arrière; au palais, trois fortes dents disposées en rangée.

De Bahia.

NOTA. — Ce *Murenophis* de Bahia n'est peut-être qu'un sexe différent du précédent; car les caractères de la dentition peuvent bien varier avec l'âge.

N° 3. *MURENOPHIS VICINA*, nov. sp.

(PLANCHE XLII, fig. 4.)

Longueur totale, 72 centimètres; plus grande hauteur, 5 centimètres. La gorge est assez dilatée.

D'un brun lilas, légèrement marbré de plus clair; nageoire dorsale seule piquetée de jaune, et ayant des lignes longitudinales noires; des traits arqués et noirs assez nombreux sur la gorge et derrière l'angle postérieur de la bouche; l'anale est bordée de blanc.

La dentition est très forte. A la mâchoire supérieure de chaque côté, quatre ou cinq grandes dents écartées et deux petites en avant; de chaque côté, en arrière, une rangée de dents coniques, serrées et courbées en arrière; au palais, trois très grandes dents et une autre rangée en arrière; à la mâchoire inférieure, deux fortes dents de chaque côté en avant, et une série de petites et coniques en arrière.

De Bahia.

N° 4. MURENOPHIS CARAMURU, nov. sp.

(PLANCHE XLII, fig. 1.)

Espèce fort singulière, à ventre très renflé. Le corps est d'un jaune vif, couvert de taches et de marbrures violettes qui deviennent surtout plus nombreuses vers la partie postérieure du corps, qu'elles couvrent quelquefois entièrement; la gorge est le plus souvent sans taches. La nageoire dorsale est d'un jaune vif.

Longueur totale, 53 centimètres.

On lui donne, à Bahia, le nom de *Caramuru*, qui s'applique également à d'autres *Murènes*. Sa chair est assez mauvaise à manger. Je l'ai vu souvent au marché, surtout dans les mois de décembre à mars.

N° 5. MURENOPHIS PUNCTATA, nov. sp.

(PLANCHE XLII, fig. 2.)

Longueur totale, 79 centimètres; plus grande largeur, 7 centimètres $\frac{1}{2}$.

Entièrement d'un violet foncé, couvert de petites taches arrondies blanches, entourées d'un cercle noir. Sur l'individu conservé dans l'alcool, ces taches ocellées ont presque entièrement disparu, et le poisson paraît avoir été couvert de marbrures et de piquetures blanchâtres sur un fond violet.

Dents toutes grandes et espacées; deux au palais.

L'anale commence vers le milieu de la longueur du corps.

Ressemble pour la forme au *rostratus*, à museau prolongé et à gorge dilatée; une série de quatre à cinq pores à chaque mâchoire; des lignes longitudinales noires le long de la partie qui se rapporte à la nageoire dorsale.

De Rio-de-Janeiro.

N° 6. MURENOPHIS OCELLATA, Spix. (*Gymnothorax*). Poissons du Brésil.

Murenophis meleagris?? Shaw, *Gen. zool.*, t. VII, pl. 220; Quoy et Gaynard, *Voyage de Freycinet*, Zool., p. 245, pl. 52, t. II.

Ce poisson est entièrement d'un gris jaune clair; il est couvert de larges taches arrondies et blanches; la queue est mêlée de blanc et de noir; la dorsale est blanche, tachetée de noir, ce qui la fait paraître zébrée; tête brune.

Cette *Murène* porte, à Bahia, le nom de *Tororo*.

NOTA. — Dans la plupart des espèces précédentes, les dents sont de deux sortes : à la partie postérieure des mâchoires, elles sont assez petites, aiguës, coniques, comprimées et serrées les unes contre les autres; dans la partie antérieure, elles sont très grandes, espacées, très aiguës et en forme de canines. Au milieu du palais, on en voit une rangée de trois ou quatre plus grandes encore que les autres. Dans cette dernière espèce, la rangée du milieu manque.

N° 7. MURENOPHIS VARIEGATA, nov. sp.

(PLANCHE XLIII, fig. 2.)

Cette jolie petite espèce est très voisine du *Gymnothorax ocellatus*, et pourrait même en être regardée comme une variété, si je n'avais observé et dessiné les deux sur des individus frais provenant du marché de Rio-de-Janeiro.

Ce poisson a 35 centimètres de longueur. Il est entièrement d'un gris jaune couvert de points plus ou moins arrondis, mais peu réguliers et jaunes; ils sont entourés d'un petit cercle plus foncé et s'étendent sur toute la tête et sur les nageoires; la dorsale en est entièrement couverte, et ne présente pas les taches alternatives noires et blanches de *foceellatus*. Le dessus du corps est semblable au dos.

De Rio-de-Janeiro.

GENRE CONGER.

N° 1. CONGER LIMBATUS, nov. sp.

(PLANCHE XLIII, fig. 3.)

Longueur totale, 35 centimètres.

Entièrement d'un brun clair; œil jaune; des points noirs sur les joues qui se prolongent en une ligne jusqu'au-dessus de la pectorale; celle-ci est noirâtre; une bordure noire s'étend sur toute la dorsale et la ventrale.

De Rio-de-Janeiro.

Dans cette espèce, à part la rangée de dents petites et serrées qui garnit chaque côté des mâchoires, et qui en présente antérieurement quelques-unes en forme de canines longues, arquées et aiguës, il y en a de plus une série au palais, élargies et comprimées. La bouche est largement fendue.

N° 2. CONGER MICROSTOMUS, nov. sp.

(PLANCHE XLIII, fig. 4.)

Longueur totale, 24 centimètres.

Cette espèce ressemble à la précédente, mais elle est beaucoup plus courte et plus ramassée. Ses dents sont toutes très fines, et celles du palais à peine sorties; ce qui me fait supposer que c'est un jeune âge. La bouche est petite, la fente s'arrêtant presque sous le bord antérieur des yeux.

Je n'ai pas de dessin de ce poisson. Dans la liqueur il paraît entièrement d'un lilas clair avec le ventre blanc; les nageoires pectorales sont blanches, les autres sont bordées de noir.

De Rio-de-Janeiro.

N° 3. CONGER MULTIDENS, nov. sp.

(PLANCHE XLIV, fig. 1.)

Longueur totale, 72 centimètres.

Entièrement d'un brun clair en dessus; ventre châtain; gorge blanchâtre; les nageoires dorsale et anale sont claires, bordées de noir. Les dents sont nombreuses, serrées, d'égale largeur dans toute leur longueur, tronquées d'une manière un peu arrondie à l'extrémité; à la partie antérieure des deux mâchoires, elles sont sur plusieurs rangs et même implantées irrégulièrement dans cette partie: ces dents sont plus coniques que les autres. La bouche est grande et largement fendue.

De Rio-de-Janeiro.

NOTA. — Sous le rapport de la dentition, ce poisson présente des caractères importants.

Les dents sont très nombreuses, très serrées, très fines, et à peu près égales et rangées à l'extrémité. A la mâchoire supérieure, elles forment en avant une masse assez compacte qui couvre la partie antérieure du palais, puis elles se prolongent plus en arrière sur deux lignes: ces dents sont obtuses et plus coniques que celles des côtés. A la mâchoire inférieure, les dents forment trois rangées en avant de la bouche.

GENRE SYNBRANCHUS.

N° 4. SYNBRANCHUS VITTATUS, nov. sp.

(PLANCHE XLIV, fig. 2.)

Longueur totale, 39 centimètres.

D'un brun rouge; une large bande d'un jaune vif de chaque côté; des lignes obliques et noires sur les flancs; tête et partie antérieure du corps couvertes de points d'un brun obscur.

De Rio-de-Janeiro.

NOTA. — Cette espèce, quoique bien distincte, se rapproche du *Synbranchus marmoratus*, Bloch, pl. 418.

GENRE OPHISURES.

N° 4. OPHISURUS GOMESII, nov. sp.

(PLANCHE XLIV, fig. 3.)

La dorsale et l'anale s'arrêtent avant d'arriver au bout de la queue, qui se termine en poinçon; les pectorales de grandeur ordinaire. Les dents sont fines, nombreuses, serrées, ayant au palais une troisième rangée. La bouche est largement fendue.

Le corps est entièrement d'un châtain clair en dessus, blanchâtre en dessous; les nageoires sont claires.

Longueur totale, 47 centimètres.

De Rio-de-Janeiro.

NOTA. — Je dédie cette espèce à M. le docteur Hilefonso Gomes, comme un témoignage de ma reconnaissance pour les soins désintéressés qu'il m'a donnés à Rio-de-Janeiro, en concurrence avec mon ami le docteur Weddell, pendant la dangereuse maladie dont j'y fus atteint.

FAMILLE DES GYMNOTOÏDES.

GENRE GYMNOTUS.

N° 1. GYMNOTUS ELECTRICUS, Linn.; Bl., pl. 156; Schomb., *Fishes of Guyana*, t. II, pl. 48; Cuv., *Règn. anim.*, édit. ill., Poissons, pl. 110; *Id.*, édit. Guérin, Poissons, pl. 63.

J'ai vu de nombreux individus de cette espèce dont le plus long avait 1 mètre; la première fois que je le rencontrai, ce fut sur l'Araguay, et je le revis depuis sur la rivière des Amazones.

Les Indiens du Goyaz et du Para donnent au *Gymnote* le nom de *Trem-Trem*. Lorsqu'il est vivant, il est d'un brun olivâtre; sa nageoire anale est d'un vert-olive; la gorge est d'un blanc orangé; les pectorales sont brunes à la base et orange vert à l'extrémité.

Les Chavantes de l'Araguay lui donnent le nom de *Coupi*.

La seule bonne figure que je connaisse de ce poisson est celle de l'édition illustrée du *Règne animal*.

GENRE CARAPUS.

N° 2. CARAPUS FASCIATUS, Pallas (*Gymnotus*), *Spicil. zool.*, VII, p. 35.

Carapus brachyurus, Bloch, pl. 157, fig. 1.

Cette espèce est parfaitement représentée par Bloch. Il est possible que ce soit, ainsi qu'il le dit, la deuxième espèce de *Carapo* de Margrave; mais le fait est douteux. L'individu de ce dernier auteur venait du San-Francisco; Bloch le dit du Brésil et de Surinam, et je l'ai trouvé dans la rivière des Amazones.

Le *Gymnotus fasciatus* de Schomburgk, figuré dans ses *Poissons de la Guyane*, me semble se rapporter à cette espèce.

N° 2. CARAPI'S SANGUIOLENTUS, nov. sp.

(PLANCHE XLVI, fig. 1.)

Longueur totale, 22 centimètres.

Les deux mâchoires sont d'égale longueur; le corps, après s'être enflé sous la

gorge, va en diminuant de longueur à peu près uniformément jusqu'à l'extrémité, où il est obtus et arrondi; la nageoire anale n'atteint pas l'extrémité postérieure du corps. Le poisson est d'un brun olivâtre avec trois points rouges situés de chaque côté à la partie postérieure du corps, et deux taches arrondies, de même couleur, situées sur l'anale; l'une est placée en avant de la moitié de la longueur du corps, et l'autre plus en arrière.

De la rivière d'Urubamba, qui, plus bas, porte le nom d'Ucayale.

GENRE RHAMPHICHTHYS, Müller et Troschel.

Cuvier avait déjà, dans son *Règne animal*, pressenti la nécessité de distinguer des *Carapus* les espèces à bec allongé et ouvert seulement à l'extrémité.

Le type de ce genre est le *Gymnotus rostratus* de Schneider, pl. 106, espèce à tache blanchâtre sur le front et à points de même couleur sur la tête, qui vient probablement aussi de la rivière des Amazones, puisqu'elle provient de l'ancien cabinet d'Ajuda, mais qui est bien distincte des trois que je vais décrire.

N° 1. RHAMPHICHTHYS MARMORATUS, nov. sp.

(PLANCHE XLVI, fig. 2.)

La longueur totale est d'environ 65 centimètres.

Mais le seul individu que j'ai rapporté de ce poisson est incomplet, ayant été déchiré par les *Piranhas*. Le bec est sensiblement moins prolongé que dans le *rostratus*. La couleur générale du poisson vivant est d'un brun noir avec la tête et la gorge vertes, munies de taches plus obscures; sur les jones des reflets jaunes. Nageoires pectorales vertes, avec des taches transversales noires et offrant des nuances rouges; nageoire anale jaune, nuancée de rouge, excepté à la partie antérieure; elle présente deux rangées longitudinales de très petits points noirs.

Ce poisson vient de l'Araguay. Les pêcheurs lui donnent le nom d'*Espada* (épée).

N° 2. RHAMPHICHTHYS PANTHERINUS, nov. sp.

(PLANCHE XLVI, fig. 3.)

Longueur totale, 76 centimètres.

Le museau est encore plus court que dans le précédent, et la tête plus haute et plus élevée en avant des yeux.

Conservé dans l'alcool, il paraît être d'un châtain clair, avec la gorge verdâtre; le ventre est d'un blanc argenté; sur la tête et sur le dos on voit de nombreuses taches d'un brun obscur. On distingue une série de traits obliques et blancs sur la ligne latérale.

D'un lac près de l'Ucayale.

N° 3. RHAMPHICHTHYS LINEATUS, nov. sp.

(PLANCHE XLVII, fig. 1.)

Le museau ou bec est plus étroit et plus prolongé que dans les précédents. La longueur totale est de 54 centimètres.

Les écailles sont beaucoup plus fines dans cette espèce que dans les autres, ce qui la rapproche encore du *rostratus*; mais le corps est d'un brun châtain, finement piqueté de brun, avec une ligne longitudinale claire de chaque côté. Le ventre et le dessous de la tête paraissent avoir été blanchâtres; la nageoire anale est encore d'un brun rose sur l'individu conservé dans l'alcool.

D'un lac de la rivière d'Ucayale.

GENRE STERNARCHUS.

Il est fort peu d'être, même dans la classe si curieuse des poissons, qui offrent des anomalies aussi bizarres qu'en présente celui qui nous occupe : en effet, son anus est situé presque sous la bouche, et un appendice singulier, en forme de long filet flottant, se détache du milieu du dos et rentre dans un profond sillon s'étendant sur la partie postérieure du corps.

Gmelin, dans la 13^e édition du *Systema naturæ* de Linné, représente ce filet comme détaché à son extrémité postérieure, et il est suivi, sous ce rapport, par Bonnaterre qui le fit ainsi figurer dans l'*Encyclopédie*, pl. 24, fig. 82. Cette manière de voir était aussi celle de Pallas. M. de Lacépède, au contraire, apercevant de petits filets déliés se détacher du sillon destiné à recevoir cet appendice, pensa qu'ils devaient se réunir à lui et le maintenir dans sa longueur pendant qu'il serait attaché à ses deux extrémités. La figure qu'en a donnée le grand *Dictionnaire classique d'histoire naturelle* est une copie de celle de Lacépède.

Cuvier, n'ayant vu que deux individus plus ou moins mutilés de ce poisson, conservés au Muséum de Paris, pensa qu'il ne s'agissait que d'un fait accidentel, et dit dans son *Règne animal*, t. II, p. 357 : « J'ai cru m'apercevoir que la séparation est accidentelle, et que c'est proprement un des muscles de la queue qui se détache aisément parce que la peau est plus faible en cet endroit. »

M. Valenciennes semble partager la manière de voir de son illustre collaborateur; car, en rapportant, je ne sais trop pourquoi, aux *Aptéronotes* et sous le nom de *Sternarchus virescens*, un poisson recueilli par M. d'Orbigny (*Poissons*, 1847, p. 11, pl. 13, fig. 2), qui n'a aucun appendice de ce genre, il dit : « Il sert à fixer tout à fait les idées des ichthyologistes sur des poissons voisins des *Gymnotes*, et que Bloch a figurés avec un filet dorsal détaché, que Cuvier a regardé comme un faisceau musculaire détaché des coccygiens. » Mais il

est à remarquer que ce poisson diffère absolument des *Sternarchus* par plusieurs caractères importants, et entre autres par l'absence de la caudale, et que les naturalistes allemands MM. Müller et Troschel l'ont depuis placé dans leur genre *Sternopygus*, ainsi que nous le verrons plus loin.

J'ai eu occasion, pendant le cours de mon grand voyage dans l'Amérique du Sud, de rapporter deux espèces nouvelles de ce genre; et sur l'une, à l'état frais, j'ai vu le long filet dorsal flotter librement sur la surface de l'eau, le poisson ayant été empoisonné par suite des produits végétaux que l'on a l'habitude de répandre à cet effet dans les eaux des lacs ou des rivières peu considérables. Pour moi, ce filet est une nageoire dorsale rudimentaire.

La première mention du poisson qui nous occupe est due à Pallas, qui le fit connaître dans son *Spicilegium zool.* (fasc. 7, p. 35, 1769), sous le nom de *Gymnotus albifrons* (1), que Gmelin lui conserva en l'inscrivant dans son édition du *Systema naturæ* de Linné. Il le décrit de la manière suivante (t. I, part. 3, p. 1138) :

(1) La description de Pallas est si remarquable comme exactitude, que je crois devoir la reproduire ici :

GYMNOTUS ALBIFRONS.

III. Linnæus hanc Gymnoti speciem, forte ex collectione Dalbergiana ipsi notam, in *Systematis naturæ* edit. 12, primis nominavit et breviter adumbravit. Sed nullam omnino mentionem fecit ramenti dorsalis, quod quasi torum a postico hujus piscis dorso exsectum est, et imprimis singularem eum reddit. Colorem etiam imperfectius exposuit, ideoque accuratius describam hic et iconem adjiciam. Inveni specimen hujusce Gymnoti inter Surinamensis Dalbergiana quæ museo Academicæ Petropolitanz accesserunt. Antequam phiala extractum piscem accuratius examinarem, credidi eum exsectum fuisse strium, quam a postico dorso dependentem videbam. Sed admirandum deinde detecti naturæ lumen. Est etiam præterea notabilis hæc species ob caudæ longitudinem et præteritum pinnæ caudalis a pinnæ ani distinctæ, qualis præterea nulli Gymnoto data est.

Data occasione monendum hic mihi est, *Gymnotum fasciatum* (Sels, *Ther.*, vol. III, pl. 32, fig. 1, 2) non esse Gymnoti caraponei varietatem, uti cel. Gronovius (*Zooph. fasc.* 1, p. 11) asseruit, sed præter colorem, qui tamen item omni ætate constans illi est, imo junioribus sæpe distinctior et saturior, evidentissimis notis distinctum. Dorsum illi nempe obscurius, ea structura diversum et imprimis maxilla inferior longior, cum contra in Carapone prope fuso superius rostrum eminent.

Distincta etiam est alia Gymnoti Surinamensis species, quam hîdem pro *G. caraponei* varietate posuit Gronovius. Hæc *G. fasciata* quoque obscurior est, dorso convexo et antrosum profundius canaliculato. Maxilla autem pariter inferior longior et labium superius utrinque ante angulum oris emarginatum, et ante sinum lobulo notatum, quod etiam in *fasciata*. Pinnæ pectoralis hujus radiorum 13, ani 180. Ut alia mittam, Caraponei, *G. fasciatum* et *G. album* judiciose distinguerat *Atrides*, uti et natura distincti.

DESCRIPCIÓN.

Magnitudo Caraponei et forma subsimilis, nisi cauda longiore.

Caput corpore crassius, conicum, compressiusculum, obtusissimum, alepilotum, carnosum, totum poris minutis aspersum. Apex rostri molliissimus.

Os singulare; labium superius utrinque ad apicem rostri proximum, crassissimum, inferiorem maxillam includens, intus versus basem longitudinaliter rugosum. *Maxilla inferior* utrinque præalta cristis, versus apicem declivis, superiorem subtrans, lateribus longitudinaliter excavata et longitudinalibus rugis e basem et frons extrorsum diffuentibus, et totum sinum oris extus late erantibus scum natum; apice vero labio molli, crasso duplicatum, ante palatum colliculis utrinque convexis, denticulis aliquot minutissimis scaber; margines inferioris maxillæ cæci, antrosum interiore latere toti denticulis scabrati.

α GYMNOTUS ALBIFRONS (3. G. dorso anteriore niveo, Pallas, etc.).

B. 1; D. 0; P. 16; V. 0; A. 147; C. 20.

» Habitat Surinami. Ultra pedem longus, Caraponis statura et magnitudine, cul-
» tratus, capite, quousque squamis nudum, canescens, cauda albus, squamis ro-
» tundatis, in dorso minimis vestitus.

» Caput longius hians quam congeneribus, obtusissimum, carnosum, poris ni-
» nutis sparsum. Labium superius crassissimum, mandibulam inferiorem includens;
» hæc præalta utriusque crista versus apicem declivi superiorem subintrans; lingua
» nulla; palatum papillis consutum. Branchiarum opercula undique adnata, apertura
» lunata, ante pinnarum pectoralium basin carnosum; pinnae hæc atræ, prominulæ;
» primo radio basi ossiculo duplicato. Anus in angulo inter membranas branchio-
» stegas, amplior, et pone hunc porus genitalis; pinna ani a gula incipiens. Dorsum
» anterius convexum; pone medium cirrho fusco, carneo-membranaceo, mollissimo,
» supra convexo, subtilis obiter canaliculato, munitum; pone hunc squamis nudum,

Lingua plana nulla. Palatum pino colliculis papillosum, binc sulco profundo incisum et utrinque exiguo spatio striatum.

Nares lineares, membranaceo-marginatæ, medio inter apicem rostri et oculos. Ad rostrum utrinque exigua membrana quadrata, mollissima, veluti tubulus brevis, collapsus.

Oculi parvi, cute communi operiti. Porus aliquot insigniores, per opercula, branchias, et basin maxillæ inferioris dispositi; itaque duo supra oculos et aliquot in occipite.

Opercula branchiarum undique adnata. Apertura ad pinnas pectorales lunata, limbo membranaceo operculi tecta. Membranae branchiostegæ radius unicus postice, brevis.

Anus in ipso angulo inter membranas branchiostegas, amplior, lineari foramine connivens; cui postice adstat porus genitalis.

Pinnæ pectorales basi carnosæ prominulæ, atræ, radiorum 16, e quibus primus basi ossiculo duplicatus, inferiores minimi.

*P. ani a gula incipiens, radiorum 147. Quorum primi et extremi minimi, simplices, reliqui ramosi, ad 66 de-
» crescentes, binc ultra 100^{um} subæquales, dein decrescentes sensim. Membrana inter radios ventris carinæ non
» adnata, sed ibi pervia, quod singulare.*

*E regione $\frac{1}{2}$ pinnæ ani, in dorso, quod priore parte convexum est, oritur cirrhus fuscus carneo-membranaceus,
» mollissimus, alepidotus, supra convexus, subtilis obiter canaliculatus et rufus alba notatus, extremo in ramentum
» sensum tenuissimum, album, adiensans. Pono hunc cirrhum, mirabili natura suo: dorsum alepidotum et longi-
» tudinaliter depressum bangulatum est, versus extremam caudam sensim in sulcum longitudinale ramenti inter duos
» squamarum ordines contractum. Deceret cirrhum quasi u summo dorso longitudinaliter exsertum fuisse, exarte
» enim in deorsum et sulcum quadrat, et ubi cauda albescit, albet quoque cirrhus.*

*Cauda ultra pinnam ani compresso-plana, linearis productur, pinnæque terminatur. quod in nullo Gymnoto.
» Pinna parva, ovata, radiorum 20 et ultra, exilium, ramosorum.*

*Corpus subtilis cultum, acie marginata. Linea lateralis a pacha incipit serie pororum insignium, quæ in an-
» gulo supra aperturam branchialem alepidoto descendit; dehinc dorso usque in extremam caudam parallela decurrit,
» constans squamis majoribus, medio linea elevata, apice porifera notatis. Squamæ totius corporis rotundatæ, ad
» lineam lateralem [maxime infra eandem] majores, in dorso minores, in carina abdominis deorsum imbricatæ.*

*Color corporis ater, capiti, quousque alepidotum, canescens; fascia lactea ab inferioris maxillæ apice incipiens,
» supra per caput longitudinalis, ad nucham adiensans, et linearis dimidia fore piscis longitudine continuata sensim
» evanescit, inter duos squamarum series glabra.*

*Cauda cum sesquiplicari parte ramenti dorsalis et pinnæ ani alba, ultra pinnam ani denno fusca; extremo an-
» tem, cum pinna terminuli, iterum alba, area tantum ad basin pinnæ transversa fusca.*

» secundum longitudinem depresso biangulatum, versus caudam sensim in sulcum
 » cirrhi longitudine contractum; cauda compresso-plana; pinna ovata; fascia nivea
 » a mandibula inferioris apice ad medium dorsum. »

Jusqu'ici il s'agit évidemment d'une seule et même espèce; mais bien que tous les auteurs aient pensé qu'il en avait toujours été ainsi, je me suis assuré du contraire. Ainsi, dans l'*Encyclopédie méthodique*, Bonnaterre (1788), tout en copiant la description de Linné, fit figurer, pour la représenter, une espèce différente (pl. 24, fig. 82), comme il est facile de s'en convaincre, puisqu'il dit que la queue est blanche à son extrémité, et qu'il la figure de la couleur générale du poisson, c'est-à-dire, à peu près noire; la forme générale est aussi beaucoup moins allongée dans l'espèce qu'il figure qu'elle ne l'est dans celle de Pallas et de Gmelin. M. de Lacépède, croyant également à l'identité des deux individus que contenait la collection du Muséum, forma sa description sur les deux, de manière qu'elle participe également de l'un et de l'autre. Il adopta le nom censé français de *Passan* qui se trouvait déjà dans l'*Encyclopédie*. C'est une coutume bien déplorable qu'ont plusieurs dessinateurs, et même quelques naturalistes, de composer une figure sur plusieurs individus qu'ils supposent, souvent à tort, appartenir à la même espèce. Il en résulte nécessairement de fort grandes difficultés de nomenclature.

C'est, du reste, à M. de Lacépède que l'on doit la création d'un genre particulier sur cette espèce qui, jusqu'alors, avait été confondue avec les *Gymnotes*, ainsi que nous l'avons déjà dit. Il lui donne en français le nom d'*Aptéronote*. Schneider, dans son édition de Bloch (en 1802), lui applique celui de *Sternarchus* (1), qui signifie *anus au sternum*, et qui a été adopté par Cuvier comme nom latin de

(1) *Systema ichthyologicum*, p. 497 :

STERNARCHUS.

Anus sub pectore.

1. *Aptéronote*, pl. 94.

Si. *Gymnote macroro similis* forma, magnitudine, corpore atro, squamato, cauda longiore, capite conico, obtusissimo, alveolato, poroso, labiis crassis longitudinaliter rugosis, margine inferioris maxillæ anteriore intus denticulis scabro; colliculi duo, denticulati ante palatum alti paulum pone papillem; cirrhus fuscus, carneo membraceus, prolongus dorso infra emulcati; cauda pinna, lineæ laterali elevata, squamis majoribus tecta; fascia lactea per caput et dorsum dimidium ducta; membrana pinnæ analis venter adnata, sed pervia.

B. 1; P. 16; A. 147; C. 20; D. 1.

Quem Linnaeus eodem nomine appellavit, simillimum vel potius eundem, cirrho tamen dorsali onisso, dicitur pinnæ pectoralis radios 13; A. 152; C. 24 gerere.

Habitat Surinami; ultra pedem longus.

Nota. — La figure représente un poisson de couleur chair, avec deux larges bandes transversales noires; la queue est aussi divisée de ces deux couleurs.

2. *Amatruca*.

Seconde espèce qui appartient probablement à un tout autre genre.

ce genre, d'après la malheureuse coutume qui existe encore chez la plupart des zoologistes français, de donner deux noms à chaque espèce, et de doubler ainsi les difficultés d'une nomenclature déjà si étendue et si compliquée.

On voit que les individus confondus jusqu'ici me semblent devoir constituer deux espèces, et j'y joins deux autres observées pendant le cours de mon voyage. Enfin MM. Müller et Troschel, dans le deuxième fascicule de leur *Horæ ichthyologiae* (Berlin, 1849), décrivent une nouvelle espèce de *Sternarchus* sous le nom de *Sternarchus oxyrhynchus* (pl. 2, fig. 12), qui vient de l'Essequibo, et qui diffère très notablement des précédentes, et d'une manière qui me semble générique, par le museau prolongé en rostre arqué en dessous, et par la nageoire anale qui s'arrête bien avant la fin de la queue. Le filet dorsal est encore libre dans ce poisson.

Avant d'entrer dans la description des espèces nouvelles, qu'il me soit permis de dire quelques mots de la petite famille naturelle des *Gymnotes* qui correspond au genre linnéen de ce nom, et qui est caractérisée par la position de l'anüs plus ou moins rapproché de la bouche, la grande dimension de la nageoire anale et l'absence de la dorsale, du moins sous sa forme ordinaire. Je propose de donner à cette famille le nom de *Gymnotoïdes*; elle renferme les genres suivans :

Nageoire caudale	visible et séparée:	bouche	en bec recourbé ordinaire.	<i>Sternarchorhynchus</i> Cast.	
				<i>Sternarchus</i> , Schn.	
	absente ou réduite à l'anale.		peu aue.	<i>Gymnotus</i> , Linn	
			un bec.	<i>Rhamphichthys</i> , Müll. et Trosch.	
	sans écaillure:		pas de bec:	nageoire anale s'étendant presque jusqu'à l'extrémité du corps.	
				<i>Carapus</i> , Cuv.	
				nageoire anale beaucoup plus courte que le corps.	
				<i>Sternopygus</i> , Müll. et Trosch.	

Le dernier de ces genres, celui des *Sternopygus*, est établi sur le *Sternarchus cirriscens* de M. Valenciennes, dont nous avons déjà parlé.

Entrons actuellement dans le détail des espèces.

N° 1. STERNARCHUS ALBIFRONS, Pallas (*Gymnotus*, *Spicil. zool.*, VII, p. 35, pl. 6, fig. 1.

(PLANCHE XLV, fig. 1.)

Gymnotus albifrons, Gmelin, *Syst. nat.*, t. I, part. 3, p. 1150, n. 3.

Gymnote Pavan, Bonnat., *Encecl.*, Poissons, p. 37.

Gymnote Pavan, Lacép., *Hist. nat. des Poissons*, t. II, p. 209.

Aptéronote à front blanc, Diet. des sc. nat.

Sternarchus albifrons, Müller et Troschel, *Horæ ichth.*, 2^e fasc., p. 15.

Longueur totale, 37 centimètres; plus grande hauteur, 7 centimètres $\frac{1}{2}$; longueur de la tête, 7 centimètres.

Le corps est brun, couvert de points plus foncés; la queue est très allongée ;

une bande blanche couvre la bouche, le devant de la tête et se prolonge le long du dos jusqu'à la naissance du filet; la partie postérieure du corps et de la nageoire anale sont blanches dans une portion supérieure à la moitié de l'espace qui s'étend entre la base du filet dorsal et l'extrémité de la caudale.

Les auteurs font venir ce poisson de Surinam, parce qu'il a été confondu avec notre *Lacépèdei* qui provient certainement de cette colonie; mais le seul individu que possède le Muséum de Paris, de l'espèce qui nous occupe, faisait partie des collections du Muséum d'Ajuda, et venait très probablement de la rivière des Amazones.

N° 2. STERNARCHES BONAPARTII, nov. sp.

(PLANCHE XLV, fig. 2.)

Parmi les objets les plus remarquables que j'ai rapportés de la rivière des Amazones, se trouve cette seconde espèce du genre *Sternarchus*, que je dédie au prince Charles Bonaparte, qui même, s'il n'était pas membre de la maison impériale, serait toujours l'un des princes de la science.

La longueur totale du poisson est de 24 centimètres; la plus grande hauteur de 4 centimètres, sans compter la nageoire anale.

La bouche est très grande, très largement fendue; les lèvres sont grandes, mais moins plissées que dans l'espèce connue; le museau est moins épais et plus pointu dans mon espèce que dans celle de Pallas; les dents sont placées en deux petits laseaux sur la mâchoire supérieure, et forment, de chaque côté, deux rangées à l'inférieure. Une membrane recouvre les yeux; en avant de la nageoire pectorale, on voit l'ouverture des branchies qui est grande, ovulaire, et à l'aspect de l'entrée de l'oreille. Le dos est privé de nageoire, on plutôt celle-ci est remplacée par un filet long et grêle, lequel a, dans mon individu, 8 centimètres de long, et qui rentre dans un sillon qui a 1 centimètre de plus en étendue. L'insertion de ce filet a lieu plus en avant dans mon espèce que dans celle connue antérieurement (*Valbifrons*); elle est placée à 14 centimètres du devant de la tête, et à 10 centimètres $\frac{1}{2}$ de l'extrémité de la queue, en suivant la courbe du dos. Dans l'*Valbifrons* elle est à 26 centimètres du devant de la tête en suivant la même courbe, et à 16 centimètres $\frac{1}{2}$ de l'extrémité postérieure du corps. La nageoire caudale est petite et formée de rayons assez nombreux; l'anale se prolonge jusque en avant de la pectorale; elle est formée d'environ 160 rayons; la pectorale est de grandeur moyenne, et composée de 16 rayons. L'anus est, dans le *Bonapartii*, placé sous la mandibule inférieure, à un peu plus d'un centimètre de la partie antérieure; dans l'espèce de Pallas, il paraît s'ouvrir beaucoup plus en arrière.

Le corps est entièrement d'un gris verdâtre sur l'individu conservé dans l'alcool; la tête est violacée.

J'ai rapporté ce poisson d'une grande pêche faite sur un lac se déversant dans l'Ucayale.

N° 3. STERNARCHUS LACEPEDI, nov. sp.

(PLANCHE XLV, fig. 3.)

Poissan, Bonnat., *Engel. méthod.*, pl. XXIV, fig. 82.

Confondu avec l'*albifrons*, par M. de Lacépède, ainsi que je m'en suis convaincu en étudiant l'individu qui est encore conservé au Muséum de Paris, et qui a servi en partie au dessin de M. de Lacépède, tandis que plusieurs des autres caractères ont été pris sur un individu de l'espèce que nous venons de citer.

Longueur totale, en ligne droite, 18 centimètres; plus grande hauteur, 3 centimètres $\frac{1}{2}$; du devant de la tête à la base du filet dorsal, en suivant la courbe du dos, 17 centimètres $\frac{1}{2}$; du filet à l'extrémité de la caudale, en suivant la même courbe, 5 centimètres $\frac{1}{2}$.

La forme générale paraît arquée; la queue est raccourcie. La couleur générale de l'individu conservé dans l'alcool est d'un brun foncé, avec la tête plus jaune; une bande longitudinale d'un jaune plus clair couvre le haut de la tête, et devenant plus foncée, s'étend le long du dos jusqu'à la base du filet; de chaque côté de cette bande se voit une autre ligne semblable. Les pores de la tête sont plus forts dans cette espèce que dans l'*albifrons*. La partie postérieure du corps est du même brun que le reste, et les nageoires sont également de même couleur.

De Surinam.

N° 4. STERNARCHUS MAXIMILIANI, nov. sp.

(PLANCHE XLV, fig. 4.)

Longueur totale, 14 centimètres; plus grande hauteur, 3 centimètres $\frac{1}{2}$.

La forme générale est élargie sous le ventre; la mâchoire inférieure, un peu plus courte que la supérieure. La couleur générale est un noir brillant et un peu brun; sur le devant de la tête, une tache jaune qui se prolonge le long du dos. La partie postérieure de la queue est orange, avec quelques taches taches; nageoire caudale de cette dernière couleur.

J'ai pris ce poisson dans l'Urubamba. L'individu observé s'est égaré, et je ne l'indique que d'après un dessin fait à la hâte sur les lieux, et qui ne présente aucun prolongement dorsal; mais il est fort probable qu'il était étroitement enchaîné dans le sillon, et qu'il aura échappé à un examen superficiel qui eut lieu dans des circonstances qui peuvent faire concevoir cette omission, car il s'agit ici du poisson dont je parle dans le 4^e volume de ma *Relation*, page 331.

« A deux lieues et demie, nous laissâmes à gauche le ruisseau de Simatini, et à

une lieue et demie plus loin, nous nous arrêtasmes du même côté, à l'embouchure du petit rio Sapiti. Nous n'avions rien mangé, notre faim était affreuse; un de nos Indiens alla à une lieue dans l'intérieur, vers une hutte qu'il disait y exister, et pendant ce temps les gens empoisonnèrent la rivière au moyen d'une racine appelée *coumon*. Bientôt on vit quelques petits poissons flotter, engourdis, à la surface des eaux; nous nous précipitâmes à leur recherche, bien qu'ils ne fussent en général que de la taille d'un goujon; chacun en eut cinq ou six. Parmi eux se trouvait un individu d'une espèce très curieuse; mais son propriétaire, voyant le désir que j'avais de le joindre à nos collections, ne voulut me le céder que pour tout le produit de ma pêche. J'hésitai un instant, puis je fis le marché, et pendant que mes compagnons prenaient leur modeste repas, je m'assis à l'écart, et me mis à dessiner ma nouvelle acquisition. Une heure après, l'Indieu revint avec une charge de bananes; nous les jetâmes dans le feu, pour les dévorer quand elles seraient à moitié cuites. »

Je me fais un plaisir de dédier ce poisson, qui a pour moi un intérêt tout particulier, au prince Maximilien de Wied New-Wied, l'un des voyageurs les plus savants qui aient exploré le Brésil.

Pour terminer cet aperçu de la famille des *Gymnotoïdes*, je vais donner la liste des espèces américaines qui y rentrent, ou du moins de celles dont l'existence est bien établie.

GENRE GYMNOTUS.

1. *Gymnotus electricus*, Lin., Bl., Cuv., etc.

Habite l'Amazonne et toutes ses branches, l'Orénoque, etc.

GENRE CARAPUS.

1. *CARAPUS fasciatus*.

Carapo, de Mergrove.

Gymnotus fasciatus, Pallas.

Gymnotus brachyurus et *Carapo*, Bloch.

Carapus brachyurus et *fasciatus*, Cuv., *Règne animal*.

Carapus inaequalatus, Val., *Poissons du Voyage de l'Orbigny*.

Habite la rivière des Amazones et les cours d'eau de la Guyane.

2. *CARAPUS sanguinolentus*, Castelnau.

Habite l'Ucayali (Péron).

GENRE STERNOPTGUS, Müller et Troschel.

1. *STERNOPTGUS macrurus*, Seba, *Thes.*, t. III, pl. 32, n° 4.

Gymnotus macrurus, Bloch, pl. 157; Cuvier, *Règne animal*.

Habite les rivières de la Guyane.

2. *STERNOPTGUS tenuirostris*, Müller et Troschel, *Novae ichth.*, fasc. 2.

Habite l'Amérique du Sud.

3. STERNOPTERUS VIRESCENS.

Sternarchus virensens, Val., *Poissons du Voyage de d'Orbigny*.

Habite les eaux douces de Buenos-Ayres.

4. STERNOPTERUS LINEATUS, Muller et Troschel, *Hors icht.*, fasc. 2.

Habite le lac Amucu (Guyane anglaise).

5. STERNOPTERUS EQUILIBATUS.

Gymnotus equilabius, Humboldt, *Obarr. zool. et ind. comp.*

GENRE RHAMPHICHTHYS, Muller et Troschel.

1. RHAMPHICHTHYS ROSTRATUS, Seba, *Thes.*, pl. 32 et 69.

Gymnotus rostratus, Bloch, *édit. Schneid.*, p. 522, pl. 166.

Carapus rostratus, Cuv., *Règne animal*, t. II, p. 357.

Habite la rivière des Amozones.

2. RHAMPHICHTHYS HARBORATUS, Castelnau.

Habite l'Araguay.

3. RHAMPHICHTHYS PANTHERINUS, Castelnau.

Habite l'Ucayale.

4. RHAMPHICHTHYS LINEATUS, Castelnau.

Habite l'Ucayale, au Pérou.

GENRE STERNARCHUS.

1. STERNARCHUS ALBIFRONS, Pallas.

Habite la rivière des Amozones?

2. STERNARCHUS BONAPARTII, Castelnau.

Habite l'Ucayale.

3. STERNARCHUS LACRPEDEI, Castelnau.

Habite la rivière de Surinam.

4. STERNARCHUS MAXILLIANI, Castelnau.

Habite l'Ucayale.

GENRE STERNARCHORHYNCHUS, Castelnau.

1. STERNARCHORHYNCHUS MULLERI, Castelnau.

Sternarchus oxyrhynchus, Muller et Troschel, *Hors icht.*, fasc. 2, p. 46, pl. 2.

De la rivière d'Essequibo (Guyane anglaise).

NOTA. — Je trouve dans le *Sternarchus albifrons* 447 rayons à l'anale et 15 aux pectorales; dans le *Bonapartii*, 460 et 15, et dans le *Lacrepidii*, 444 et 16. Il est à remarquer que les dents, qui sont réunies par plaques dans ce genre, sont chacune placées au centre d'une petite cavité.

ORDRE DES LOPHOBRANCHES.

GENRE HIPPOCAMPUS.

N° 1. HIPPOCAMPUS LONGIROSTRIS, Cav., *Règn. anim.*, 2^e édit., t. II, p. 363; Will., j. 25, fig. 4.

Commun à Bahia.

GENRE DORYCHTHYS.

N° 1. DORYCHTHYS LINEATUS, Kaup.

Bahia.

GENRE NEROPHIS.

N° 1. NEROPHIS EQUOREUS, Kaup.; Lin. ? édit. Gu., p. 1456, n° 4.

Bahia.

NOTA. — Les *Lophobranches* ont été étudiés avec grand soin par M. Kaup, mais son travail n'a encore paru que par extrait dans le *Journal de Wiegmann*. La science peut espérer le posséder bientôt, puisqu'il est contenu dans le *Catalogue du Musée britannique*, en ce moment sous presse.

ORDRE DES PLECTOGNATHES.

FAMILLE DES GYMNODONTES.

GENRE ALUTERA.

N° 1. ALUTERA PUNCTATA, Spin., *Poissons du Brésil*, pl. 76.

Ce poisson est connu à Bahia sous le nom de *Phantasma*. Il est fort rare.

Vivant, il est d'un violet obscur, couvert de taches d'un brun orange; les nageoires sont d'un jaune clair.

De Bahia.

GENRE MONACANTHUS.

N° 1. MONACANTHUS SETIFER? Schleg., Thun., *Fauna japonica*.

Ce poisson est connu à Bahia sous le nom de *Ratto* (rat). Il est fort commun dans les mois de décembre et de janvier; ses couleurs sont exactement celles de l'espèce précédente.

N° 2. MONACANTHUS RUPPELI, sp. nov.??

(PLANCHE XLVII, fig. 2.)

Longueur totale, 16 centimètres.

Ce *Monacanthus* est confondu, au Muséum de Paris, avec le *Monacanthus pardalis* de Ruppel (*Neue Werbelthiere*, p. 57, pl. 15, fig. 3), qui est, dit-on, l'autre sexe du précédent : il en est effectivement très voisin, mais il m'en semble bien distinct. Il est vrai qu'il en a la forme, et que l'on retrouve chez lui, à la base de la queue, l'espace couvert de poils que présente cette espèce, mais il est d'un violet clair, avec des lignes longitudinales brunes sur le dos, et des points d'un brun jaune, écartés et disposés en ligne sur les parties latérales et inférieures du corps ; sur la caudale, qui est violette, on voit deux bandes transversales presque noires ; les autres nageoires sont d'un jaune clair, ainsi que l'aril. L'épine dorsale présente plusieurs taches transversales noires. Les grandes dents du devant de la bouche sont toutes échanerées et terminées par une pointe aiguë, tandis que dans la figure de M. Ruppel elles sont indiquées comme coupées carrément à la mâchoire inférieure.

Dorsale de 35 rayons ; à la nageoire caudale, 12 rayons ; ventrale de 30 rayons ; pectorales de 13 rayons.

Sans le caractère tiré de la dentition, il serait difficile de séparer nettement cette espèce du *Pardalis* ; mais cependant il était à présumer qu'une espèce propre jusqu'ici à la mer Rouge, ne pouvait guère se retrouver sur les côtes du Brésil.

C'est avec un vrai plaisir que je dédie ce *Monacanthus* au savant voyageur et naturaliste M. Ruppel.

Ce poisson est commun au marché de Bahia, mais il ne se mange pas.

GENRE BALISTES.

N° 1. BALISTES VETULA, Lin., Gmel., p. 1407, n° 7 ; Bloch, pl. 150.

Gnapperca, Margrove, p. 104.

Gnapperca, Johnston, pl. 34, fig. 2.

Assez commun, surtout en décembre, à Bahia, où on le connaît sous le nom de *Porco* ; atteint environ 35 centimètres de long ; n'est mangé que par les nègres et les esclaves, cependant sa chair n'est jamais regardée comme dangereuse. La figure de Bloch est excellente.

FAMILLE DES SCLÉRODERMES.

GENRE TETRAODON.

N° 1. TETRAODON BAJACU, nov. sp. ?

PLANCIE XLVII, fig. 3.)

Tetraodon testudineus???, Lin., *Amœn. acad.*, 1, p. 309, pl. 1A, fig. 3; Bloch, pl. 439.

J'ai rapporté de Bahia, sur le marché duquel il est fort commun, un *Tetraodon* que l'on a réuni, au Muséum de Paris, avec le *testudineus*, mais qui ne ressemble en rien à la figure que Bloch a donnée de cette espèce. En effet, le mien est en dessus jaune, couvert de taches et de marbrures d'un brun violet; le ventre est d'un blanc rose, parsemé latéralement de points violets; le corps est couvert de fortes papilles et le dos est velu; les nageoires sont jaunes, tachetées d'orange, avec l'extrémité de la caudale noire.

Ce poisson se rapproche beaucoup du *Tetraodon Honckenii* de Bloch, t. IV, pl. 143. Il est mauvais à manger, et se montre surtout à Bahia, de décembre à mars; on lui donne le nom de *Bajacu*, que je lui conserve, car malgré mon désir de suivre les indications du Muséum de Paris, je ne puis réunir ce poisson au *testudineus* que Linné désigne tantôt (*Syst. nat.*) par: «T. abdomine plano, leviores, » dorso suturis curvis albis picto, » et tantôt (*Amœn. acad.*): «Ost. oblongus, » glaber, corpore figuris variis.»

N° 2. TETRAODON SPENGLERI, Bloch, pl. 144.

Bahia.

GENRE DIODON.

N° 1. DIODON ATINGA, Lin., *Mus. ad. Fr.*, 1, p. 58, mais non celui de Bloch.

Bahia.

GENRE OSTRACION.

On trouve communément au marché de Bahia et de Rio plusieurs espèces de ce genre; elles sont confondues ensemble sous le nom de *Taoca*, et on les regarde comme étant une nourriture de rebut, et dévolue en conséquence aux nègres et aux esclaves. On les pêche surtout en grand nombre dans les mois d'octobre et de février.

Je ne citerai que :

N° 1. OSTRACION TRIQUETER, Lin., *Syst. nat.*, p. 407, n° 1; Bloch, pl. 130.

Bahia.

N° 2. OSTRACION QUADRICORNIS, Lin., *Syst. nat.*, p. 409, n° 5; Bloch, t. IV, pl. 134.

Quamajacé opé, Margrave, livr. 4, p. 142.

Vivant, sa couleur est d'un gris verdâtre, couvert de taches arrondies bleues, entourées d'un cercle brun. Sur le devant de la tête, ces taches forment des lignes transversales irrégulières. La bouche est couleur de chair, le ventre blanc, les nageoires hyalines, le milieu de la caudale noir.

Bahia.

POISSONS CHONDROPTÉRYGIENS.

FAMILLE DES SQUALES.

GENRE ZYGENA.

N° 1. ZYGENA TIBURO, Lin., Gmel. (*Squalus*), p. 1495, n° 16.

Bahia.

N° 2. ZYGENA LEWINI, Griffith, *Réyn. anim. anglais*, Poissons, pl. 50.

Bahia.

Les *Zygæna*, ou *Marteaux*, sont fort communs aux marchés de Rio et de Bahia.

GENRE PRIONODON.

N° 1. PRIONODON CUCERI, Margrave, *Brasil.*, p. 164.

Prionodon limbatus, Müller et Henle, *Système méthod. des poissons cartil. plagiotesmes*, p. 49, n° 28.

Frais, il est entièrement d'un gris violet en dessus, blanc en dessous. La première dorsale est d'un bleu clair, bordée de noir; la deuxième est noire à l'extrémité; l'anale est grise, également bordée de noir.

Ce *Squalé* atteint près d'un mètre de long. Il est connu à Bahia sous le nom de *Caçonneta*, qui signifie *petit requin*. Il forme en grande partie la nourriture des esclaves et des pauvres. Il est commun, surtout d'octobre à février.

GENRE SCOLIODON.

N° 1. SCOLIODON LALANDI, Müller et Henle, *Syst. métho l. des cartil. plag.*, p. 30.

Rio-de-Janeiro.

FAMILLE DES RAIES.

GENRE URAIPTERA.

N° 1. URAIPTERA AGASSIZII, Müller et Henle, *Syst. des cartil. plagiostomes*, p. 155, pl. 49.

(PLANCHE XLIX, fig. 2.)

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est entièrement brun, couvert de taches arrondies et d'un bleu clair, fort espacées; la bouche est jaune.

De Rio-de-Janeiro.

GENRE RHINOBATUS.

N° 1. RHINOBATUS HORKELI, Müller et Henle, p. 122, pl. 40.

De Bahia.

N° 2. RHINOBATUS (SYRRHINA) BREVIROSTRIS, Müller et Henle, p. 114, pl. 35.

De Rio.

N° 3. RHINOBATUS UNDULATUS, Müller et Henle, p. 121.

De Rio.

GENRE TRYGON.

Jusque dans ces derniers temps, les naturalistes avaient regardé les poissons de la famille des *Raies* comme éminemment propres aux eaux salées; je fus donc fort étonné, lorsque me trouvant sur le rio Araguay, presque au centre du continent américain, je pris des poissons qui ne différaient, par aucun caractère essentiel, des *Raies* de l'Atlantique; depuis, j'en ai retrouvé dans presque toutes les grandes rivières centrales, telles que le Tocantins, le Guaporé, le rio Grande, l'Amazone, etc.

Les espèces me semblent en être nombreuses, malheureusement la plupart des individus que j'avais recueillis ont été détruits par suite des vicissitudes de nos voyages. Ceux qui sont parvenus au Muséum de Paris me semblent constituer quatre espèces distinctes.

MM. Müller et Henle, dans le *Système des poissons cartilagineux*, décrivent le *Tamura moloro* comme ayant été rapporté de Cuyaba par M. Natterer; et M. Schomburgk, dans ses *Poissons de la Guyane*, figure plusieurs espèces qu'il dit provenir des rivières de la Guyane et du Para: parmi elles se trouve le *Trygon hystrix* de MM. Müller et Henle, que ces naturalistes ont reçu de Surinam et de Maracaiibo, et que M. Valenciennes, dans son Catalogue des poissons rapportés par M. d'Orbigny, dit aussi habiter les eaux de Buenos. J'avoue que je ne puis regarder ce dernier comme une raie d'eau douce; je crois que toutes celles qui sont en ce cas rentrent dans le groupe des *Tamura*.

Les *Tamura* diffèrent des *Trygons* par la forme épaisse et raccourcie de leur queue, et cette division méritera de devenir générique, si de nouvelles recherches confirment l'habitat que je viens d'indiquer.

Les Indiens de l'intérieur craignent excessivement la piqure provenant des aiguillons des *Raies*, de même que les Brésiliens redoutent au suprême degré celle des espèces des bords de la mer.

N° 1. TRYGON (TAMURA) DUMERILII, nov. sp.

(PLANCHE XLVIII, fig. 1.)

Cette espèce atteint de très grandes dimensions, car j'en ai vu des individus qui avaient 1 mètre de diamètre.

Le corps est arrondi et un peu obtus en avant; le milieu du corps est couvert de petits tubercules épineux, assez serrés, et entre lesquels on en voit d'autres très rapprochés, fort petits et aigus. Sur toute la longueur de la queue, jusqu'à la base du grand aiguillon, on observe une série d'épines très grosses à la base, arquées et pointues, disposées peu régulièrement. Le reste de la surface est couvert de très petites épines. De chaque côté de la queue on observe une série d'épines nombreuses et serrées, mais bien moins grandes que celles du milieu.

La couleur générale est d'un jaune châtain, entièrement couverte de petites marbrures noires qui, sur le disque, forment de nombreuses taches annelées, et pour la plupart bilobées; sur le dos et sur les côtés, elles forment des lignes nombreuses et irrégulières; les nageoires de la base de la queue sont d'un beau violet et couvertes de taches arrondies, serrées, d'un beau jaune et entourées d'un cercle noir; le dessous du corps est blanc.

J'ai observé ce poisson sur le rio Araguay. Les Indiens Chambias lui donnent le nom de *Boro*.

NOTA. — Cette espèce est voisine du *Trygon hystrix*, figuré dans les *Poissons* de M. d'Orbigny, mais en est bien distincte. Je la dédie à mon vénérable et savant professeur M. Constant Dumeril.

N° 2. TRYGON (T. ENURA) MÜLLER, nov. sp. ?

(PLANCHE XLVIII, fig. 2.)

Tennura motoro? Müller et Henle, *Syst. des poissons cartil.*, p. 166, n° 16.*Trygon guarapa*? Schomb., *Poissons de la Guyane*, t. II, pl. 21.

Longueur du corps, 22 centimètres; longueur de la queue, 20 centimètres; largeur, 22 centimètres.

Corps tout à fait arrondi, entièrement couvert de petits tubercules granuleux, et à base disposée en côtes; ce qui leur donne un aspect stelliforme.

La queue est garnie d'une rangée longitudinale d'épines coniques droites et aiguës.

Le grand aiguillon de la queue est aplati, un peu arqué en dessus, pointu, denticulé de chaque côté; la queue est courte, obtuse et se termine à 6 centimètres à partir de la base de cet aiguillon; dessous du corps blanc.

Ce poisson est entièrement d'un brun clair, couvert de taches rondes assez grandes et écartées les unes des autres, d'un jaune un peu orangé et entourées d'un cercle noir.

Des rios Crivas et Araguay.

NOTA. — Cette espèce ressemble au *Trygon guarapa*, Schomburgk (*Fishes of Guyana*, t. II, pl. 21), mais les taches sont beaucoup moins nombreuses, etc., etc.

N° 3. TRYGON (T. ENURA) HENLEI, nov. sp.

(PLANCHE XLVIII, fig. 3.)

Ressemble beaucoup au précédent, mais en diffère par le bord antérieur du corps, qui forme à son milieu une pointe obtuse; par les tubercules du dos, qui sont plus petits et moins élevés, bien que l'individu soit plus grand; par la queue, qui présente à son milieu une série double, et dans quelques endroits triple, de grosses épines arquées. De chaque côté une série d'autres épines moins fortes et peu régulières.

Du Tocantins.

N° 4. TRYGON (T. ENURA) D'ORBIGNYI, nov. sp.

(PLANCHE XLIX, fig. 1.)

Longueur du corps, 2½ centimètres; longueur de la queue, 21 centimètres; largeur du corps, 25 centimètres.

Corps arrondi; le bord antérieur forme une légère pointe obtuse en avant; le dos est couvert de petits tubercules stelliformes comme dans le *Boro*. Au milieu de la queue, une série, double dans quelques endroits, de très grosses épines

courbes et pointues, et de chaque côté une série d'autres faibles. Toute la surface est couverte de tubercules et de pointes; la couleur est d'un brun obscur, avec quelques taches plus foncées sur les flancs. Dessous du corps blanc; dessous de la queue annelé et tacheté de brun.

Du Tocantins.

Je dédie, avec plaisir, cette espèce au savant et intrépide voyageur M. Alcide d'Orbigny.

N° 5. TRYGON HYSTRIX? Müller et Henle, p. 167, n° 17; Val., *Poissons de d'Orbigny*, pl. 15.

On a rapporté à cette espèce, au Muséum de Paris, plusieurs petits *Trygons* que je me suis procurés au marché de Rio-de-Janeiro, et qui, bien que ressemblant beaucoup à la figure de M. d'Orbigny, me paraissent différer de son individu par le corps comparativement beaucoup plus lisse, et, dans tous les cas, par l'absence des grosses épines de la partie postérieure de la queue. Ces différences proviendraient-elles de l'âge?? Je ne le pense pas.

Si ce rapprochement était conforme à la nature, ce *Trygon* serait bien une espèce des eaux salées, et non des eaux douces, comme le pense M. Schomburgk.

N° 6. TRYGON SAVI, Lesueur (*Raja*), *Philad. Acad.*, t. p. 42; Müller et Henle, *Syst. des poissons cartil.*, p. 166, n° 16.

De Rio-de-Janeiro.

NOTA. — Cette espèce avait d'abord été trouvée à New-York, mais depuis elle a été rapportée de divers points des Antilles, et particulièrement de Saint-Domingue.

ORDRE DES ICHTHYOSIRÈNES.

GENRE LEPIDOSIREN.

Le genre singulier qui nous occupe a été établi par M. Natterer, dans le 2^e volume des *Annales d'histoire naturelle de Vienne*. Ce naturaliste en fait un reptile voisin des *Sirènes*, mais M. Owen, en le rangeant dans la classe des poissons, nous semble lui avoir assigné sa place naturelle. Il doit certainement former un ordre à part, et être placé entre les reptiles *Batrachiens* et les poissons anguilliformes.

Les espèces connues sont :

N^o 1. LEPIDOSIREN PARADOXA, Natterer, *Ann. hist. nat. de Vienne*, t. II, p. 467.

De couleur noirâtre, avec des taches blanches, provient des étangs des environs de Borba (1), où on lui donne le nom de *Caracuru*, qui me semble être une corruption de celui de *Caranuru* que l'on applique, au Brésil, aux *Murènes* et aux *Anguilles*.

N^o 2. LEPIDOSIREN ANNECTENS, Owen, *Soc. linn. de Londres*, t. I.

Diffère du précédent par la plus grande longueur comparative de la tête, par ses nageoires rudimentaires et sa taille plus petite.

De la rivière de Gambie, sur la côte occidentale de l'Afrique.

NOTA. — La collection du Muséum de Paris possède la peau d'un *Lepidosiren*, sans aucune indication de localité, mais qui me paraît se rapporter à cette espèce par ses appendices rudimentaires, etc. Elle viendrait alors de la côte de Guinée ou du Sénégal.

N^o 3. LEPIDOSIREN DISSIMILIS, nov. sp.

(PLANCHE I, fig. 1.)

Mon espèce semble différer de celle de Natterer, dont elle est très voisine, par les deux petites dents coniques placées au-devant des grosses de la mâchoire supérieure, et qui sont dirigées obliquement en dehors dans le *paradoxa*, tandis qu'elles sont droites dans cette troisième espèce. Les grosses dents de la mâchoire inférieure sont, dans le *dissimilis*, fortement bilobées; le bord externe est sensiblement plus haut que l'interne.

(1) Et non de Bahia, comme il est dit par mégarde dans le Dictionnaire de M. Charles d'Orbigny. Borba est une ancienne mission de l'intérieur du Brésil, sur le *Madeira*.

La ligne latérale est aussi beaucoup plus simple dans mon espèce; elle n'offre pas les petits rameaux derrière la bouche et ne s'étend pas sur le haut de la tête; de plus, le grand rameau inférieur s'arrête à la hauteur des pectorales sans se prolonger sur la partie inférieure du corps.

Le *dissimilis* est entièrement d'un noir olivâtre sans aucune tache.

J'ai trouvé ce curieux animal dans la grande pêche faite dans un lac de l'Égypte, que j'ai décrite dans l'introduction de cet ouvrage. Il avait été empoisonné par le barbasco; lorsque je le pris, il nageait à la surface des eaux, et ses mouvements étaient d'une extrême lenteur; il ne fit aucun effort pour se défendre. Il semble être très rare, car c'est le seul individu que nous procura cette pêche gigantesque. Les Indiens le confondent avec les *Anguilles*, les *Carapes*, etc.

N° 4. LEPIDOSIREN TUBAL, Adanson, ms.

La collection du Muséum de Paris renferme une peau desséchée et incomplète rapportée du *Niger*, c'est-à-dire du Sénégal, par M. Adanson, et qu'il désignait sous le nom de *Tubal*; il vient du Ouolof.

L'animal est en dessus d'un brun assez obscur, et tacheté de points noirs assez grands, arrondis et dispersés irrégulièrement; le dessous du corps est d'un châtain jaune. Les nageoires pectorales paraissent avoir été fort longues. Les écailles sont également grandes et arrondies au bord postérieur.

Longueur totale, 53 centimètres; hauteur, environ 7 centimètres.

Voilà à peu près tout ce que l'on peut distinguer sur un individu aussi complètement altéré.

N° 5. LEPIDOSIREN ARNAUDI, nov. sp.

Ce n'est qu'avec doute que je sépare cette espèce de la précédente. Celle dont il s'agit a été rapportée du Nil Blanc par M. Arnaud, et l'individu qu'il a déposé au Muséum de Paris a été trouvé en juin 1843.

Sa longueur est de 44 centimètres, et sa largeur moyenne de 6 centimètres $\frac{1}{2}$. Il est en dessus d'un brun marron, couvert de lignes jaunes formant des sortes de losanges; le dessous du corps est jaune, couvert de points bruns et serrés. Les pectorales sont extrêmement allongées et forment des filets de 15 centimètres de long; les ventrales sont de même forme, mais plus courtes, bien qu'elles aient encore 10 centimètres. Ces nageoires sont noires, avec leur base un peu brune; la queue est entièrement couverte de taches obscures en dessous comme en dessus, et il en est de même des nageoires; on aperçoit derrière les yeux et derrière la bouche des lignes disposées à peu près comme dans le *Paradoxa*, mais se repliant sous la gorge; la ligne latérale est indiquée par une succession de traits doubles et interrompus.

Les *Lepidosiren* paraissent peu répandus, et les individus semblent être fort rares; cependant je suis persuadé qu'en étudiant ceux qui se trouvent dans les Musées, on verra que les espèces en sont nombreuses. C'est, du reste, manifestement un type dont nous n'avons encore qu'une connaissance très incomplète, et qui recevra de grands accroissements par suite des recherches des voyageurs futurs.

LISTE DES POISSONS

DÉCRITS DANS CET OUVRAGE.

POISSONS OSSEUX.

ORDRE DES ACANTHOPTERYGIENS.				UPEREUS.			
FAMILLE DES PERCOÏDES.				FAMILLE DES JOLIES CUIRASSÉES.			
SERRANUS.	Page.	Planch.	Fig.	DACTILOPTERUS.	Page.	Planch.	Fig.
1. S. guttatus, Bl.	1			1. D. volitans, Linn.	7		
2. S. carassus, Margr.	1	1	1	PHOSOTUS.			
3. S. niveatus, C., V.	2	1	2	1. P. punctatus, Bl.	7		
4. S. costalis? C., V.	2	1	3	SCORPENA.			
5. S. oncus, Bl.	2			1. S. fuscus, Para.	7		
6. S. undulosus, C., V.	2			2. S. brasiliensis, C., V.	7		
7. S. irradiatus, Quoy et Gaim.	3			FAMILLE DES SCIÉNOÏDES.			
PLECTROPS.				UMBRINA.			
1. P. chloropterus, C., V.	3			1. U. arenata, C., V.	8		
2. P. brasiliensis, C., V.	3			2. U. coroides, C., V.	8		
APOGON.				PRISTIGOMA.			
1. A. americanum, Cast.	3	3	2	1. P. rubrum, C., V.	8		
MINIPRISTIS.				2. P. acra-pinnosa, Margr.	8		
1. M. Jacobus, Desm.	3			3. P. bicolor, Cast.	8	2	2
MESOPRISTIS.				POMACENTRUS.			
1. M. unicoloratus, Spix.	4			1. P. fuscus, C., V.	9		
2. M. onale, C., V.	4			2. P. variabilis, Cast.	9	3	3
3. M. chrysurus, Bl.	4			3. P. pictus, Cast.	9	2	4
4. M. jones, Para.	5			HELIASIS.			
CENTROPRISTIS.				1. H. marginata, Cast.	9	3	1
1. C. nebulosus, Cast.	5	2	5	EQUEUS.			
HOLOCENTRUS.				1. E. lanceolatus, Linn.	10		
1. H. cornigerus, C., V.	5			2. E. acuminatus, Bl.	10		
PERCOPUS.				HEMULUS.			
1. P. faber, Quoy et Gaim.	5			1. H. formosus, Bl.	10		
HYPTICUS.				2. H. purpur, Desm.	10		
1. H. microps, Brouss.	6			3. H. canis, Sp.	11		
DOLUS.				4. H. aurolineatus, C., V.	11		
1. D. asper, C., V.	6			GLYPHISODON.			
SPYRACUS.				1. G. saxatilis, Linn.	11		
1. S. barracuda, Shaw.	6						
2. S. becaus, Schu.	6						

JONCHES.

1. <i>J. croustina</i> , Cast.	12	3	1
2. <i>J. omeotonicus</i> , Cast.	12	3	1
3. <i>J. auratus</i> , Cast.	12	3	2

CORONIS.

1. <i>C. punctata</i> , Bl.	13	8	1
2. <i>C. unipunctata</i> , Cast.	13	8	2
3. <i>C. unimaculata</i> , Cast.	13	7	2
4. <i>C. obscura</i> , Cast.	14	0	3
5. <i>C. oblonga</i> , Cast.	14		
6. <i>C. proxima</i> , Cast.	14	7	1
7. <i>C. mayaleusis</i> , Cast.	15	6	2
8. <i>C. unioellata</i> , Cast.	15	6	1
9. <i>C. appendiculata</i> , Cast.	15	7	3
10. <i>C. ocellata</i> , Spix.	16		
11. <i>C. lepidifera</i> , Cast.	16	12	1
12. <i>C. ? sona</i> ,	17	9	1
13. <i>C. fasciata</i> , Cast.	17	9	2

CYCLIS.

1. <i>C. inconspicua</i> , Cast.	17	10	1
2. <i>C. multifasciata</i> , Cast.	18	10	2
3. <i>C. conifera</i> , Cast.	18	10	3
4. <i>C. labrina</i> , Spix.	19		
5. <i>C. lacustris</i> , Cast.	19	8	3

FAMILLE DES SQUAMIPENNES.

CHETODON.

1. <i>C. striatus</i> , Linn.	19		
---------------------------------------	----	--	--

HOLACANTHUS.

1. <i>H. tricolor</i> , Bl.	19		
2. <i>H. formosus</i> , Cast.	19	11	2

POMACANTHUS.

1. <i>P. cingulatus</i> , C., V.	20		
2. <i>P. arcuatus</i> , Linn.	20		
3. <i>P. quinquecinctus</i> , C., V.	20		

EPHIPPIUS.

1. <i>E. gigas</i> , C., V.	20		
2. <i>E. faber</i> , Linn.	21		

PLATANOIDES.

1. <i>P. Dohnerilli</i> , Cast.	21	11	3
---	----	----	---

SPARIS.

1. <i>S. unimaculatus</i> , Bl.	21		
---	----	--	--

FAMILLE DES MENIDES.

GERRES.

1. <i>G. Plomieri</i> , C., V.	21		
--	----	--	--

FAMILLE DE SOMBÉROÏDES.

CARANG.

1. <i>C. piquetus</i> , C., V.	22		
2. <i>C. fallax</i> , C., V.	22		
3. <i>C. guapacha</i> , Margr.	22		
4. <i>C. boobe</i> , Cast.	22		

TRACHURUS.

1. <i>T. trachurus</i> , Linn.	23		
--	----	--	--

AGUTRIJOS.

1. <i>A. sonner</i> , Linn.	23		
-------------------------------------	----	--	--

TRICHURUS.

1. <i>T. lepturus</i> , Linn.	23		
---------------------------------------	----	--	--

FAMILLE DES TENTHÉDES.

ACANTHURUS.

1. <i>A. bahianus</i> , Cast.	24	11	1
2. <i>A. chirurgicus</i> , Bl.	24		
3. <i>A. pluribotomus</i> , C., V.	25		
4. <i>A. caradus</i> ? Bl.	25	12	2

FAMILLE DES MUGILOÏDES.

MUGIL.

1. <i>M. liza</i> , C., V.	25		
2. <i>M. brasiliensis</i> , Spix.	25		

FAMILLE DES GOMBOÏDES.

BLENIS.

1. <i>B. pilicornis</i> , C., V.	25		
--	----	--	--

CLANES.

1. <i>C. pectinifer</i> , C., V.	26		
2. <i>C. fasciatus</i> , Cast.	26	12	2

GOMBUS.

1. <i>G. martinicus</i> , C., V.	26		
--	----	--	--

FAMILLE DES MALTHÉES.

MALTHÉA.

1. <i>M. guacuja</i> , Margr.	26		
2. <i>M. notata</i> , C., V.	26	12	3

FAMILLE DES LABROÏDES.

COSMETRUS.

1. <i>C. vertes</i> , Bl.	27		
-----------------------------------	----	--	--

JILIS.

1. <i>J. dimidiatus</i> , Spix.	28		
2. <i>J. crotaphus</i> , C., V.	28		
3. <i>J. Garrohi</i> , C., V.	28		

NYBICHTIS.

1. <i>N. splendens</i> , Cast.	28	5	2
--	----	---	---

MALACANTHUS.

1. <i>M. Plomieri</i> , Bl.	29		
-------------------------------------	----	--	--

LARNUS.

1. <i>L. radians</i> , Cdv., Val.	29		
---	----	--	--

FAMILLE DES FISTULAIRES.

AULASTOMA.

1. <i>A. Mergavii</i> , Cast.	30	9	3
---------------------------------------	----	---	---

ORDRE DES MALACOPTÉRYGIENS.

FAMILLE DES SILUROÏDES.

SILURUS.

1. <i>S. Valenciennesi</i> , Cast.	31	13	1
2. <i>S. Baviensis</i> , Cast.	32	13	2
3. <i>S. Bonasensis</i> , Cast.	32	14	1
4. <i>S. punctulatus</i> , Cast.	33	14	2

GENIDENS.

1. G. Cavieri, Cast. 34
2. G. grammus, Cast. 34 16 1

PITHELODES.

1. P. clarus, Bl. 34
2. P. claudus, Spix. 35
3. P. pirinampe, Spix. 35
4. P. bolianus, Cast. 35 10 2
5. P. versicolor, Cast. 35 16 3

ARIS?

1. A? longioris, Cast. 36 15 2

GALECHYRUS.

1. G. Pace, Cav., Val. 37
2. G. aragonensis, Cast. 37 17 3
3. G. bahiensis, Cast. 37 18 1

CALLICHTIS.

1. C. asper, Cav., Val. 38
2. C. chiquito, Cast. 38 18 2
3. C. splendens, Cast. 39 18 3
4. C. taloch, Cast. 39 19 1

PLATYSTOMA.

1. P. lima, Bl. 39
2. P. tigrinum, Cav., Val. 39
3. P. capary, Spix. 40
4. P. punctifer, Cast. 40 19 2
5. P. platyrrhynchus, Cav., Val. 40
6. P. affine, Cav., Val. 40

ARGES.

1. A. sabala, Cav., Val. 40

HYPOSTOMUS.

1. H. niatus, Cast. 51 20 1
2. H. operatus, Cast. 51 20 2
3. H. perialis, Cast. 52 20 3
4. H. suberminatus, Cast. 52 21 1
5. H. aurantiacus, Cast. 53 21 2
6. H. nigratus, Cast. 53 24 3
7. H. nigricans, Cast. 53 22 1
8. H. pictus, Cast. 53 22 2
9. H. spinosus, Cast. 55 22 3
10. H. vicinus, Cast. 55 23 1

LONICARIA.

1. L. amazonica, Cast. 56 23 2
2. L. carolina, Cast. 56 23 3
3. L. castanea, Cast. 56 23 4

PHRACTOCEPHALUS.

1. P. hemipterus, Bl. 57 15 1

ATCHENIPTERUS.

1. A. nuchalis, Spix. 57

HYPOPTALMUS.

1. H. edentulus, Spix. 57

DORAS.

1. D. costatus, Lian. 48
2. D. Weddellii, Cast. 48 17 1

AGENIOSCUS.

1. A. inermis, Lacép. 48
2. A. ocayalensis, Cast. 48 17 2

TRICHOMYCTERUS.

1. T. Pentlandi, Cast. 49 25 1
2. T. punctatissimus, Cast. 49 25 3
3. T. pictus, Cast. 50 25 2
4. T. pusillus, Cast. 50 25 4

VANDELLIA.

1. V. clythosa, Val. 51 28 2
2. V. Mazzi, Cast. 51 28 1

FAMILLE DES GYPRINOÏDES.

ORESTIAS.

1. O. Tschudi, Cast. 51 27 1
2. O. Jussieu, Val. 52 27 3
3. O. Pentlandi, Val. 52

FAMILLE DES ÉSOQUES.

BELONA.

1. B. imbec, Merg. 52

HEMIRAMPHUS.

1. H. brasiliensis, Linn. 52

FAMILLE DES BUTIRINS.

ALBULA.

1. A. umbrana, Merg. 53
2. A. macrocephala, Cav., Val. 53

FAMILLE DES HYODONTES.

OSTEOGLOSSUS.

1. O. minus, Vandell. 53 25 2

FAMILLE DES VASTRES.

VASTRES.

1. V. gigas, Cav. 54 25, 26 1

FAMILLE DES ÉRYTHROÏDES.

ERYTHRINUS.

1. E. brasiliensis, Spix. 55
2. E. trahira, Spix. 56
3. E. vittatus, Cav., Val. 56

FAMILLE DES CLUPEOÏDES.

HARENGULA.

1. H. humeralis? Cav., Val. 56

PELLONA.

1. P. castelnaui, Cav., Val. 56

PRISTIGASTER.

1. P. Martii, Spix. 57
2. P. Phaeton, Cav., Val. 57 28 3

FAMILLE DES SALMONOÏDES.

GERINATUS.

1. *G. cyprinoides*, Linn. 57
 2. *G. ellioti*, Müller et Tros. 58
 3. *G. latior*, Spix. 58
 4. *G. elongatus*, Spix. 58

LEPORINUS.

1. *L. bimaculatus*, Cast. 58 29 1
 2. *L. maculatus*, Müller et Tros. 58 29 2
 3. *L. vittatus*, Cuv., Val. 59 29 3
 4. *L. brochiarus*, Cuv., Val. 59 29 1

EMICISTES.

1. *E. paradoxus*, Müller et Tros. 60
 2. *E. gibbosus*, Linn. 60

SALMINES.

1. *S. illarici*, Cuv., Val. 60 31 1
 2. *S. maxillosus*, Cuv., Val. 61 30 2

PROCHILODUS.

1. *P. brama*, Cuv., Val. 62 31 2
 2. *P. nigricans*, Spix. 63 31 3
 3. *P. dobuliensis*, Cuv., Val. 63

PIRACA.

1. *P. fasciatus*, Spix. 64
 2. *P. vittatus*, Cuv., Val. 64 32 1

HEMIDODUS.

1. *H. notatus*, Schomb. 64

TETRAGONOPTERUS.

1. *T. orbiculatus*, Cuv., Val. 65 32 3
 2. *T. sawa*, Cast. 65 33 1
 3. *T. fasciatus*, Cuv. 66 32 2
 4. *T. fusco-auratus*, Cast. 66 33 2
 5. *T. vittatus*, Cast. 66 33 3

MYLIS.

1. *M. duriventris*, Cuv. 67
 2. *M. doidyrodus*, Cuv., Val. 67 34 1
 3. *M. rhomboidalis*, Cuv. 67
 4. *M. bidens*, Spix. 68 35 1-3

GRACILIS.

1. *G. carpophagus*, Cuv., Val. 68 34 3
 2. *G. illarici*, Cuv., Val. 68 36 1
 3. *G. Devillei*, Cast. 69 36 2

CHALCINUS.

1. *C. auratus*, Cuv., Val. 69 46 3
 2. *C. trifasciatus*, Cast. 70 37 1

SERAPALMUS.

1. *S. rhombus*, Linn. 70 37 3
 2. *S. gibbus*, Cast. 71 38 1
 3. *S. biemeralis*, Cuv., Val. 71 37 2
 4. *S. aureus*, Spix. 71

PYGOCENTRUS.

1. *P. piraia*, Cuv. 72 38 2

PYGOPARISTES.

1. *P. serrulatus*, Cuv., Val. 73 38 3

CYNOPOTAMUS.

1. *C. argenteus*, Cuv., Val. 74
 2. *C. gibbosus*, Cuv., Val. 75

CYNODON.

1. *C. scomberoides*, Cuv. 75 39 2
 2. *C. vulpinus*, Spix. 75 39 1
 3. *C. gibbus*, Agass. 75

XIPHOBRYNCHUS.

1. *X. fasciatus*, Ill. 75
 2. *X. hepaticus*, Cuv. 75

XIPHOSTOMA.

1. *X. maculata*, Cuv., Val. 76 40 2
 2. *X. Oseiji*, Cast. 76 40 1

SAURUS.

1. *S. lemniscatus*, Lacép. 77
 2. *S. fortis*, Linn. 77
 3. *S. anolis*, Cuv., Val. 77

ORDRE DES MALACOPTÉRYGIENS SUBBRACHÉENS.

FAMILLE DES PLEURONECTES.

RHOMBUS.

1. *R. ocellatus*, Spix. 78
 2. *R. belizensis*, Cast. 78 41 1
 3. *R. aramaca*, Margr. 78 40 3

PLAGIUMA.

1. *P. brasiliensis*, Spix. 79 41 2

MENOCHIR.

1. *M. maculipennis*, Spix. 79
 2. *M. punctifer*, Cast. 80 41 3

FAMILLE DES ANGUILLIFORMES.

MURENOPSIS.

1. *M. rostrata*, Spix. 80 42 1
 2. *M. curvilineata*, Cast. 81 42 2
 3. *M. vicina*, Cast. 81 42 4
 4. *M. caramura*, Cast. 82 43 1
 5. *M. punctata*, Cast. 82 42 3
 6. *M. ocellata*, Spix. 82
 7. *M. variegata*, Cast. 83 43 2

CONGER.

1. *C. limatus*, Cast. 83 43 3
 2. *C. microstomus*, Cast. 83 43 4
 3. *C. multidentus*, Cast. 84 44 1

SYMBRANCHES.

1. *S. vittatus*, Cast. 84 44 3

ERRATA.

Page 9. — *Heliasia marginata*, Cast. — Ainsi que je l'ai dit dans l'introduction, M. Valenciennes a déjà publié la figure d'une espèce sous ce nom (*Poissons des îles Canaries*); mais comme le texte du même ouvrage porte *Heliasia limbata*, j'ai pensé que c'était ce dernier nom que le naturaliste en question avait définitivement adopté.

Page 19. — *Holacanthus formosus*, Cast. — Il s'est glissé des erreurs d'impression dans le nombre des rayons de cette espèce; je le rétablis ici tel qu'il doit être et tel qu'il est figuré :

D. $\frac{11}{12}$; A. 4 épines dont la première très courte; P. 13; le reste conforme à la description.

Page 21. — *Plataxoides Dumerilii*, Cast. — Je me suis assuré qu'il y avait eu dix-sept dents de chaque côté, en tenant compte de celles qui étaient tombées dans mon individu qui est en fort mauvais état. Je crois que cette espèce habite la rivièrè des Amazones, ce qui serait un fait curieux pour un poisson de ce groupe.

Page 23. — *Acanthurus bahianus*, Cast. — Dans le détail de la dorsale on a imprimé 13 épines au lieu de 9 qui s'y trouvent.



Oudart Lith

P. Bertrand, Éditeur

Lith Geay-Gros, Paris

1. SERRANUS CANAUNA Nargr

3 SERRANUS OUATABILI Cuv Val 3^a

2 SERRANUS NIVEATUS . Cuv. Val 2^a

écailles de C^e Nat

écailles de C^e Nat


4. CENTROPRISTIS NEBULOSUS . Cast





1 POMACANTHUS PICTUS, Cast 2 PRISTIPOMA BICOLOR, Cast





Cédari. Lith.

P. Bertrand. color.

Lithographie. G. G. G.

1. HELIASIO MARGINATUS. Cast.

2. APOGON AMERICANUS. G. G.

3. POMACANTHUS TRIABILIS. G. G.





54



55

54 et 55

P. Richard. Lith.

Paris. chez M. Gay. 1824.

1 JOHNIUS AMAZONICUS Cast. 2 JOHNIUS AURATUS Cast.





1. JOHNIUS CROUVINA Cast.

2 XYRICHTHYS SPLENDENS Cast.

Oudart Lith.

P. Bertrand delin.

Lithographie Goussier





Hubert Lull

J. Boreaux éditeur

Lithographe Geay Co.

1 CHROMYS UNIOCELLATA Cast

2 CHROMYS UCAYALENSIS Cast

3 CHROMYS OBSCURA Cast






2/3



2/3



2/3

Olivier Lefé

P. Bertrand, éditeur


Lithographe Gony-Dore

1 CHROMYS PROXIMA. Cast.

2 CHROMYS UNIMACULATA. Cast.

3. CHROMIS APPENDICULATA. Cast.





Oskar Lill

P. Bertrand, éditeur

Paris (Société des Sciences et de l'Industrie)

1 CHROMIS PUNCTATA Bloch

2 CHROMIS UNIPUNCTATA Cast

3 CYCLO LACUSTRIS Cast





Séant, Lib.

P. Bietz, editeur

Pois. Ichthyographes Giry-Goss

1 CHROMYS ? ACORA Cast 2 CHROMYS ?? FASCIATA Cast. 3 AULASTOMA MARGRAVI Cast





♂ 184



♀ 185



♂ 186

♂ 187

♀ 188


♂ 189

1 CYCLA TOUCOUNARI: ♂ 184

2 CYCLA MULTIFASCIATA: ♀ 185

3 CYCLA CONIBOS: ♂ 186





Coulet 146

2 Bertrand éditeur

Paris Lithographe Vray Gros.

1 ACANTHURUS BAHIANUS Cast 1a Ecailles Gr Nat 1b Ecailles grossies

2 HOLACANTHUS FORMOSUS Cast

3 PLATAXOIDES DIMERILII Cast 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k 3l 3m 3n 3o 3p 3q 3r 3s 3t 3u 3v 3w 3x 3y 3z 3aa 3ab 3ac 3ad 3ae 3af 3ag 3ah 3ai 3aj 3ak 3al 3am 3an 3ao 3ap 3aq 3ar 3as 3at 3au 3av 3aw 3ax 3ay 3az 3ba 3bb 3bc 3bd 3be 3bf 3bg 3bh 3bi 3bj 3bk 3bl 3bm 3bn 3bo 3bp 3bq 3br 3bs 3bt 3bu 3bv 3bw 3bx 3by 3bz 3ca 3cb 3cc 3cd 3ce 3cf 3cg 3ch 3ci 3cj 3ck 3cl 3cm 3cn 3co 3cp 3cq 3cr 3cs 3ct 3cu 3cv 3cw 3cx 3cy 3cz 3da 3db 3dc 3dd 3de 3df 3dg 3dh 3di 3dj 3dk 3dl 3dm 3dn 3do 3dp 3dq 3dr 3ds 3dt 3du 3dv 3dw 3dx 3dy 3dz 3ea 3eb 3ec 3ed 3ee 3ef 3eg 3eh 3ei 3ej 3ek 3el 3em 3en 3eo 3ep 3eq 3er 3es 3et 3eu 3ev 3ew 3ex 3ey 3ez 3fa 3fb 3fc 3fd 3fe 3ff 3fg 3fh 3fi 3fj 3fk 3fl 3fm 3fn 3fo 3fp 3fq 3fr 3fs 3ft 3fu 3fv 3fw 3fx 3fy 3fz 3ga 3gb 3gc 3gd 3ge 3gf 3gg 3gh 3gi 3gj 3gk 3gl 3gm 3gn 3go 3gp 3gq 3gr 3gs 3gt 3gu 3gv 3gw 3gx 3gy 3gz 3ha 3hb 3hc 3hd 3he 3hf 3hg 3hh 3hi 3hj 3hk 3hl 3hm 3hn 3ho 3hp 3hq 3hr 3hs 3ht 3hu 3hv 3hw 3hx 3hy 3hz 3ia 3ib 3ic 3id 3ie 3if 3ig 3ih 3ii 3ij 3ik 3il 3im 3in 3io 3ip 3iq 3ir 3is 3it 3iu 3iv 3iw 3ix 3iy 3iz 3ja 3jb 3jc 3jd 3je 3jf 3jg 3jh 3ji 3jj 3jk 3jl 3jm 3jn 3jo 3jp 3jq 3jr 3js 3jt 3ju 3jv 3jw 3jx 3jy 3jz 3ka 3kb 3kc 3kd 3ke 3kf 3kg 3kh 3ki 3kj 3kk 3kl 3km 3kn 3ko 3kp 3kq 3kr 3ks 3kt 3ku 3kv 3kw 3kx 3ky 3kz 3la 3lb 3lc 3ld 3le 3lf 3lg 3lh 3li 3lj 3lk 3ll 3lm 3ln 3lo 3lp 3lq 3lr 3ls 3lt 3lu 3lv 3lw 3lx 3ly 3lz 3ma 3mb 3mc 3md 3me 3mf 3mg 3mh 3mi 3mj 3mk 3ml 3mm 3mn 3mo 3mp 3mq 3mr 3ms 3mt 3mu 3mv 3mw 3mx 3my 3mz 3na 3nb 3nc 3nd 3ne 3nf 3ng 3nh 3ni 3nj 3nk 3nl 3nm 3nn 3no 3np 3nq 3nr 3ns 3nt 3nu 3nv 3nw 3nx 3ny 3nz 3oa 3ob 3oc 3od 3oe 3of 3og 3oh 3oi 3oj 3ok 3ol 3om 3on 3oo 3op 3oq 3or 3os 3ot 3ou 3ov 3ow 3ox 3oy 3oz 3pa 3pb 3pc 3pd 3pe 3pf 3pg 3ph 3pi 3pj 3pk 3pl 3pm 3pn 3po 3pp 3pq 3pr 3ps 3pt 3pu 3pv 3pw 3px 3py 3pz 3qa 3qb 3qc 3qd 3qe 3qf 3qg 3qh 3qi 3qj 3qk 3ql 3qm 3qn 3qo 3qp 3qq 3qr 3qs 3qt 3qu 3qv 3qw 3qx 3qy 3qz 3ra 3rb 3rc 3rd 3re 3rf 3rg 3rh 3ri 3rj 3rk 3rl 3rm 3rn 3ro 3rp 3rq 3rr 3rs 3rt 3ru 3rv 3rw 3rx 3ry 3rz 3sa 3sb 3sc 3sd 3se 3sf 3sg 3sh 3si 3sj 3sk 3sl 3sm 3sn 3so 3sp 3sq 3sr 3ss 3st 3su 3sv 3sw 3sx 3sy 3sz 3ta 3tb 3tc 3td 3te 3tf 3tg 3th 3ti 3tj 3tk 3tl 3tm 3tn 3to 3tp 3tq 3tr 3ts 3tt 3tu 3tv 3tw 3tx 3ty 3tz 3ua 3ub 3uc 3ud 3ue 3uf 3ug 3uh 3ui 3uj 3uk 3ul 3um 3un 3uo 3up 3uq 3ur 3us 3ut 3uu 3uv 3uw 3ux 3uy 3uz 3va 3vb 3vc 3vd 3ve 3vf 3vg 3vh 3vi 3vj 3vk 3vl 3vm 3vn 3vo 3vp 3vq 3vr 3vs 3vt 3vu 3vv 3vw 3vx 3vy 3vz 3wa 3wb 3wc 3wd 3we 3wf 3wg 3wh 3wi 3wj 3wk 3wl 3wm 3wn 3wo 3wp 3wq 3wr 3ws 3wt 3wu 3wv 3ww 3wx 3wy 3wz 3xa 3xb 3xc 3xd 3xe 3xf 3xg 3xh 3xi 3xj 3xk 3xl 3xm 3xn 3xo 3xp 3xq 3xr 3xs 3xt 3xu 3xv 3xw 3xx 3xy 3xz 3ya 3yb 3yc 3yd 3ye 3yf 3yg 3yh 3yi 3yj 3yk 3yl 3ym 3yn 3yo 3yp 3yq 3yr 3ys 3yt 3yu 3yv 3yw 3yx 3yy 3yz 3za 3zb 3zc 3zd 3ze 3zf 3zg 3zh 3zi 3zj 3zk 3zl 3zm 3zn 3zo 3zp 3zq 3zr 3zs 3zt 3zu 3zv 3zw 3zx 3zy 3zz 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 4w 4x 4y 4z 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5j 5k 5l 5m 5n 5o 5p 5q 5r 5s 5t 5u 5v 5w 5x 5y 5z 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 6s 6t 6u 6v 6w 6x 6y 6z 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h 7i 7j 7k 7l 7m 7n 7o 7p 7q 7r 7s 7t 7u 7v 7w 7x 7y 7z 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 8t 8u 8v 8w 8x 8y 8z 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 9i 9j 9k 9l 9m 9n 9o 9p 9q 9r 9s 9t 9u 9v 9w 9x 9y 9z 10a 10b 10c 10d 10e 10f 10g 10h 10i 10j 10k 10l 10m 10n 10o 10p 10q 10r 10s 10t 10u 10v 10w 10x 10y 10z 11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i 11j 11k 11l 11m 11n 11o 11p 11q 11r 11s 11t 11u 11v 11w 11x 11y 11z 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12m 12n 12o 12p 12q 12r 12s 12t 12u 12v 12w 12x 12y 12z 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 13i 13j 13k 13l 13m 13n 13o 13p 13q 13r 13s 13t 13u 13v 13w 13x 13y 13z 14a 14b 14c 14d 14e 14f 14g 14h 14i 14j 14k 14l 14m 14n 14o 14p 14q 14r 14s 14t 14u 14v 14w 14x 14y 14z 15a 15b 15c 15d 15e 15f 15g 15h 15i 15j 15k 15l 15m 15n 15o 15p 15q 15r 15s 15t 15u 15v 15w 15x 15y 15z 16a 16b 16c 16d 16e 16f 16g 16h 16i 16j 16k 16l 16m 16n 16o 16p 16q 16r 16s 16t 16u 16v 16w 16x 16y 16z 17a 17b 17c 17d 17e 17f 17g 17h 17i 17j 17k 17l 17m 17n 17o 17p 17q 17r 17s 17t 17u 17v 17w 17x 17y 17z 18a 18b 18c 18d 18e 18f 18g 18h 18i 18j 18k 18l 18m 18n 18o 18p 18q 18r 18s 18t 18u 18v 18w 18x 18y 18z 19a 19b 19c 19d 19e 19f 19g 19h 19i 19j 19k 19l 19m 19n 19o 19p 19q 19r 19s 19t 19u 19v 19w 19x 19y 19z 20a 20b 20c 20d 20e 20f 20g 20h 20i 20j 20k 20l 20m 20n 20o 20p 20q 20r 20s 20t 20u 20v 20w 20x 20y 20z 21a 21b 21c 21d 21e 21f 21g 21h 21i 21j 21k 21l 21m 21n 21o 21p 21q 21r 21s 21t 21u 21v 21w 21x 21y 21z 22a 22b 22c 22d 22e 22f 22g 22h 22i 22j 22k 22l 22m 22n 22o 22p 22q 22r 22s 22t 22u 22v 22w 22x 22y 22z 23a 23b 23c 23d 23e 23f 23g 23h 23i 23j 23k 23l 23m 23n 23o 23p 23q 23r 23s 23t 23u 23v 23w 23x 23y 23z 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 24i 24j 24k 24l 24m 24n 24o 24p 24q 24r 24s 24t 24u 24v 24w 24x 24y 24z 25a 25b 25c 25d 25e 25f 25g 25h 25i 25j 25k 25l 25m 25n 25o 25p 25q 25r 25s 25t 25u 25v 25w 25x 25y 25z 26a 26b 26c 26d 26e 26f 26g 26h 26i 26j 26k 26l 26m 26n 26o 26p 26q 26r 26s 26t 26u 26v 26w 26x 26y 26z 27a 27b 27c 27d 27e 27f 27g 27h 27i 27j 27k 27l 27m 27n 27o 27p 27q 27r 27s 27t 27u 27v 27w 27x 27y 27z 28a 28b 28c 28d 28e 28f 28g 28h 28i 28j 28k 28l 28m 28n 28o 28p 28q 28r 28s 28t 28u 28v 28w 28x 28y 28z 29a 29b 29c 29d 29e 29f 29g 29h 29i 29j 29k 29l 29m 29n 29o 29p 29q 29r 29s 29t 29u 29v 29w 29x 29y 29z 30a 30b 30c 30d 30e 30f 30g 30h 30i 30j 30k 30l 30m 30n 30o 30p 30q 30r 30s 30t 30u 30v 30w 30x 30y 30z 31a 31b 31c 31d 31e 31f 31g 31h 31i 31j 31k 31l 31m 31n 31o 31p 31q 31r 31s 31t 31u 31v 31w 31x 31y 31z 32a 32b 32c 32d 32e 32f 32g 32h 32i 32j 32k 32l 32m 32n 32o 32p 32q 32r 32s 32t 32u 32v 32w 32x 32y 32z 33a 33b 33c 33d 33e 33f 33g 33h 33i 33j 33k 33l 33m 33n 33o 33p 33q 33r 33s 33t 33u 33v 33w 33x 33y 33z 34a 34b 34c 34d 34e 34f 34g 34h 34i 34j 34k 34l 34m 34n 34o 34p 34q 34r 34s 34t 34u 34v 34w 34x 34y 34z 35a 35b 35c 35d 35e 35f 35g 35h 35i 35j 35k 35l 35m 35n 35o 35p 35q 35r 35s 35t 35u 35v 35w 35x 35y 35z 36a 36b 36c 36d 36e 36f 36g 36h 36i 36j 36k 36l 36m 36n 36o 36p 36q 36r 36s 36t 36u 36v 36w 36x 36y 36z 37a 37b 37c 37d 37e 37f 37g 37h 37i 37j 37k 37l 37m 37n 37o 37p 37q 37r 37s 37t 37u 37v 37w 37x 37y 37z 38a 38b 38c 38d 38e 38f 38g 38h 38i 38j 38k 38l 38m 38n 38o 38p 38q 38r 38s 38t 38u 38v 38w 38x 38y 38z 39a 39b 39c 39d 39e 39f 39g 39h 39i 39j 39k 39l 39m 39n 39o 39p 39q 39r 39s 39t 39u 39v 39w 39x 39y 39z 40a 40b 40c 40d 40e 40f 40g 40h 40i 40j 40k 40l 40m 40n 40o 40p 40q 40r 40s 40t 40u 40v 40w 40x 40y 40z 41a 41b 41c 41d 41e 41f 41g 41h 41i 41j 41k 41l 41m 41n 41o 41p 41q 41r 41s 41t 41u 41v 41w 41x 41y 41z 42a 42b 42c 42d 42e 42f 42g 42h 42i 42j 42k 42l 42m 42n 42o 42p 42q 42r 42s 42t 42u 42v 42w 42x 42y 42z 43a 43b 43c 43d 43e 43f 43g 43h 43i 43j 43k 43l 43m 43n 43o 43p 43q 43r 43s 43t 43u 43v 43w 43x 43y 43z 44a 44b 44c 44d 44e 44f 44g 44h 44i 44j 44k 44l 44m 44n 44o 44p 44q 44r 44s 44t 44u 44v 44w 44x 44y 44z 45a 45b 45c 45d 45e 45f 45g 45h 45i 45j 45k 45l 45m 45n 45o 45p 45q 45r 45s 45t 45u 45v 45w 45x 45y 45z 46a 46b 46c 46d 46e 46f 46g 46h 46i 46j 46k 46l 46m 46n 46o 46p 46q 46r 46s 46t 46u 46v 46w 46x 46y 46z 47a 47b 47c 47d 47e 47f 47g 47h 47i 47j 47k 47l 47m 47n 47o 47p 47q 47r 47s 47t 47u 47v 47w 47x 47y 47z 48a 48b 48c 48d 48e 48f 48g 48h 48i 48j 48k 48l 48m 48n 48o 48p 48q 48r 48s 48t 48u 48v 48w 48x 48y 48z 49a 49b 49c 49d 49e 49f 49g 49h 49i 49j 49k 49l 49m 49n 49o 49p 49q 49r 49s 49t 49u 49v 49w 49x 49y 49z 50a 50b 50c 50d 50e 50f 50g 50h 50i 50j 50k 50l 50m 50n 50o 50p 50q 50r 50s 50t 50u 50v 50w 50x 50y 50z 51a 51b 51c 51d 51e 51f 51g 51h 51i 51j 51k 51l 51m 51n 51o 51p 51q 51r 51s 51t 51u 51v 51w 51x 51y 51z 52a 52b 52c 52d 52e 52f 52g 52h 52i 52j 52k 52l 52m 52n 52o 52p 52q 52r 52s 52t 52u 52v 52w 52x 52y 52z 53a 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53j 53k 53l 53m 53n 53o 53p 53q 53r 53s 53t 53u 53v 53w 53x 53y 53z 54a 54b 54c 54d 54e 54f 54g 54h 54i 54j 54k 54l 54m 54n 54o 54p 54q 54r 54s 54t 54u 54v 54w 54x 54y 54z 55a 55b 55c 55d 55e 55f 55g 55h 55i 55j 55k 55l 55m 55n 55o 55p 55q 55r 55s 55t 55u 55v 55w 55x 55y 55z 56a 56b 56c 56d 56e 56f 56g 56h 56i 56j 56k 56l 56m 56n 56o 56p 56q 56r 56s 56t 56u 56v 56w 56x 56y 56z 57a 57b 57c 57d 57e 57f 57g 57h 57i 57j 57k 57l 57m 57n 57o 57p 57q 57r 57s 57t 57u 57v 57w 57x 57y 57z 58a 58b 58c 58d 58e 58f 58g 58h 58i 58j 58k 58l 58m 58n 58o 58p 58q 58r 58s 58t 58u 58v 58w 58x 58y 58z 59a 59b 59c 59d 59e 59f 59g 59h 59i 59j 59k 59l 59m 59n 59o 59p 59q 59r 59s 59t 59u 59v 59w 59x 59y 59z 60a 60b 60c 60d 60e 60f 60g 60h 60i 60j 60k 60l 60m 60n 60o 60p 60q 60r 60s 60t 60u 60v 60w 60x 60y 60z 61a 61b 61c 61d 61e 61f 61g 61h 61i 61j 61k 61l 61m 61n 61o 61p 61q 61r 61s 61t 61u 61v 61w 61x 61y 61z 62a 62b 62c 62d 62e 62f 62g 62h 62i 62j 62k 62l 62m 62n 62o 62p 62q 62r 62s 62t 62u 62v 62w 62x 62y 62z 63a 63b 63c 63d 63e 63f 63g 63h 63i 63j 63k 63l 63m 63n 63o 63p 63q 63r 63s 63t 63u 63v 63w 63x 63y 63z 64a 64b 64c 64d 64e 64f 64g 64h 64i 64j 64k 64l 64m 64n 64o 64p 64q 64r 64s 64t 64u 64v 64w 64x 64y 64z 65a 65b 65c 65d 65e 65f 65g 65h 65i 65j 65k 65l 65m 65n 65o 65p 65q 65r 65s 65t 65u 65v 65w 65x 65y 65z 66a 66b 66c 66d 66e 66f 66g 66h 66i 66j 66k 66l 66m 66n 66o 66p 66q 66r 66s 66t 66u 66v 66w 66x 66y 66z 67a 67b 67c 67d 67e 67f 67g 67h 67i 67j 67k 67l 67m 67n 67o 67p 67q 67r 67s 67t 67u 67v 67w 67x 67y 67z 68a 68b 68c 68d 68e 68f 68g 68h 68i 68j 68k 68l 68m 68n 68o 68p 68q 68r 68s 68t 68u 68v 68w 68x 68y 68z 69a 69b 69c 69d 69e 69f 69g 69h 69i 69j 69k 69l 69m 69n 69o 69p 69q 69r 69s 69t 69u 69v 69w 69x 69y 69z 70a 70b 70c 70d 70e 70f 70g 70h 70i 70j 70k 70l 70m 70n 70o 70p 70q 70r 70s 70t 70u 70v 70w 70x 70y 70z 71a 71b 71c 71d 71e 71f 71g 71h 71i 71j 71k 71l 71m 71n 71o 71p 71q 71r 71s 71t 71u 71v 71w 71x 71y 71z 72a 72b 72c 72d 72e 72f 72g 72h 72i 72j 72k 72l 72m 72n 72o 72p 72q 72r 72s 72t 72u 72v 72w 72x 72y 72z 73a 73b 73c 73d 73e 73f 73g 73h 73i 73j 73k 73l 73m 73n 73o 73p 73q 73r 73s 73t 73u 73v 73w 73x 73y 73z 74a 74b 74c 74d 74e 74f 74g 74h 74i 74j 74k 74l 74m 74n 74o 74p 74q 74r 74s 74t 74u 74v 74w 74x 74y 74z 75a 75b 75c 75d 75e 75f 75g 75h 75i 75j 75k 75l 75m 75n 75o 75p 75q 75r 75s 75t 75u 75v 75w 75x 75y 75z 76a 76b 76c 76d 76e 76f 76g 76h 76i 76j 76k 76l 76m 76n 76o 76p 76q 76r 76s 76t 76u 76v 76w 76x 76y 76z 77a 77b 77c 77d 77e 77f 77g 77h 77i 77j 77k 77l 77m 77n 77o 77p 77q 77r 77s 77t 77u 77v 77w 77x 77y 77z 78a 78b 78c 78d 78e 78f 78g 78h 78i 78j 78k 78l 78m 78n 78o 78p 78q 78r 78s 78t 78u 78v 78w 78x 78y 78z 79a 79b 79c 79d 79e 79f 79g 79h 79i 79j 79k 79l 79m 79n 79o 79p 79q 79r 79s 79t 79u 79v 79w 79x 79y 79z 80a 80b 80c 80d 80e 80f 80g 80h 80i 80j 80k 80l 80m 80n 80o 80p 80q 80r 80s 80t 80u 80v 80w 80x 80y 80z 81a 81b 81c 81d 81e 81f 81g 81h 81i 81j 81k 81l 81m 81n 81o 81p 81q 81r 81s 81t 81u 81v 81w 81x 81y 81z 82a 82b 82c 82d 82e 82f 82g 82h 82i 82j 82k 82l 82m 82n 82o 82p 82q 82r 82s 82t 82u 82v 82w 82x 82y 82z 83a 83b 83c 83d 83e 83f 83g 83h 83i 83j 83k 83l 83m 83n 83o 83p 83q 83r 83s 83t 83u 83v 83w 83x 83y 83z 84a 84b 84c 84d 84e 84f 84g 84h 84i 84j 84k 84l 84m 84n 84o 84p 84q 84r 84s 84t 84u 84v 84w 84x 84y 84z 85a 85b 85c 85d 85e 85f 85g 85h 85i 85j 85k 85l 85m 85n 85o 85p 85q 85r 85s 85t 85u 85v 85w 85x 85y 85z 86a 86b 86c 86d 86e 86f 86g 86h 86i 86j 86k 86l 86m 86n 86o 86p 86q 86r 86s 86t 86u 86v 86w 86x 86y 86z 87a 87b 87c 87d 87e 87f 87g 87h 87i 87j 87k 87l 87m 87n 87o 87p 87q 87r 87s 87t 87u 87v 87w 87x 87y 87z 88a 88b 88c 88d 88e 88f 88g 88h 88i 88j 88k 88l 88m 88n 88o 88p 88q 88r 88s 88t 88u 88v 88w 88x 88y 88z 89a 89b 89c 89d 89e 89f 89g 89h 89i 89j 89k 89l 89m 89n 89o 89p 89q 89r 89s 89t 89u 89v 89w 89x 89y 89z 90a 90b 90c 90d 90e 90f 90g 90h 90i 90j 90k 90l 90m 90n 90o 90p 90q 90r 90s 90t 90u 90v 90w 90x 90y 90z 91a 91b 91c 91d 91e 91f 91g 91h 91i 91j 91k 91l 91m 91n 91o 91p 91q 91r 91s 91t 91u 91v 91w 91x 91y 91z 92a 92b 92c 92d 92e 92f 92g 92h 92i 92j 92k 92l 92m 92n 92o 92p 92q 92r 92s 92t 92u 92v 92w 92x 92y 92z 93a 93b 93c 93d 93e 93f 93g 93h 93i 93j 93k 93l 93m 93n 93o 93p 93q 93r 93s 93t 93u 93v 93w 93x 93y 93z 94a 94b 94c 94d 94e 94f 94g 94h 94i 94j 94k 94l 94m 94n 94o 94p 94q 94r 94s 94t 94u 94v 94w 94x 94y 94z 95a 95b 95c 95d 95e 95f 95g 95h 95i 95j 95k 95l 95m 95n 95o 95p 95q 95r 95s 95t 95u 95v 95w 95x 95y 95z 96a 96b 96c 96d 96e 96f 96g 96h 96i 96j 96k 96l 96m 96n 96o 96p 96q 96r 96s 96t 96u 96v 96w 96x 96y 96z 97a 97b 97c 97d 97e 97f 97g 97h 97i 97j 97k 97l 97m 97n 97o 97p 97q 97r 97s 97t 97u 97v 97w 97x 97y 97z 98a 98b 98c 98d 98e 98f 98g 98h 98i 98j 98k 98l 98m 98n 98o 98p 98q 98r 98s 98t 98u 98v 98w





Oudart Lith.

P. Bertrand éditeur

Lith. Geay Gress. Paris

1 CHROMYS LAPIDIFER Cast.

2 ACANTHURUS CÆRULEUS? B.

3 CLINUS FASCIATUS Cast.

4 MALTIA NOTATA Juv. Val.





Garbino 1855

Bagrus meridionalis

Bagrus flavipectus Garbino 1855

1 BAGRUS MERIDIONALIS Garb.

2 BAGRUS FLAVIPETUS Garb.





Chaud L.

P. Barthelemy del.

Paris Lithographe Goussier

1 BAGRUS ROUSSEAUXII Cast

2 BAGRUS PUNCTULATUS, Cast

© 1997



Conflict 14b

2. Bertrand, advisor

Lithographus Gery Gery Paris

1 PHRACTOCEPHALUS HEMILOPTERUS Bloch & ARIUS⁹ LONGIBARBUS Cuv





Dubaut Lith.

F. Barraud delin.


Paris: Lithographe Goussier.

1 *GENIDENS GRANULOSUS* Cast. 1 a. Bouche Gr. Nat.


2 *PIMELODUS BAHIANUS* Cast.

3 *PIMELODUS VERTICOLOR* Cast. 3 a. Bouche Gr. Nat.





112



113



114

Oudart, Lith.

P. Bertrand, editeur

Paris. Lithographe Gouy, Gros

1. *DORAS WEDDELLII* Cast

2. *AGENEIOSUS UCAYALENSIS* Cast

3. *GALEICHTYS ARAGUAYENSIS* Cast





Dufort Lith

P. Bertrand éditeur

Paris Loh Gony-Gros

1 GALEICHTHYS BAHIENSIS Cast 2 CALLICHTYS CHIQUITOS. Cast

3 CALLICHTYS SPLENDENS Cast





C. 184



185


Calder 185

P. Bernard, éditeur

Paris Librairie de la Gare 185

1. CALLICHTHYS TAIOSH Cast 2. PLATYSTOMA PUNCTIFER Cast





Indet. Lill.

Indet. Lill.

Indet. Lill.

1 HYPOSTOMUS ALATUS Cast.

2 HYPOSTOMUS ASPERATUS Cast.

3 HYPOSTOMUS NANAUS Cast.





Dessin Lth

P. Bérthelin, color.

Lithographie Goussier, Paris

1 HYPOSTOMUS SUBCARINATUS Cast.

2 HYPOSTOMUS AURANTIACUS Cast.

3 HYPOSTOMUS NIVEATUS Cast.





1864


2. Banded catfish

1864

1 HYPOSTOMUS NIGRICANS Cast 2 HYPOSTOMUS PICTUS Cast

3 HYPOSTOMUS SPINOSUS Cast





Oscar Loh

P. Deshayes, éditeur

Lithographie Goussier Paris

1 HYPOSTOMUS VIRGINICUS Cast

3 LORICARIA CASTANEA Cast

2 LORICARIA AMAZONICA Cast

4 LORICARIA CASTANEA Cast





Trichomycterus

Trichomycterus

Lithographie Goussier Paris


1 TRICHOMYCTERUS PENTLANDI Cast

3 TRICHOMYCTERUS PUNCTATISSIMUS Cast

2 TRICHOMYCTERUS PICTUS Cast

4 TRICHOMYCTERUS PUSILLUS Cast





Delahaye, Lith.

P. Bertrand éditeur rue de l'Arbre-Sec 22 à Paris

Lithographie Geny-Gras.

1 à 5. VASTRES GIGAS



Exochilus de F. de Castelnau (Amérique du Sud).

Partie Zoologie Pussieu, Pl. 15



1/10



1/10

Exochilus

P. Bertrand editeur.

Lithographie Guy Gou

1 VASTRES CIGAS. Cuv

2. OSTEOGLOSSUM MINUS Valenci





171



172



173

Exempl. L. 9

P. Brevius splan


Exempl. L. 9

1 ORESTIAS TSCHUDI Cast

2 ORESTIAS PENTLANDII Cuv Val

3 ORESTIAS JUSSIEUI Cuv Val





Grav. L. A.

P. Bérizand éditeur

Paris Luth. Goss. Goss.

1 VANDELLIA PLAZAII Cast 2 VANDELLIA CIRRHOSA Cav. Val

3 PRISTIGASTER PHAETON Cav. Val





Dubert Lith

F. Bertrand color

Lith. Goussier Paris

1 LEPORINUS BIMACULATUS. Cast

2 LEPORINUS MACULATUS Cuv Val

3. LEPORINUS VITTATUS Cuv Val





6 No.



Salmon

P. Bismarck, editeur

Lith. Goussier, Paris

1 LEFORINUS PACHYRUS Cav Val 2 SALMINUS MAXILLARIS Cav Val

3 EPICTYRUS DAPADONXUS M. M.





Oudart Lith

P. Bertrand, editeur


Lith. Goussier, Paris

1 SALMINUS HILARII Cuv. Val.

2 PROCHILODUS HILARII Cuv. Val.

3 PROCHILODUS NIGRICANS. Agass.





1. Piabuca


P. lineatus

2. Piabuca

1. PIABUCA VITTATA Cav. Val. 2. TETRAGONOPTERUS FASCIATUS Cav.

3. TETRAGONOPTERUS LINEATUS Cav. Val.





Ordert. 1844

P. Bernard. 1844

M. G. 1844. 1844

1 TETRAGONOPTERUS SAKA Cast 2 TETRAGONOPTERUS FUSCO AURATUS Cast

3 TETRAGONOPTERUS VITTATUS. Cast





Ouass Lill

P. Bertrand, éditeur


Lith. uny. Des. Paris

1 MYLETES DOLDYXORON Cuv. Val. 1^{er} Ecaill. de g^e nat.

2 MYLETES DURIVENTRIS Cuv. 2^e Ecaill. de g^e nat.

3 CHALCEUS CARPOPHAGUS. Cuv. Val.





Delahaye, Lith.



P. Bertrand, éditeur, rue de l'Arbre-Sec, 22 à Paris

Lithographie Geay-Gros.

143 MYLETES BIDENS.

2/3





Oudart Lith

P. Bertrand Éditeur

Lith Goussier Paris

1. CHALCEUS HILARII Cuv. Val. 2. CHALCEUS DEVILLEI Cast.

3. CHALCINUS AURITUS Cuv. Val.





Ondart Lilla


Planchon F. Editeur

Lith. Geay, Gros, Paris

1 CHALIMYS TRIFURCATUS Cast 2 SERRASALMUS HUMERALIS, Cuv., Val

3 SERRASALMUS RHOMBUS, Lacep





Robert Loh



P. Berthoud éditeur

Lith. Goupil-Gros Paris

1 SERRASALMUS GIBBUS Cast. 2. PYGOCENTRUS PIRAYA. Cuv.

3 PYGOPRISTIS SERRULATUS Cuv. Val.






Dessiné Lél.

P. Richard, éditeur

Leli Gony-Gony Paris

1. CYNODON VULPINUS. Spix. 2. CYNODON SCOMBEROIDES Cuv. Val. 2^e Tête et Dents





Ouistout Lith.

F. Berthelin 2. Chilean

Lith. Gony. Gony. 1860.

1 XIPHOSTOMA OSERYI Cast. 2 XIPHOSTOMA MACULATA Cuv. Va.

3 RHOMBUS AMARACA Margr.






u' Nat.



2/5



u' Nat.

Goulet Lith.

P. Bebraud Editeur

Lith. Jery Gros Paris

1. RHOMBUS BAHIANUS, Cast.

2. PLACUSIA BRASILIENSIS, Spix.

3. MONOCHIR PUNCTIFER, Cast.



Exposition de l'École Centrale d'Anatomie de Paris.



Gr. Nat.



Gr. Nat.



Gr. Nat.



Gr. Nat.

Labophis Cuv. Gr. Nat.

1 MURENOPHIS ROSTRATA Spix

3 MURENOPHIS PUNCTATA Cuv.

4 MURENOPHIS VICINA Cuv.

5 MURENOPHIS CURVILINEATA Cuv.

Gr. Nat.





Jaquet Lef.

P. Bartsch, Editeur

Lithographie Goup. Paris.

1 MURENOPHIS CARAMURU Cast.

2 MURENOPHIS VARIEGATA. Cast.

3 CONGER LIMBATUS. Cast.

4 CONGER MICROSTOMA. Cast.





176


177

178

1. CONGER MULTIDENS Cast. 2. OPHISURUS COMPTONII Galt.

3. SYNBRANCHUS VITTATUS Cast.





Duclat Lith.


P. Bertrand delieur

Paris Lithographe Gery Goss

1 STERNARCHUS ALBIFRONS Pallas. 1^a Coupe intérieure de la bouche. 1^b Les dents très grosses. 1^c Le sillon dorsal.

2 STERNARCHUS BONAPARTII Cuv. 3 STERNARCHUS LACEPEDIERI G. 4 STERNARCHUS MAXIMILIANI Goss.





Catani 2/6


P. Bertrand edeur

Pans L&S Gery Goss


1 CARAPUS SANGUINOLENTUS Cast. 2. RHAMPHICHTHYS MARMORATUS Cast

3 RHAMPHICHTHYS PANTHERINUS Cast





2/3



3/3

Oudart Lillo


P. Bertrand éditeur

Paris, L. G. G. G.

1 RHAMPHICHTYS LINEATUS Cast. 2 MONACANTHUS RUPPELII Cast.

3. TETRAODON BAJACU Cast.





Dorsal view


Ventral view

Lateral view, head down

1. TANURA SUBSERIATA COX. 2. TANURA MINOR COX. 3. TANURA (L.)




Espejete de P. de Cabellos. (Antique du Sud)



Scale 1/10

2^e Partie Zoologie Poissons Pl 43




9. Bremond. Eschsch.

Leptogobius long. Gm. Zool.

1. TUEHURA ORBIGNYI Cuv.

2. URUPTERA AGASSIZII. Meller et Heller





Leptodostiren dissimilis

F. de Castelnau

LEPTODOSTIREN DISSIMILIS Cast.

a. Bouche b. Anus c. d. Ecaillés grossies.

Gr. Nat.

May 2012522

